

Statistik för område E

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | TS | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF | Mjölksyra | Ättiksyra | Socker |
|---|---------|------|-----|------|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|--------|-----------|-----------|--------|
| Korn, kärna (001) | 1 | 15 | 861 | 22 | 68.8 | 110 | 328 | 7.0 | 178 | 135 | 3.15 | 617 | 0.000 | | | 0 |
| Havre, kärna, hög NDF (002) | 1 | 7 | 856 | 29 | 75.0 | 109 | | 7.0 | 308 | 392 | 2.00 | 528 | 0.000 | | | |
| Havre, kärna, medel NDF (003) | 1 | 1 | 932 | 33 | 0.0 | 131 | 387 | | 217 | 25 | 2.00 | 394 | 0.000 | | | 0 |
| Vete, kärna (005) | 1 | 8 | 849 | 19 | 78.2 | 121 | 331 | 6.0 | 120 | 169 | 3.50 | 673 | 0.000 | | | 0 |
| Rågvete (015) | 1 | 1 | 882 | 20 | 89.5 | 133 | | | | 187 | 3.50 | 688 | 0.000 | | | |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) | 1 | 4 | 836 | 24 | 80.5 | 103 | | 7.0 | | 304 | 2.50 | 598 | 0.000 | | | |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 8 | 853 | 22 | 87.0 | 120 | | 6.5 | 190 | 173 | 3.30 | 644 | 0.000 | | | |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) | 1 | 5 | 846 | 21 | 81.6 | 126 | | 5.7 | 172 | 324 | 2.50 | 599 | 0.000 | | | |
| Ärter, kärna (006) | 1 | 2 | 853 | 31 | 92.0 | 229 | | 3.0 | | 13 | 7.90 | 471 | 0.000 | | | |
| Åkerböna, kärna (007) | 1 | 7 | 853 | 34 | 89.0 | 304 | | 2.2 | 211 | 32 | 4.70 | 375 | 0.000 | | | |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 8 | 317 | 34 | 78.2 | 66 | 381 | | 368 | 177 | 4.04 | 306 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 58 |
| Prognos, gräs (0% baljv.) (041) | 0 | 1 | 230 | 53 | 66.3 | 100 | | | 667 | 189 | 4.24 | | 0.000 | | | 66 |
| Prognos, gräs (0% baljv.) (041) | 1 | 1 | 217 | 67 | 76.5 | 147 | | | 562 | 119 | 5.81 | | 0.000 | | | 70 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 2 | 1 | 418 | 97 | 68.2 | 56 | | | 502 | 216 | 3.54 | | 61.000 | | | 137 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 0 | 2 | 622 | 64 | 71.9 | 123 | 396 | 53.0 | 488 | 192 | 3.87 | | 27.500 | 21.0 | 4.5 | 105 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 15 | 374 | 68 | 73.1 | 142 | 654 | 101 | 506 | 167 | 4.41 | | 70.967 | 54.7 | 11.7 | 40 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 2 | 8 | 378 | 77 | 73.0 | 144 | 561 | 81.1 | 471 | 178 | 4.10 | | 70.963 | 55.0 | 13.4 | 53 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 3 | 8 | 409 | 85 | 75.9 | 156 | 573 | 82.1 | 445 | 150 | 4.56 | | 71.938 | 57.8 | 12.4 | 54 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 4 | 4 | 368 | 94 | 75.4 | 172 | 528 | 73.8 | 418 | 166 | 4.17 | | 82.900 | 66.8 | 14.8 | 37 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 2 | 437 | 84 | 69.8 | 121 | | | 525 | 193 | 3.97 | | 84.000 | | | 82 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 61 | 451 | 75 | 71.2 | 126 | 465 | | 526 | 177 | 4.36 | | 81.279 | 0.0 | 0.0 | 91 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 42 | 493 | 88 | 72.0 | 132 | 535 | | 499 | 175 | 4.27 | | 77.262 | 0.0 | 11.8 | 86 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 32 | 432 | 102 | 74.5 | 146 | 404 | | 459 | 154 | 4.52 | | 77.281 | 0.0 | 11.3 | 74 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 20 | 388 | 103 | 73.7 | 152 | 279 | | 461 | 166 | 4.40 | | 79.800 | 0.0 | 0.0 | 78 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 5 | 1 | 350 | 102 | 84.8 | 204 | | | 359 | 56 | 7.41 | | 84.000 | | | 121 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | TS | Aska | OS sambh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF | Mjölksyra | Ättiksyra | Socker |
|--|---------|------|-----|------|----------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|---------|-----------|-----------|--------|
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 43 | 390 | 84 | 71.4 | 128 | 586 | 92.1 | 481 | 188 | 3.94 | | 69.267 | 53.8 | 12.4 | 46 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 312 | 399 | 70 | 72.0 | 128 | 615 | 86.8 | 507 | 177 | 4.17 | 58 | 65.628 | 49.2 | 12.7 | 49 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 204 | 437 | 82 | 73.7 | 137 | 527 | 74.8 | 456 | 174 | 4.13 | | 62.479 | 48.5 | 11.7 | 63 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 139 | 418 | 88 | 74.5 | 146 | 534 | 83.2 | 434 | 173 | 4.13 | | 67.032 | 51.2 | 12.7 | 60 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 46 | 379 | 96 | 75.6 | 148 | 570 | 83.9 | 422 | 160 | 4.29 | | 82.711 | 64.0 | 16.0 | 48 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 5 | 2 | 425 | 91 | 76.5 | 155 | 577 | 63.0 | 419 | 149 | 4.65 | | 60.200 | 43.5 | 14.0 | 70 |
| Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) | 1 | 1 | 427 | | 70.6 | 95 | | | | 371 | 5.36 | | 117.000 | | | |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 7 | 365 | 58 | 66.1 | 93 | 626 | 80.7 | 448 | 281 | 2.43 | 115 | 81.029 | 66.0 | 12.9 | 38 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 1 | 403 | 78 | 69.5 | 148 | 520 | 61.0 | 400 | 261 | 2.62 | 65 | 87.000 | 73.0 | 12.0 | 30 |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | 337 | 60 | 60.0 | 114 | 604 | 135 | 483 | 331 | 1.95 | 118 | 61.233 | 46.0 | 13.3 | 21 |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1 | 6 | 373 | 73 | 66.2 | 114 | 633 | 108 | 445 | 429 | 6.00 | 105 | 67.917 | 51.2 | 15.3 | 28 |
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 6 | 444 | 62 | 64.2 | 80 | 562 | 79.2 | 469 | 304 | 2.39 | 117 | 63.333 | 45.7 | 15.5 | 39 |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (| 1 | 4 | 333 | 80 | 64.4 | 112 | 609 | 119 | 482 | 276 | 2.62 | 51 | 76.750 | 56.8 | 20.0 | 31 |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 6 | 334 | 76 | 67.9 | 124 | 549 | 99.6 | 445 | 268 | 2.78 | 79 | 65.487 | 45.8 | 14.6 | 49 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1 | 10 | 390 | 52 | 66.4 | 90 | 574 | 81.4 | 431 | 293 | 2.32 | 146 | 62.900 | 47.7 | 14.8 | 34 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 41 | 325 | 34 | 75.9 | 72 | 536 | 55.6 | 390 | 197 | 3.57 | 267 | 69.366 | 49.0 | 17.5 | 15 |
| Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) | 1 | 2 | 344 | 48 | 62.9 | 128 | 566 | 84.0 | 434 | 333 | 1.79 | 146 | 80.500 | 65.0 | 15.5 | 13 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 1 | 849 | 49 | 45.8 | 79 | | | 622 | 389 | 1.42 | | 0.000 | | | 79 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 7 | 833 | 60 | 61.2 | 69 | 412 | | 590 | 265 | 3.09 | | 1.571 | 0.0 | 4.0 | 107 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 2 | 3 | 857 | 59 | 57.3 | 80 | | | 590 | 284 | 2.86 | | 0.000 | | | 91 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 2 | 4 | 348 | 96 | 71.5 | 147 | | | 412 | 323 | 5.40 | | 72.000 | | | 91 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 3 | 8 | 408 | 97 | 73.0 | 157 | 381 | | 402 | 276 | 4.79 | | 45.625 | 0.0 | 1.7 | 85 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 4 | 374 | 90 | 74.2 | 160 | 594 | 83.0 | 426 | 197 | 4.60 | | 81.200 | 63.8 | 14.0 | 32 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 2 | 6 | 363 | 86 | 72.6 | 151 | 564 | 93.3 | 435 | 253 | 4.98 | | 83.550 | 62.3 | 17.7 | 37 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 3 | 3 | 357 | 91 | 74.9 | 150 | 556 | 92.3 | 391 | 256 | 5.14 | | 80.467 | 65.0 | 14.0 | 43 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | TS | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF | Mjölksyra | Ättiksyra | Socker |
|---|---------|------|-----|------|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|--------|-----------|-----------|--------|
| Ensilage, sudangräs (567) | 1 | 1 | 526 | 83 | 51.5 | 91 | 401 | 36.0 | 531 | 385 | 1.51 | | 40.200 | 28.0 | 10.0 | 36 |
| Grunnblanding Middels ford.grovför (326) | 1 | 8 | 368 | 76 | 75.0 | 146 | 529 | 65.9 | 391 | 208 | 3.92 | 91 | 93.250 | 69.1 | 19.1 | 28 |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 2 | 394 | 84 | 78.3 | 165 | 519 | 68.0 | 352 | 155 | 4.07 | 112 | | | | 49 |
| Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) | 1 | 2 | 852 | 58 | 0.0 | 230 | | 3.5 | 281 | | | 303 | 0.000 | | | |

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE* | AAT* | PBV* |
|---|---------|------|--------|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Korn, kärna (001) | 1 | 15 | | | | 95.4 | -33 | 7.38 | 13.4 | 92.0 | -45 |
| Havre, kärna, hög NDF (002) | 1 | 7 | | | | 83.3 | -9.9 | 6.39 | 11.5 | 69.0 | -22 |
| Havre, kärna, medel NDF (003) | 1 | 1 | | | | 97.5 | -12 | 7.26 | 11.8 | | |
| Vete, kärna (005) | 1 | 8 | | | | 114 | -46 | 8.00 | 14.1 | 93.5 | -24 |
| Rågvede (015) | 1 | 1 | | | | 110 | -29 | 7.90 | | | |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) | 1 | 4 | | | | 90.6 | -29 | 6.97 | 12.5 | 80.0 | -30 |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 8 | | | | 104 | -33 | 7.56 | 13.3 | 91.0 | -30 |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) | 1 | 5 | | | | 103 | -24 | 7.38 | 14.4 | 91.0 | -24 |
| Ärter, kärna (006) | 1 | 2 | | | | 103 | 82.9 | 7.69 | | | |
| Äkerböna, kärna (007) | 1 | 7 | | | | 102 | 151 | 7.80 | 13.5 | 99.3 | 151 |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 8 | 1.0000 | 0.00000 | | 89.6 | -74 | 6.48 | 11.6 | 79.5 | -71 |
| Prognos, gräs (0% baljv.) (041) | 0 | 1 | | | | 88.5 | -33 | 5.39 | 9.7 | | |
| Prognos, gräs (0% baljv.) (041) | 1 | 1 | | | | 102 | -12 | 6.35 | 11.2 | | |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 2 | 1 | | | | 72.0 | -50 | 5.07 | 9.5 | 68.0 | -60 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 0 | 2 | | 1.00000 | | 85.9 | -11 | 5.70 | 10.5 | 70.0 | 1.5 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 15 | | 3.56667 | | 79.2 | 18.4 | 6.03 | 10.7 | 70.5 | 21.1 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 2 | 8 | 5.0000 | 1.08750 | | 80.1 | 18.4 | 5.94 | 10.5 | 70.3 | 21.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 3 | 8 | | 0.81250 | | 82.8 | 25.1 | 6.18 | 10.9 | 71.4 | 33.4 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 4 | 4 | | 0.40000 | | 82.3 | 39.8 | 6.14 | 10.8 | 70.5 | 49.3 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE* | AAT* | PBV* |
|--|---------|------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 2 | | | | 77.0 | 3.9 | 5.61 | 10.0 | 70.0 | -0.5 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 61 | 1.0000 | 0.00000 | | 79.6 | 4.9 | 5.79 | 10.3 | 72.1 | 3.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 42 | 0.7500 | 0.75000 | | 79.9 | 10.0 | 5.79 | 10.3 | 71.8 | 3.9 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 32 | 0.6667 | 0.33333 | | 82.0 | 19.6 | 5.97 | 10.5 | 73.2 | 21.9 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 20 | 0.0000 | 0.00000 | | 81.4 | 26.0 | 5.91 | 10.4 | 72.4 | 25.8 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 5 | 1 | | | | 93.8 | 54.1 | 6.96 | 12.1 | 81.0 | 64.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 43 | | 2.12791 | | 78.0 | 9.3 | 5.74 | 10.2 | 69.2 | 9.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 312 | 4.4130 | 2.17372 | | 79.6 | 6.6 | 5.90 | 10.5 | 70.0 | 6.4 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 204 | 3.8125 | 1.00345 | | 82.3 | 11.2 | 5.95 | 10.6 | 70.4 | 16.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 139 | 3.9412 | 1.80216 | | 82.4 | 18.8 | 6.00 | 10.7 | 70.6 | 25.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 46 | 3.5000 | 1.16739 | | 80.7 | 22.7 | 6.11 | 10.7 | 70.8 | 23.7 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 5 | 2 | 3.0000 | 0.70000 | | 84.2 | 23.7 | 6.18 | 10.9 | 73.0 | 62.0 |
| Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) | 1 | 1 | | | | 68.3 | -8.3 | 5.69 | | | |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 7 | 5.0000 | 0.00000 | | 66.3 | -12 | 5.35 | 10.0 | 62.7 | -22 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 1 | | | | 72.9 | 28.6 | 5.74 | | | |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | | | | 64.0 | 14.3 | 4.85 | 9.9 | 63.5 | -19 |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1 | 6 | 4.0000 | 2.00000 | | 68.5 | 6.6 | 5.39 | 9.2 | 58.3 | 5.5 |
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 6 | 8.0000 | 5.00000 | | 70.0 | -28 | 5.24 | 9.7 | 64.5 | -47 |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (| 1 | 4 | | | | 64.4 | 10.4 | 5.17 | | | |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 6 | 10.0000 | 1.00000 | | 69.6 | 2.9 | 5.50 | 9.9 | 62.0 | -21 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1 | 10 | 4.0000 | 0.00000 | | 70.9 | -19 | 5.45 | 9.8 | 60.0 | -13 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 41 | 3.2000 | 0.00000 | | 82.1 | -56 | 6.40 | 11.3 | 79.0 | -72 |
| Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) | 1 | 2 | | | | 65.9 | 25.0 | 5.28 | | | |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 1 | | | | 64.2 | -12 | 3.46 | 6.3 | 48.0 | -4.0 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 7 | 4.0000 | 3.00000 | | 77.6 | -44 | 4.65 | 8.8 | 62.0 | -34 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE* | AAT* | PBV* |
|---|---------|------|--------|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 2 | 3 | | | | 74.6 | -30 | 4.39 | 8.1 | 58.3 | -20 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 2 | 4 | | | | 78.1 | 30.4 | 5.66 | 10.1 | 71.0 | 24.5 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 3 | 8 | 0.0000 | 0.00000 | | 82.4 | 32.9 | 5.78 | 10.3 | 71.6 | 34.6 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 4 | 3.0000 | 1.45000 | | 78.0 | 42.7 | 6.10 | 10.6 | 71.5 | 56.0 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 2 | 6 | 2.6667 | 1.71667 | | 77.0 | 36.2 | 5.98 | 10.4 | 70.3 | 44.7 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 3 | 3 | | 0.46667 | | 78.9 | 31.6 | 6.05 | 10.7 | 70.3 | 28.0 |
| Ensilage, sudangräs (567) | 1 | 1 | | 1.20000 | | 62.8 | 0.5 | 3.95 | 7.0 | 59.0 | -10 |
| Grunnblanding Middels ford.grovför (326) | 1 | 8 | 4.7500 | 0.25000 | | 82.2 | 22.4 | 6.41 | 10.9 | | |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 2 | | | | | | 0.00 | | | |
| Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) | 1 | 2 | | | | | | 0.00 | | | |

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. Ca | Ca | P | Mg | K | Na | Cl | S | CAB | Ant. Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|---|---------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-------|------|------|-----|
| Korn, kärna (001) | 1 | 12 | 0.5 | 3.4 | 1.2 | 5.4 | 0.1 | | 1.2 | 36 | 12 | 86.8 | 18.7 | 29.0 | 4.3 | 0.1 |
| Havre, kärna, hög NDF (002) | 1 | 5 | 0.8 | 3.7 | 1.3 | 5.2 | 0.1 | | 1.4 | 33 | 5 | 95.4 | 53.4 | 34.0 | 4.4 | 0.0 |
| Vete, kärna (005) | 1 | 4 | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 5.1 | 0.1 | | 1.2 | 33 | 4 | 50.5 | 33.8 | 28.8 | 4.6 | |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) | 1 | 4 | 0.6 | 3.4 | 1.2 | 5.1 | 0.1 | | 1.2 | 34 | 4 | 80.8 | 49.0 | 28.5 | 3.9 | |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 1.2 | 5.3 | 0.1 | | 1.3 | 30 | 2 | 68.0 | 30.0 | 30.0 | 4.8 | |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) | 1 | 5 | 0.6 | 3.5 | 1.3 | 5.3 | 0.1 | | 1.3 | 34 | 5 | 68.0 | 43.0 | 32.4 | 5.1 | 0.0 |
| Ärter, kärna (006) | 1 | 2 | 1.0 | 4.1 | 1.5 | 11.4 | 0.1 | | 1.9 | 123 | 2 | 81.5 | 12.5 | 39.0 | 8.1 | 0.0 |
| Åkerböna, kärna (007) | 1 | 4 | 1.3 | 5.4 | 1.6 | 13.1 | 0.1 | | 1.7 | 204 | 4 | 67.0 | 20.3 | 55.8 | 18.7 | 0.0 |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 8 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 9.7 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 155 | 7 | 84.3 | 32.3 | 25.0 | 3.2 | 0.0 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 2 | 1 | 5.0 | 2.2 | 1.5 | 20.1 | 0.4 | | 1.7 | 284 | 1 | 68.0 | 100.0 | 12.0 | 2.9 | 0.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 0 | 1 | 5.0 | 3.3 | 2.2 | 24.3 | 0.6 | 5.8 | 2.3 | 276 | 1 | 145.0 | 89.0 | 29.0 | 5.8 | |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 14 | 4.5 | 2.3 | 1.8 | 22.9 | 0.7 | 4.4 | 1.8 | 385 | 14 | 159.9 | 61.3 | 29.0 | 7.2 | 0.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 2 | 6 | 6.4 | 2.9 | 2.3 | 24.0 | 1.3 | 6.9 | 2.3 | 349 | 5 | 138.8 | 63.4 | 26.6 | 6.7 | 0.0 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. Ca | Ca | P | Mg | K | Na | Cl | S | CAB | Ant. Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|---|---------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 3 | 6 | 6.8 | 3.0 | 2.5 | 27.3 | 1.6 | 7.5 | 2.5 | 397 | 6 | 112.3 | 61.0 | 25.8 | 7.1 | 0.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 4 | 4 | 8.1 | 3.1 | 2.8 | 26.9 | 1.7 | 9.1 | 2.5 | 352 | 4 | 159.8 | 65.8 | 24.3 | 8.3 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 2 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 22.7 | 1.0 | | 2.1 | 360 | 2 | 89.5 | 84.0 | 23.5 | 5.3 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 55 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 25.1 | 0.7 | 3.1 | 1.9 | 426 | 53 | 150.7 | 69.6 | 31.4 | 5.8 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 42 | 6.1 | 2.9 | 2.1 | 24.8 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 396 | 41 | 189.4 | 86.2 | 26.7 | 6.9 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 30 | 7.7 | 3.2 | 2.4 | 28.5 | 0.8 | 6.6 | 2.3 | 480 | 30 | 222.7 | 102.8 | 23.9 | 7.3 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 19 | 7.8 | 3.2 | 2.6 | 27.1 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 457 | 19 | 163.7 | 105.1 | 25.8 | 7.6 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 5 | 1 | 7.1 | 3.7 | 2.7 | 30.1 | 1.0 | | 2.8 | 506 | 1 | 130.0 | 100.0 | 25.0 | 8.3 | |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 38 | 6.0 | 2.6 | 2.1 | 23.6 | 1.1 | 7.2 | 1.9 | 340 | 38 | 325.3 | 95.0 | 31.0 | 6.8 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 289 | 4.9 | 2.4 | 1.8 | 23.1 | 0.7 | 4.4 | 1.7 | 393 | 261 | 182.7 | 74.5 | 26.1 | 5.6 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 193 | 6.8 | 2.7 | 2.2 | 24.0 | 0.9 | 5.8 | 2.1 | 360 | 184 | 187.6 | 82.5 | 24.7 | 6.7 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 129 | 7.4 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 1.2 | 6.2 | 2.2 | 387 | 122 | 231.0 | 99.3 | 24.7 | 7.2 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 40 | 7.0 | 3.2 | 2.5 | 25.9 | 1.3 | 7.0 | 2.6 | 367 | 34 | 387.6 | 106.6 | 24.8 | 7.0 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 5 | 2 | 5.1 | 2.7 | 2.4 | 24.4 | 0.9 | 4.7 | 3.0 | 344 | 2 | 334.5 | 94.0 | 395.5 | 7.1 | 0.1 |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 7 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 15.1 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 250 | 6 | 230.7 | 86.5 | 23.3 | 4.0 | 0.1 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 1 | 7.9 | 3.1 | 2.0 | 22.3 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 459 | 1 | 182.0 | 74.0 | 28.0 | 7.4 | 0.0 |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | 4.8 | 2.7 | 1.7 | 14.0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 280 | 3 | 221.3 | 62.3 | 30.3 | 7.1 | |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1 | 6 | 4.9 | 2.3 | 1.6 | 18.6 | 0.7 | 4.2 | 1.5 | 295 | 6 | 263.0 | 64.0 | 28.2 | 5.7 | |
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 6 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 17.4 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 316 | 5 | 165.8 | 134.4 | 24.6 | 3.9 | 0.0 |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (| 1 | 4 | 7.0 | 2.5 | 1.6 | 18.2 | 0.3 | 4.6 | 1.4 | 259 | 4 | 243.0 | 88.0 | 27.3 | 5.9 | 0.0 |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 5 | 6.0 | 2.5 | 1.9 | 17.9 | 1.1 | 4.0 | 1.9 | 273 | 5 | 211.4 | 85.0 | 29.6 | 7.0 | 0.0 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30) | 1 | 10 | 5.0 | 2.1 | 1.5 | 15.2 | 0.6 | 3.1 | 1.3 | 244 | 10 | 123.0 | 85.9 | 23.0 | 4.5 | 0.1 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 38 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 9.8 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 158 | 30 | 198.6 | 32.5 | 21.9 | 3.5 | 0.0 |
| Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) | 1 | 2 | 6.8 | 2.5 | 2.0 | 14.0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 262 | 2 | 93.5 | 72.5 | 21.0 | 5.3 | 0.0 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 1 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 5.3 | 1.4 | | 1.6 | -44 | 1 | 91.0 | 104.0 | 22.0 | 5.2 | |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. Ca | Ca | P | Mg | K | Na | Cl | S | CAB | Ant. Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|---|---------|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-------|-------|------|-----|
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 5 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 14.2 | 0.3 | | 1.1 | 166 | 4 | 70.3 | 77.8 | 18.0 | 3.4 | |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 2 | 3 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 15.0 | 0.5 | | 1.2 | 189 | 3 | 137.7 | 88.3 | 15.7 | 3.7 | 0.0 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 2 | 4 | 11.0 | 2.4 | 3.3 | 25.0 | 0.7 | | 2.2 | 408 | 4 | 147.3 | 54.8 | 25.8 | 9.3 | 0.0 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 3 | 8 | 10.7 | 3.1 | 3.1 | 27.6 | 1.0 | 5.3 | 2.2 | 476 | 6 | 100.2 | 62.0 | 24.5 | 10.5 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 4 | 8.2 | 3.3 | 2.3 | 28.8 | 0.8 | 4.4 | 2.0 | 523 | 2 | 139.0 | 39.5 | 20.5 | 7.4 | |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 2 | 6 | 8.5 | 3.1 | 2.5 | 26.4 | 1.2 | 5.5 | 2.2 | 435 | 3 | 151.0 | 56.3 | 27.3 | 7.7 | |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 3 | 2 | 8.3 | 2.7 | 2.4 | 26.2 | 1.1 | 6.7 | 2.1 | 355 | 2 | 141.5 | 82.5 | 24.0 | 6.6 | 0.0 |
| Ensilage, sudangräs (567) | 1 | 1 | 10.9 | 1.7 | 2.0 | 14.5 | 0.3 | 4.9 | 2.3 | 102 | 1 | 208.0 | 140.0 | 28.0 | 8.1 | |
| Grunnblandning Middels ford.grovför (326) | 1 | 8 | 6.8 | 4.0 | 3.7 | 22.2 | 2.4 | 5.1 | 3.0 | 346 | 4 | 291.3 | 126.8 | 109.8 | 21.5 | 0.6 |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 1 | 5.9 | 4.1 | 2.9 | 22.2 | 3.2 | 8.6 | 2.9 | 295 | 1 | 572.0 | 103.0 | 75.0 | 12.3 | |
| Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) | 1 | 1 | 9.8 | 8.7 | 5.2 | 11.0 | 8.0 | | 7.3 | | 1 | 303.0 | 101.0 | 101.0 | 24.6 | |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 15 | 860.533 | 23.9668 | 840.000 | 885.000 |
| Aska | 15 | 22.433 | 1.4070 | 20.700 | 24.000 |
| OS smbh | 15 | 68.800 | 35.6074 | 0.000 | 86.000 |
| Råprot | 15 | 109.600 | 14.4386 | 95.000 | 130.700 |
| sRåprot | 3 | 328.333 | 17.0098 | 309.000 | 341.000 |
| NH3-N | 1 | 7.000 | . | 7.000 | 7.000 |
| NDF | 7 | 178.429 | 48.8530 | 133.000 | 265.000 |
| iNDF | 15 | 134.600 | 56.7234 | 25.000 | 162.000 |
| nhNDF | 15 | 3.150 | 0.0000 | 3.150 | 3.150 |
| Stä | 15 | 617.420 | 45.4935 | 549.000 | 667.400 |
| TAF | 15 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 15 | 95.378 | 2.3985 | 92.077 | 99.201 |
| PBVp20 | 15 | -33.276 | 15.8106 | -55.041 | -13.357 |
| NELp20 | 15 | 7.377 | 0.1389 | 7.144 | 7.552 |
| OE* | 8 | 13.425 | 0.0886 | 13.300 | 13.500 |
| AAT* | 5 | 92.000 | 0.7071 | 91.000 | 93.000 |
| PBV* | 5 | -45.200 | 7.8549 | -54.000 | -34.000 |
| Ca | 12 | 0.517 | 0.1899 | 0.400 | 0.500 |
| P | 12 | 3.367 | 0.4185 | 2.700 | 3.800 |
| Mg | 12 | 1.242 | 0.1621 | 1.100 | 1.400 |
| K | 12 | 5.442 | 0.8533 | 4.400 | 6.400 |
| Na | 12 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 12 | 1.183 | 0.1403 | 1.100 | 1.400 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB | 12 | 35.760 | 22.4561 | 5.519 | 59.228 |
| Fe | 12 | 86.750 | 93.0055 | 48.000 | 105.000 |
| Mn | 12 | 18.667 | 7.0754 | 12.000 | 31.000 |
| Zn | 12 | 29.000 | 3.0748 | 25.000 | 32.000 |
| Cu | 12 | 4.317 | 1.0870 | 3.100 | 5.700 |
| Se | 5 | 0.060 | 0.0554 | 0.005 | 0.136 |

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 7 | 855.571 | 15.2409 | 834.000 | 875.000 |
| Aska | 7 | 29.300 | 4.4204 | 23.900 | 36.000 |
| OS smbh | 7 | 75.000 | 0.0000 | 75.000 | 75.000 |
| Råprot | 7 | 108.900 | 17.6514 | 92.400 | 146.000 |
| NH3-N | 1 | 7.000 | . | 7.000 | 7.000 |
| NDF | 3 | 307.667 | 41.6813 | 271.000 | 353.000 |
| iNDF | 7 | 392.000 | 0.0000 | 392.000 | 392.000 |
| nhNDF | 7 | 2.000 | 0.0000 | 2.000 | 2.000 |
| Stä | 7 | 528.086 | 71.5750 | 421.000 | 584.200 |
| TAF | 7 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 7 | 83.279 | 2.4218 | 80.761 | 87.764 |
| PBVp20 | 7 | -9.897 | 17.7004 | -28.532 | 25.690 |
| NELp20 | 7 | 6.392 | 0.3205 | 5.883 | 6.822 |
| OE* | 1 | 11.500 | . | 11.500 | 11.500 |
| AAT* | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBV* | 1 | -22.000 | . | -22.000 | -22.000 |
| Ca | 5 | 0.760 | 0.1342 | 0.600 | 0.900 |
| P | 5 | 3.740 | 0.3847 | 3.300 | 4.300 |
| Mg | 5 | 1.300 | 0.1414 | 1.100 | 1.500 |
| K | 5 | 5.220 | 1.1862 | 4.500 | 7.300 |
| Na | 5 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 5 | 1.360 | 0.2302 | 1.200 | 1.700 |
| CAB | 5 | 33.133 | 21.0905 | 8.527 | 65.080 |
| Fe | 5 | 95.400 | 14.9933 | 79.000 | 119.000 |
| Mn | 5 | 53.400 | 14.1174 | 29.000 | 65.000 |
| Zn | 5 | 34.000 | 7.3824 | 25.000 | 42.000 |
| Cu | 5 | 4.400 | 1.2903 | 3.200 | 6.500 |
| Se | 1 | 0.035 | . | 0.035 | 0.035 |

Fodermedel=Havre, kärna, medel NDF (003) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 932.000 | . | 932.000 | 932.000 |
| Aska | 1 | 33.000 | . | 33.000 | 33.000 |
| OS smbh | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Råprot | 1 | 131.000 | . | 131.000 | 131.000 |
| sRåprot | 1 | 387.000 | . | 387.000 | 387.000 |
| NDF | 1 | 217.000 | . | 217.000 | 217.000 |
| iNDF | 1 | 25.000 | . | 25.000 | 25.000 |
| nhNDF | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, medel NDF (003) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Stä | 1 | 394.000 | . | 394.000 | 394.000 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 1 | 97.493 | . | 97.493 | 97.493 |
| PBVp20 | 1 | -12.438 | . | -12.438 | -12.438 |
| NELp20 | 1 | 7.264 | . | 7.264 | 7.264 |
| OE* | 1 | 11.800 | . | 11.800 | 11.800 |

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 8 | 849.000 | 30.6128 | 797.000 | 883.000 |
| Aska | 8 | 19.163 | 2.0177 | 16.000 | 22.000 |
| OS smbh | 9 | 78.222 | 29.3333 | 0.000 | 88.000 |
| Råprot | 8 | 120.663 | 14.5197 | 100.500 | 143.700 |
| sRåprot | 1 | 331.000 | . | 331.000 | 331.000 |
| NH3-N | 1 | 6.000 | . | 6.000 | 6.000 |
| NDF | 2 | 120.000 | 2.8284 | 118.000 | 122.000 |
| iNDF | 9 | 169.000 | 54.0000 | 25.000 | 187.000 |
| nhNDF | 9 | 3.500 | 0.0000 | 3.500 | 3.500 |
| Stä | 8 | 673.063 | 54.2357 | 557.000 | 722.200 |
| TAF | 9 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 9 | 114.144 | 2.0063 | 110.387 | 117.487 |
| PBVp20 | 9 | -46.393 | 11.1006 | -63.980 | -28.145 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20 | 9 | 8.000 | 0.0988 | 7.845 | 8.157 |
| OE* | 3 | 14.133 | 0.1155 | 14.000 | 14.200 |
| AAT* | 2 | 93.500 | 0.7071 | 93.000 | 94.000 |
| PBV* | 2 | -23.500 | 19.0919 | -37.000 | -10.000 |
| Ca | 4 | 0.425 | 0.0500 | 0.400 | 0.500 |
| P | 4 | 3.425 | 0.2872 | 3.100 | 3.800 |
| Mg | 4 | 1.175 | 0.1500 | 1.000 | 1.300 |
| K | 4 | 5.100 | 0.5477 | 4.500 | 5.700 |
| Na | 3 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 4 | 1.225 | 0.0957 | 1.100 | 1.300 |
| CAB | 4 | 32.868 | 19.7961 | 12.835 | 56.026 |
| Fe | 4 | 50.500 | 8.8129 | 40.000 | 60.000 |
| Mn | 4 | 33.750 | 5.9090 | 28.000 | 42.000 |
| Zn | 4 | 28.750 | 1.5000 | 27.000 | 30.000 |
| Cu | 4 | 4.600 | 0.6976 | 4.000 | 5.500 |

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 882.000 | . | 882.000 | 882.000 |
| Aska | 1 | 20.400 | . | 20.400 | 20.400 |
| OS smbh | 1 | 89.479 | . | 89.479 | 89.479 |
| Råprot | 1 | 132.700 | . | 132.700 | 132.700 |
| iNDF | 1 | 187.000 | . | 187.000 | 187.000 |
| nhNDF | 1 | 3.500 | . | 3.500 | 3.500 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Stä | 1 | 688.200 | . | 688.200 | 688.200 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 1 | 110.333 | . | 110.333 | 110.333 |
| PBVp20 | 1 | -28.722 | . | -28.722 | -28.722 |
| NELp20 | 1 | 7.904 | . | 7.904 | 7.904 |

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 4 | 836.250 | 32.6637 | 796.000 | 876.000 |
| Aska | 4 | 24.200 | 4.0324 | 20.300 | 29.000 |
| OS smbh | 4 | 80.500 | 0.0000 | 80.500 | 80.500 |
| Råprot | 4 | 103.475 | 10.4216 | 93.200 | 118.000 |
| NH3-N | 2 | 7.000 | 0.0000 | 7.000 | 7.000 |
| iNDF | 4 | 304.000 | 0.0000 | 304.000 | 304.000 |
| nhNDF | 4 | 2.500 | 0.0000 | 2.500 | 2.500 |
| Stä | 4 | 597.950 | 75.5238 | 525.000 | 670.300 |
| TAF | 4 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 4 | 90.610 | 0.7192 | 90.064 | 91.632 |
| PBVp20 | 4 | -29.303 | 9.1370 | -38.629 | -16.726 |
| NELp20 | 4 | 6.974 | 0.2473 | 6.733 | 7.196 |
| OE* | 1 | 12.500 | . | 12.500 | 12.500 |
| AAT* | 1 | 80.000 | . | 80.000 | 80.000 |
| PBV* | 1 | -30.000 | . | -30.000 | -30.000 |
| Ca | 4 | 0.600 | 0.0816 | 0.500 | 0.700 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| P | 4 | 3.400 | 0.4546 | 2.900 | 4.000 |
| Mg | 4 | 1.200 | 0.2160 | 1.000 | 1.500 |
| K | 4 | 5.050 | 0.4655 | 4.500 | 5.600 |
| Na | 4 | 0.125 | 0.0500 | 0.100 | 0.200 |
| S | 4 | 1.200 | 0.1414 | 1.100 | 1.400 |
| CAB | 4 | 34.239 | 6.3050 | 25.335 | 39.913 |
| Fe | 4 | 80.750 | 9.6047 | 74.000 | 95.000 |
| Mn | 4 | 49.000 | 9.6954 | 42.000 | 63.000 |
| Zn | 4 | 28.500 | 4.0415 | 23.000 | 32.000 |
| Cu | 4 | 3.875 | 0.9287 | 2.600 | 4.700 |

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 8 | 853.375 | 25.8564 | 808.000 | 888.000 |
| Aska | 8 | 21.725 | 3.2181 | 18.000 | 27.000 |
| OS smbh | 8 | 87.000 | 0.0000 | 87.000 | 87.000 |
| Råprot | 8 | 120.363 | 9.6352 | 108.500 | 140.000 |
| NH3-N | 2 | 6.500 | 0.7071 | 6.000 | 7.000 |
| NDF | 6 | 190.167 | 26.7089 | 154.000 | 237.000 |
| iNDF | 8 | 173.000 | 0.0000 | 173.000 | 173.000 |
| nhNDF | 8 | 3.300 | 0.0000 | 3.300 | 3.300 |
| Stä | 8 | 644.075 | 52.5518 | 548.000 | 715.300 |
| TAF | 8 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 8 | 104.033 | 1.4851 | 101.173 | 105.636 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20 | 8 | -33.028 | 8.4065 | -41.048 | -15.601 |
| NELp20 | 8 | 7.556 | 0.1267 | 7.356 | 7.710 |
| OE* | 4 | 13.250 | 0.7326 | 12.300 | 14.000 |
| AAT* | 4 | 91.000 | 6.0553 | 82.000 | 95.000 |
| PBV* | 4 | -30.250 | 12.1484 | -41.000 | -15.000 |
| Ca | 2 | 0.500 | 0.1414 | 0.400 | 0.600 |
| P | 2 | 3.300 | 0.0000 | 3.300 | 3.300 |
| Mg | 2 | 1.200 | 0.1414 | 1.100 | 1.300 |
| K | 2 | 5.300 | 0.9899 | 4.600 | 6.000 |
| Na | 2 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 2 | 1.300 | 0.1414 | 1.200 | 1.400 |
| CAB | 2 | 30.479 | 16.4796 | 18.826 | 42.131 |
| Fe | 2 | 68.000 | 18.3848 | 55.000 | 81.000 |
| Mn | 2 | 30.000 | 9.8995 | 23.000 | 37.000 |
| Zn | 2 | 30.000 | 4.2426 | 27.000 | 33.000 |
| Cu | 2 | 4.750 | 0.6364 | 4.300 | 5.200 |

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 5 | 845.600 | 13.2212 | 828.000 | 864.000 |
| Aska | 5 | 21.100 | 4.6152 | 17.000 | 29.000 |
| OS smbh | 5 | 81.600 | 0.0000 | 81.600 | 81.600 |
| Råprot | 5 | 126.120 | 5.4564 | 119.000 | 132.000 |
| NH3-N | 3 | 5.667 | 0.5774 | 5.000 | 6.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 2 | 172.000 | 14.1421 | 162.000 | 182.000 |
| iNDF | 5 | 324.000 | 0.0000 | 324.000 | 324.000 |
| nhNDF | 5 | 2.500 | 0.0000 | 2.500 | 2.500 |
| Stä | 5 | 598.520 | 49.7358 | 511.000 | 631.600 |
| TAF | 5 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 5 | 103.285 | 1.8390 | 101.350 | 105.388 |
| PBVp20 | 5 | -24.148 | 6.4950 | -30.863 | -16.005 |
| NELp20 | 5 | 7.383 | 0.1769 | 7.142 | 7.610 |
| OE* | 1 | 14.400 | . | 14.400 | 14.400 |
| AAT* | 1 | 91.000 | . | 91.000 | 91.000 |
| PBV* | 1 | -24.000 | . | -24.000 | -24.000 |
| Ca | 5 | 0.620 | 0.2387 | 0.400 | 1.000 |
| P | 5 | 3.540 | 0.3435 | 3.000 | 3.800 |
| Mg | 5 | 1.280 | 0.1304 | 1.200 | 1.500 |
| K | 5 | 5.300 | 1.0724 | 4.200 | 7.000 |
| Na | 5 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 5 | 1.340 | 0.1517 | 1.100 | 1.500 |
| CAB | 5 | 33.612 | 26.1193 | 1.729 | 73.341 |
| Fe | 5 | 68.000 | 23.8118 | 44.000 | 99.000 |
| Mn | 5 | 43.000 | 13.8924 | 28.000 | 62.000 |
| Zn | 5 | 32.400 | 4.7223 | 28.000 | 40.000 |
| Cu | 5 | 5.060 | 1.3465 | 3.700 | 7.200 |
| Se | 3 | 0.014 | 0.0156 | 0.005 | 0.032 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Statistik för område E

16:30 Sunday, April 13, 2025 17

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 853.000 | 25.4558 | 835.000 | 871.000 |
| Aska | 2 | 31.000 | 4.2426 | 28.000 | 34.000 |
| OS smbh | 3 | 92.000 | 0.0000 | 92.000 | 92.000 |
| Råprot | 2 | 229.000 | 2.8284 | 227.000 | 231.000 |
| NH3-N | 2 | 3.000 | 0.0000 | 3.000 | 3.000 |
| iNDF | 3 | 13.000 | 0.0000 | 13.000 | 13.000 |
| nhNDF | 3 | 7.900 | 0.0000 | 7.900 | 7.900 |
| Stä | 2 | 470.500 | 7.7782 | 465.000 | 476.000 |
| TAF | 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 3 | 102.696 | 0.1954 | 102.479 | 102.857 |
| PBVp20 | 3 | 82.878 | 6.0431 | 77.420 | 89.372 |
| NELp20 | 3 | 7.688 | 0.0763 | 7.629 | 7.774 |
| Ca | 2 | 1.000 | 0.0000 | 1.000 | 1.000 |
| P | 2 | 4.100 | 0.4243 | 3.800 | 4.400 |
| Mg | 2 | 1.450 | 0.0707 | 1.400 | 1.500 |
| K | 2 | 11.350 | 1.3435 | 10.400 | 12.300 |
| Na | 2 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 2 | 1.850 | 0.0707 | 1.800 | 1.900 |
| CAB | 2 | 122.666 | 29.9413 | 101.494 | 143.838 |
| Fe | 2 | 81.500 | 28.9914 | 61.000 | 102.000 |
| Mn | 2 | 12.500 | 0.7071 | 12.000 | 13.000 |
| Zn | 2 | 39.000 | 4.2426 | 36.000 | 42.000 |
| Cu | 2 | 8.050 | 0.6364 | 7.600 | 8.500 |
| Se | 1 | 0.005 | . | 0.005 | 0.005 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 7 | 853.429 | 20.1483 | 815.000 | 876.000 |
| Aska | 7 | 34.000 | 2.6458 | 31.000 | 38.000 |
| OS smbh | 7 | 88.959 | 0.0000 | 88.959 | 88.959 |
| Råprot | 7 | 303.857 | 7.2440 | 298.000 | 319.000 |
| NH3-N | 5 | 2.200 | 0.4472 | 2.000 | 3.000 |
| NDF | 1 | 211.000 | . | 211.000 | 211.000 |
| iNDF | 7 | 32.000 | 0.0000 | 32.000 | 32.000 |
| nhNDF | 7 | 4.700 | 0.0000 | 4.700 | 4.700 |
| Stä | 7 | 375.429 | 22.5452 | 345.000 | 406.000 |
| TAF | 7 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 7 | 102.448 | 0.2854 | 101.883 | 102.751 |
| PBVp20 | 7 | 150.844 | 7.6943 | 144.493 | 166.924 |
| NELp20 | 7 | 7.796 | 0.0478 | 7.730 | 7.862 |
| OE* | 3 | 13.533 | 0.0577 | 13.500 | 13.600 |
| AAT* | 3 | 99.333 | 0.5774 | 99.000 | 100.000 |
| PBV* | 3 | 150.667 | 10.0167 | 141.000 | 161.000 |
| Ca | 4 | 1.275 | 0.2754 | 1.000 | 1.600 |
| P | 4 | 5.400 | 0.3916 | 5.000 | 5.900 |
| Mg | 4 | 1.550 | 0.1291 | 1.400 | 1.700 |
| K | 4 | 13.075 | 1.1730 | 11.900 | 14.400 |
| Na | 4 | 0.125 | 0.0500 | 0.100 | 0.200 |
| S | 4 | 1.725 | 0.2217 | 1.400 | 1.900 |
| CAB | 4 | 203.852 | 31.2445 | 161.777 | 236.313 |
| Fe | 4 | 67.000 | 1.4142 | 65.000 | 68.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn | 4 | 20.250 | 1.2583 | 19.000 | 22.000 |
| Zn | 4 | 55.750 | 4.0311 | 51.000 | 60.000 |
| Cu | 4 | 18.725 | 4.1764 | 13.200 | 23.100 |
| Se | 1 | 0.009 | . | 0.009 | 0.009 |

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 8 | 317.250 | 46.2068 | 236.000 | 372.000 |
| Aska | 8 | 33.750 | 5.9702 | 28.000 | 46.000 |
| OS smbh | 8 | 78.188 | 2.1397 | 75.200 | 81.600 |
| Råprot | 8 | 65.625 | 11.4759 | 53.000 | 89.000 |
| sRåprot | 8 | 380.875 | 23.4426 | 336.000 | 409.000 |
| NDF | 8 | 367.500 | 51.7080 | 280.000 | 441.000 |
| iNDF | 8 | 177.487 | 18.5793 | 158.458 | 218.000 |
| nhNDF | 8 | 4.041 | 0.3791 | 3.694 | 4.881 |
| Stä | 8 | 305.500 | 62.0346 | 210.000 | 396.000 |
| TAF | 8 | 50.000 | 19.7990 | 1.000 | 57.000 |
| Mjölksyra | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Ättiksyra | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 8 | 58.000 | 35.2258 | 1.000 | 95.000 |
| PRF | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| BUF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 8 | 89.585 | 4.7474 | 85.466 | 100.483 |
| PBVp20 | 8 | -74.192 | 6.2030 | -81.886 | -62.069 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20 | 8 | 6.484 | 0.2292 | 6.140 | 6.763 |
| OE* | 3 | 11.563 | 0.9555 | 10.700 | 12.590 |
| AAT* | 2 | 79.500 | 0.7071 | 79.000 | 80.000 |
| PBV* | 2 | -71.000 | 2.8284 | -73.000 | -69.000 |
| Ca | 8 | 1.713 | 0.3441 | 1.100 | 2.100 |
| P | 8 | 2.175 | 0.2375 | 1.900 | 2.500 |
| Mg | 8 | 1.112 | 0.2295 | 0.800 | 1.600 |
| K | 8 | 9.725 | 1.5926 | 8.000 | 13.100 |
| Na | 8 | 0.300 | 0.2390 | 0.100 | 0.700 |
| Cl | 7 | 1.871 | 0.4461 | 1.200 | 2.500 |
| S | 8 | 0.888 | 0.0991 | 0.800 | 1.000 |
| CAB | 8 | 155.240 | 34.7113 | 111.363 | 210.811 |
| Fe | 7 | 84.286 | 30.3519 | 59.000 | 147.000 |
| Mn | 7 | 32.286 | 9.6732 | 16.000 | 46.000 |
| Zn | 7 | 25.000 | 7.3937 | 17.000 | 39.000 |
| Cu | 7 | 3.243 | 0.4721 | 2.700 | 4.000 |
| Se | 1 | 0.006 | . | 0.006 | 0.006 |

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 230.000 | . | 230.000 | 230.000 |
| Aska | 1 | 53.000 | . | 53.000 | 53.000 |
| OS smbh | 1 | 66.300 | . | 66.300 | 66.300 |
| Råprot | 1 | 100.000 | . | 100.000 | 100.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 1 | 667.000 | . | 667.000 | 667.000 |
| iNDF | 1 | 189.345 | . | 189.345 | 189.345 |
| nhNDF | 1 | 4.236 | . | 4.236 | 4.236 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 1 | 66.000 | . | 66.000 | 66.000 |
| AATp20 | 1 | 88.494 | . | 88.494 | 88.494 |
| PBVp20 | 1 | -33.192 | . | -33.192 | -33.192 |
| NELp20 | 1 | 5.389 | . | 5.389 | 5.389 |
| OE* | 1 | 9.700 | . | 9.700 | 9.700 |

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 217.000 | . | 217.000 | 217.000 |
| Aska | 1 | 67.000 | . | 67.000 | 67.000 |
| OS smbh | 1 | 76.500 | . | 76.500 | 76.500 |
| Råprot | 1 | 147.000 | . | 147.000 | 147.000 |
| NDF | 1 | 562.000 | . | 562.000 | 562.000 |
| iNDF | 1 | 119.123 | . | 119.123 | 119.123 |
| nhNDF | 1 | 5.811 | . | 5.811 | 5.811 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 1 | 70.000 | . | 70.000 | 70.000 |
| AATp20 | 1 | 102.037 | . | 102.037 | 102.037 |
| PBVp20 | 1 | -11.663 | . | -11.663 | -11.663 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20 | 1 | 6.346 | . | 6.346 | 6.346 |
| OE* | 1 | 11.200 | . | 11.200 | 11.200 |

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 418.000 | . | 418.000 | 418.000 |
| Aska | 1 | 97.000 | . | 97.000 | 97.000 |
| OS smbh | 1 | 68.200 | . | 68.200 | 68.200 |
| Råprot | 1 | 56.000 | . | 56.000 | 56.000 |
| NDF | 1 | 502.000 | . | 502.000 | 502.000 |
| iNDF | 1 | 216.448 | . | 216.448 | 216.448 |
| nhNDF | 1 | 3.543 | . | 3.543 | 3.543 |
| TAF | 1 | 61.000 | . | 61.000 | 61.000 |
| Socket | 1 | 137.000 | . | 137.000 | 137.000 |
| AATp20 | 1 | 72.026 | . | 72.026 | 72.026 |
| PBVp20 | 1 | -49.824 | . | -49.824 | -49.824 |
| NELp20 | 1 | 5.066 | . | 5.066 | 5.066 |
| OE* | 1 | 9.500 | . | 9.500 | 9.500 |
| AAT* | 1 | 68.000 | . | 68.000 | 68.000 |
| PBV* | 1 | -60.000 | . | -60.000 | -60.000 |
| Ca | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |
| P | 1 | 2.200 | . | 2.200 | 2.200 |
| Mg | 1 | 1.500 | . | 1.500 | 1.500 |
| K | 1 | 20.100 | . | 20.100 | 20.100 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na | 1 | 0.400 | . | 0.400 | 0.400 |
| S | 1 | 1.700 | . | 1.700 | 1.700 |
| CAB | 1 | 284.363 | . | 284.363 | 284.363 |
| Fe | 1 | 68.000 | . | 68.000 | 68.000 |
| Mn | 1 | 100.000 | . | 100.000 | 100.000 |
| Zn | 1 | 12.000 | . | 12.000 | 12.000 |
| Cu | 1 | 2.900 | . | 2.900 | 2.900 |
| Se | 1 | 0.012 | . | 0.012 | 0.012 |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 622.000 | 176.777 | 497.000 | 747.000 |
| Aska | 2 | 63.500 | 17.678 | 51.000 | 76.000 |
| OS smbh | 2 | 71.850 | 1.061 | 71.100 | 72.600 |
| Råprot | 2 | 122.500 | 16.263 | 111.000 | 134.000 |
| sRåprot | 2 | 396.000 | 255.973 | 215.000 | 577.000 |
| NH3-N | 2 | 53.000 | 59.397 | 11.000 | 95.000 |
| NDF | 2 | 488.000 | 19.799 | 474.000 | 502.000 |
| iNDF | 2 | 192.209 | 25.730 | 174.016 | 210.403 |
| nhNDF | 2 | 3.869 | 0.545 | 3.484 | 4.255 |
| TAF | 2 | 27.500 | 31.113 | 5.500 | 49.500 |
| Mjölksyra | 2 | 21.000 | 25.456 | 3.000 | 39.000 |
| Ättiksyra | 2 | 4.500 | 4.950 | 1.000 | 8.000 |
| Socker | 2 | 105.000 | 66.468 | 58.000 | 152.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| BUF | 2 | 1.000 | 0.707 | 0.500 | 1.500 |
| AATp20 | 2 | 85.867 | 6.262 | 81.439 | 90.295 |
| PBVp20 | 2 | -10.503 | 24.796 | -28.037 | 7.030 |
| NELp20 | 2 | 5.697 | 0.237 | 5.529 | 5.865 |
| OE* | 2 | 10.500 | 0.000 | 10.500 | 10.500 |
| AAT* | 2 | 70.000 | 0.000 | 70.000 | 70.000 |
| PBV* | 2 | 1.500 | 16.263 | -10.000 | 13.000 |
| Ca | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |
| P | 1 | 3.300 | . | 3.300 | 3.300 |
| Mg | 1 | 2.200 | . | 2.200 | 2.200 |
| K | 1 | 24.300 | . | 24.300 | 24.300 |
| Na | 1 | 0.600 | . | 0.600 | 0.600 |
| Cl | 2 | 5.800 | 3.253 | 3.500 | 8.100 |
| S | 1 | 2.300 | . | 2.300 | 2.300 |
| CAB | 1 | 275.651 | . | 275.651 | 275.651 |
| Fe | 1 | 145.000 | . | 145.000 | 145.000 |
| Mn | 1 | 89.000 | . | 89.000 | 89.000 |
| Zn | 1 | 29.000 | . | 29.000 | 29.000 |
| Cu | 1 | 5.800 | . | 5.800 | 5.800 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 15 | 374.133 | 133.153 | 273.000 | 550.000 |
| Aska | 15 | 68.000 | 11.148 | 57.000 | 81.000 |
| OS smbh | 15 | 73.140 | 4.142 | 67.900 | 77.200 |
| Råprot | 15 | 142.467 | 31.904 | 118.000 | 193.000 |
| sRåprot | 15 | 654.000 | 99.131 | 507.000 | 758.000 |
| NH3-N | 15 | 101.133 | 41.749 | 59.000 | 169.000 |
| NDF | 15 | 505.667 | 55.296 | 460.000 | 582.000 |
| iNDF | 15 | 166.904 | 29.937 | 133.778 | 199.691 |
| nhNDF | 15 | 4.409 | 0.516 | 3.907 | 5.013 |
| TAF | 15 | 70.967 | 18.233 | 43.300 | 90.100 |
| Mjölksyra | 15 | 54.733 | 16.473 | 34.000 | 74.000 |
| Ättiksyra | 15 | 11.667 | 4.203 | 6.000 | 16.000 |
| Socker | 15 | 39.667 | 31.354 | 15.000 | 73.000 |
| BUF | 15 | 3.567 | 6.174 | 0.100 | 15.000 |
| AATp20 | 15 | 79.198 | 2.554 | 74.992 | 82.170 |
| PBVp20 | 15 | 18.412 | 27.533 | -9.396 | 63.536 |
| NELp20 | 15 | 6.026 | 0.425 | 5.469 | 6.390 |
| OE* | 15 | 10.653 | 0.615 | 9.900 | 11.300 |
| AAT* | 15 | 70.467 | 1.807 | 68.000 | 72.000 |
| PBV* | 15 | 21.067 | 29.383 | -7.000 | 69.000 |
| Ca | 14 | 4.479 | 1.124 | 3.000 | 5.700 |
| P | 14 | 2.307 | 0.468 | 1.600 | 2.900 |
| Mg | 14 | 1.786 | 0.214 | 1.500 | 2.000 |
| K | 14 | 22.921 | 4.711 | 17.400 | 27.400 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na | 14 | 0.679 | 0.524 | 0.100 | 1.500 |
| Cl | 15 | 4.413 | 2.125 | 1.200 | 7.000 |
| S | 14 | 1.807 | 0.273 | 1.600 | 2.100 |
| CAB | 14 | 385.076 | 106.708 | 221.858 | 505.191 |
| Fe | 14 | 159.929 | 99.811 | 75.000 | 296.000 |
| Mn | 14 | 61.286 | 18.138 | 46.000 | 82.000 |
| Zn | 14 | 29.000 | 4.169 | 24.000 | 34.000 |
| Cu | 14 | 7.229 | 4.852 | 4.800 | 8.500 |
| Se | 5 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.011 |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 8 | 377.500 | 138.068 | 235.000 | 684.000 |
| Aska | 8 | 76.500 | 13.104 | 48.000 | 87.000 |
| OS smbh | 8 | 73.000 | 4.234 | 63.800 | 77.700 |
| Råprot | 8 | 144.125 | 32.630 | 105.000 | 197.000 |
| sRåprot | 8 | 560.500 | 99.540 | 347.000 | 677.000 |
| NH3-N | 8 | 81.125 | 30.493 | 38.000 | 114.000 |
| NDF | 8 | 471.000 | 46.562 | 415.000 | 567.000 |
| iNDF | 8 | 178.202 | 34.236 | 137.846 | 248.832 |
| nhNDF | 8 | 4.097 | 0.541 | 3.021 | 4.706 |
| TAF | 8 | 70.963 | 32.534 | 9.500 | 128.000 |
| Mjölksyra | 8 | 55.000 | 26.565 | 5.000 | 101.000 |
| Ättiksyra | 8 | 13.375 | 5.263 | 3.000 | 22.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socket | 8 | 53.000 | 36.067 | 16.000 | 121.000 |
| PRF | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |
| BUF | 8 | 1.088 | 1.082 | 0.000 | 3.400 |
| AATp20 | 8 | 80.121 | 2.549 | 77.122 | 84.252 |
| PBVp20 | 8 | 18.379 | 28.162 | -18.250 | 60.241 |
| NELp20 | 8 | 5.939 | 0.447 | 4.987 | 6.419 |
| OE* | 8 | 10.536 | 0.600 | 9.300 | 11.200 |
| AAT* | 7 | 70.286 | 1.799 | 67.000 | 72.000 |
| PBV* | 7 | 21.000 | 32.197 | -13.000 | 72.000 |
| Ca | 6 | 6.417 | 0.902 | 5.100 | 7.600 |
| P | 6 | 2.900 | 0.494 | 2.400 | 3.500 |
| Mg | 6 | 2.333 | 0.327 | 2.000 | 2.800 |
| K | 6 | 24.000 | 3.491 | 20.600 | 27.900 |
| Na | 6 | 1.283 | 0.697 | 0.500 | 2.400 |
| Cl | 8 | 6.888 | 3.068 | 1.400 | 11.200 |
| S | 6 | 2.333 | 0.288 | 1.900 | 2.700 |
| CAB | 6 | 348.657 | 76.630 | 247.991 | 475.140 |
| Fe | 5 | 138.800 | 76.162 | 62.000 | 245.000 |
| Mn | 5 | 63.400 | 27.428 | 40.000 | 107.000 |
| Zn | 5 | 26.600 | 4.561 | 23.000 | 34.000 |
| Cu | 5 | 6.740 | 0.611 | 5.700 | 7.300 |
| Se | 2 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.012 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 8 | 408.625 | 83.6249 | 328.000 | 590.000 |
| Aska | 8 | 85.000 | 8.5356 | 69.000 | 96.000 |
| OS smbh | 8 | 75.938 | 2.6608 | 71.700 | 78.800 |
| Råprot | 8 | 156.375 | 18.9807 | 126.000 | 188.000 |
| sRåprot | 8 | 572.750 | 54.7455 | 464.000 | 635.000 |
| NH3-N | 8 | 82.125 | 20.9587 | 61.000 | 124.000 |
| NDF | 8 | 444.875 | 35.6749 | 400.000 | 488.000 |
| iNDF | 8 | 149.760 | 24.0617 | 121.052 | 188.033 |
| nhNDF | 8 | 4.558 | 0.3976 | 3.952 | 5.102 |
| TAF | 8 | 71.938 | 21.7664 | 38.500 | 104.100 |
| Mjölksyra | 8 | 57.750 | 18.9718 | 28.000 | 85.000 |
| Ättiksyra | 8 | 12.375 | 3.5431 | 9.000 | 18.000 |
| Socker | 8 | 53.500 | 22.8536 | 20.000 | 98.000 |
| BUF | 8 | 0.812 | 1.4923 | 0.100 | 4.400 |
| AATp20 | 8 | 82.772 | 2.8138 | 78.653 | 86.948 |
| PBVp20 | 8 | 25.123 | 15.5273 | 4.145 | 54.677 |
| NELp20 | 8 | 6.179 | 0.2778 | 5.719 | 6.554 |
| OE* | 8 | 10.938 | 0.3926 | 10.300 | 11.400 |
| AAT* | 8 | 71.375 | 1.0607 | 70.000 | 73.000 |
| PBV* | 8 | 33.375 | 17.8880 | 6.000 | 63.000 |
| Ca | 6 | 6.767 | 1.0172 | 5.700 | 8.200 |
| P | 6 | 3.033 | 0.3559 | 2.400 | 3.300 |
| Mg | 6 | 2.483 | 0.0983 | 2.400 | 2.600 |
| K | 6 | 27.333 | 4.3223 | 19.700 | 31.700 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na | 6 | 1.583 | 1.2449 | 0.400 | 3.300 |
| Cl | 8 | 7.475 | 2.3675 | 3.500 | 10.600 |
| S | 6 | 2.450 | 0.3017 | 2.000 | 2.900 |
| CAB | 6 | 397.407 | 98.7936 | 244.410 | 505.240 |
| Fe | 6 | 112.333 | 29.6895 | 85.000 | 164.000 |
| Mn | 6 | 61.000 | 15.2840 | 40.000 | 87.000 |
| Zn | 6 | 25.833 | 2.8577 | 22.000 | 30.000 |
| Cu | 6 | 7.083 | 0.8727 | 6.000 | 8.300 |
| Se | 2 | 0.013 | 0.0057 | 0.009 | 0.017 |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 4 | 368.000 | 103.541 | 273.000 | 512.000 |
| Aska | 4 | 93.750 | 10.905 | 83.000 | 108.000 |
| OS smbh | 4 | 75.400 | 2.206 | 72.100 | 76.700 |
| Råprot | 4 | 171.500 | 14.295 | 154.000 | 189.000 |
| sRåprot | 4 | 528.000 | 48.799 | 482.000 | 596.000 |
| NH3-N | 4 | 73.750 | 13.574 | 57.000 | 90.000 |
| NDF | 4 | 417.750 | 25.356 | 397.000 | 450.000 |
| iNDF | 4 | 165.934 | 38.250 | 139.221 | 222.287 |
| nhNDF | 4 | 4.174 | 0.724 | 3.140 | 4.680 |
| TAF | 4 | 82.900 | 34.854 | 37.300 | 122.100 |
| Mjölksyra | 4 | 66.750 | 30.544 | 26.000 | 100.000 |
| Ättiksyra | 4 | 14.750 | 4.924 | 9.000 | 21.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socket | 4 | 37.250 | 33.974 | 10.000 | 86.000 |
| BUF | 4 | 0.400 | 0.600 | 0.100 | 1.300 |
| AATp20 | 4 | 82.272 | 3.661 | 79.006 | 86.570 |
| PBVp20 | 4 | 39.820 | 10.897 | 29.234 | 53.001 |
| NELp20 | 4 | 6.143 | 0.275 | 5.757 | 6.374 |
| OE* | 4 | 10.750 | 0.311 | 10.300 | 11.000 |
| AAT* | 4 | 70.500 | 1.000 | 69.000 | 71.000 |
| PBV* | 4 | 49.250 | 13.150 | 34.000 | 66.000 |
| Ca | 4 | 8.125 | 1.406 | 6.300 | 9.500 |
| P | 4 | 3.125 | 0.465 | 2.500 | 3.600 |
| Mg | 4 | 2.775 | 0.263 | 2.500 | 3.000 |
| K | 4 | 26.925 | 2.290 | 24.800 | 29.100 |
| Na | 4 | 1.700 | 1.766 | 0.500 | 4.300 |
| Cl | 4 | 9.075 | 4.318 | 4.300 | 13.300 |
| S | 4 | 2.475 | 0.330 | 2.100 | 2.800 |
| CAB | 4 | 352.211 | 82.403 | 277.830 | 434.785 |
| Fe | 4 | 159.750 | 23.027 | 137.000 | 191.000 |
| Mn | 4 | 65.750 | 15.924 | 52.000 | 88.000 |
| Zn | 4 | 24.250 | 2.363 | 21.000 | 26.000 |
| Cu | 4 | 8.325 | 1.005 | 6.900 | 9.200 |
| Se | 2 | 0.025 | 0.014 | 0.015 | 0.035 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 437.000 | 70.711 | 387.000 | 487.000 |
| Aska | 2 | 84.000 | 12.728 | 75.000 | 93.000 |
| OS smbh | 2 | 69.800 | 3.960 | 67.000 | 72.600 |
| Råprot | 2 | 120.500 | 23.335 | 104.000 | 137.000 |
| NDF | 2 | 524.500 | 34.648 | 500.000 | 549.000 |
| iNDF | 2 | 192.918 | 33.392 | 169.306 | 216.530 |
| nhNDF | 2 | 3.974 | 0.553 | 3.583 | 4.365 |
| TAF | 2 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socket | 2 | 82.000 | 9.899 | 75.000 | 89.000 |
| AATp20 | 2 | 76.980 | 4.156 | 74.041 | 79.918 |
| PBVp20 | 2 | 3.863 | 14.882 | -6.661 | 14.386 |
| NELp20 | 2 | 5.612 | 0.351 | 5.364 | 5.860 |
| OE* | 2 | 9.950 | 0.495 | 9.600 | 10.300 |
| AAT* | 2 | 70.000 | 2.828 | 68.000 | 72.000 |
| PBV* | 2 | -0.500 | 17.678 | -13.000 | 12.000 |
| Ca | 2 | 5.250 | 2.333 | 3.600 | 6.900 |
| P | 2 | 2.350 | 0.495 | 2.000 | 2.700 |
| Mg | 2 | 1.700 | 0.141 | 1.600 | 1.800 |
| K | 2 | 22.650 | 8.415 | 16.700 | 28.600 |
| Na | 2 | 0.950 | 0.071 | 0.900 | 1.000 |
| S | 2 | 2.050 | 0.495 | 1.700 | 2.400 |
| CAB | 2 | 360.069 | 181.196 | 231.944 | 488.194 |
| Fe | 2 | 89.500 | 16.263 | 78.000 | 101.000 |
| Mn | 2 | 84.000 | 19.799 | 70.000 | 98.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 2 | 23.500 | 0.707 | 23.000 | 24.000 |
| Cu | 2 | 5.300 | 1.131 | 4.500 | 6.100 |
| Se | 1 | 0.013 | . | 0.013 | 0.013 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 61 | 451.328 | 156.497 | 255.000 | 642.000 |
| Aska | 61 | 75.492 | 12.900 | 58.000 | 93.000 |
| OS smbh | 61 | 71.193 | 6.278 | 63.800 | 80.500 |
| Råprot | 61 | 126.246 | 30.206 | 90.000 | 162.000 |
| sRåprot | 2 | 465.000 | 19.799 | 451.000 | 479.000 |
| NDF | 61 | 525.967 | 61.611 | 447.000 | 595.000 |
| iNDF | 61 | 176.548 | 53.999 | 94.860 | 237.121 |
| nhNDF | 61 | 4.360 | 1.066 | 3.221 | 5.975 |
| TAF | 61 | 81.279 | 14.904 | 84.000 | 84.000 |
| Mjölksyra | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ättiksyra | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 61 | 90.754 | 48.305 | 24.000 | 142.000 |
| PRF | 2 | 1.000 | 1.414 | 0.000 | 2.000 |
| BUF | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 61 | 79.649 | 6.861 | 72.309 | 89.256 |
| PBVp20 | 61 | 4.949 | 21.193 | -23.238 | 31.872 |
| NELp20 | 61 | 5.794 | 0.570 | 5.212 | 6.622 |
| OE* | 61 | 10.256 | 0.992 | 9.200 | 11.700 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT* | 59 | 72.119 | 5.528 | 66.000 | 80.000 |
| PBV* | 59 | 3.085 | 25.294 | -31.000 | 40.000 |
| Ca | 55 | 4.804 | 1.450 | 2.900 | 6.800 |
| P | 55 | 2.493 | 0.545 | 1.800 | 3.200 |
| Mg | 55 | 1.787 | 0.419 | 1.200 | 2.300 |
| K | 55 | 25.120 | 6.441 | 16.400 | 32.900 |
| Na | 54 | 0.689 | 0.492 | 0.200 | 1.100 |
| Cl | 2 | 3.100 | 1.697 | 1.900 | 4.300 |
| S | 55 | 1.855 | 0.439 | 1.300 | 2.300 |
| CAB | 55 | 425.672 | 148.452 | 209.869 | 607.232 |
| Fe | 53 | 150.717 | 124.793 | 80.000 | 238.000 |
| Mn | 53 | 69.566 | 21.551 | 45.000 | 96.000 |
| Zn | 53 | 31.396 | 25.111 | 23.000 | 37.000 |
| Cu | 53 | 5.806 | 1.355 | 4.200 | 7.500 |
| Se | 16 | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 0.016 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 42 | 493.262 | 144.660 | 316.000 | 662.000 |
| Aska | 42 | 88.143 | 12.669 | 66.000 | 99.000 |
| OS smbh | 42 | 71.988 | 5.035 | 63.300 | 77.200 |
| Råprot | 42 | 132.214 | 32.387 | 93.000 | 176.000 |
| sRåprot | 4 | 534.750 | 155.753 | 309.000 | 661.000 |
| NDF | 42 | 498.857 | 47.163 | 450.000 | 560.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF | 42 | 175.168 | 48.608 | 118.000 | 249.424 |
| nhNDF | 42 | 4.267 | 0.770 | 3.190 | 5.322 |
| TAF | 42 | 77.262 | 21.057 | 84.000 | 84.000 |
| Mjölksyra | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ättiksyra | 4 | 11.750 | 3.948 | 6.000 | 15.000 |
| Socker | 42 | 85.833 | 39.846 | 37.000 | 144.000 |
| PRF | 4 | 0.750 | 0.957 | 0.000 | 2.000 |
| BUF | 4 | 0.750 | 1.500 | 0.000 | 3.000 |
| AATp20 | 42 | 79.913 | 6.732 | 69.960 | 87.970 |
| PBVp20 | 42 | 10.023 | 23.826 | -22.384 | 41.157 |
| NELp20 | 42 | 5.794 | 0.470 | 5.037 | 6.350 |
| OE* | 42 | 10.257 | 0.827 | 8.800 | 11.200 |
| AAT* | 38 | 71.842 | 4.559 | 63.000 | 77.000 |
| PBV* | 38 | 3.868 | 27.470 | -32.000 | 44.000 |
| Ca | 42 | 6.124 | 1.907 | 3.900 | 8.700 |
| P | 42 | 2.850 | 0.483 | 2.300 | 3.400 |
| Mg | 42 | 2.119 | 0.501 | 1.600 | 2.700 |
| K | 42 | 24.781 | 4.281 | 19.200 | 29.400 |
| Na | 42 | 0.793 | 0.646 | 0.200 | 1.300 |
| Cl | 4 | 6.525 | 4.679 | 1.200 | 10.700 |
| S | 42 | 2.152 | 0.474 | 1.500 | 2.800 |
| CAB | 42 | 396.442 | 110.220 | 271.250 | 481.928 |
| Fe | 41 | 189.366 | 193.683 | 73.000 | 262.000 |
| Mn | 41 | 86.244 | 33.213 | 50.000 | 140.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 41 | 26.683 | 10.813 | 19.000 | 32.000 |
| Cu | 41 | 6.922 | 3.621 | 4.500 | 8.700 |
| Se | 10 | 0.015 | 0.006 | 0.008 | 0.024 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 32 | 432.281 | 147.997 | 250.000 | 640.000 |
| Aska | 31 | 102.387 | 14.099 | 83.000 | 114.000 |
| OS smbh | 32 | 74.537 | 4.183 | 68.200 | 79.600 |
| Råprot | 31 | 146.323 | 19.932 | 118.000 | 167.000 |
| sRåprot | 3 | 403.667 | 122.419 | 306.000 | 541.000 |
| NDF | 31 | 459.161 | 39.265 | 422.000 | 494.000 |
| iNDF | 32 | 153.511 | 47.290 | 96.264 | 226.391 |
| nhNDF | 32 | 4.520 | 0.878 | 3.384 | 5.928 |
| TAF | 32 | 77.281 | 21.294 | 84.000 | 84.000 |
| Mjölksyra | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ättiksyra | 3 | 11.333 | 5.132 | 7.000 | 17.000 |
| Socket | 31 | 73.613 | 41.414 | 24.000 | 128.000 |
| PRF | 3 | 0.667 | 1.155 | 0.000 | 2.000 |
| BUF | 3 | 0.333 | 0.577 | 0.000 | 1.000 |
| AATp20 | 32 | 82.006 | 5.509 | 75.041 | 87.632 |
| PBVp20 | 32 | 19.642 | 19.423 | -2.756 | 41.869 |
| NELp20 | 32 | 5.975 | 0.358 | 5.429 | 6.473 |
| OE* | 31 | 10.507 | 0.726 | 9.600 | 11.300 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT* | 28 | 73.179 | 3.907 | 67.000 | 77.000 |
| PBV* | 28 | 21.932 | 18.593 | -8.000 | 46.000 |
| Ca | 30 | 7.740 | 2.382 | 4.400 | 10.650 |
| P | 30 | 3.170 | 0.433 | 2.600 | 3.650 |
| Mg | 30 | 2.430 | 0.517 | 1.700 | 3.100 |
| K | 30 | 28.540 | 4.963 | 21.850 | 35.050 |
| Na | 30 | 0.780 | 0.369 | 0.400 | 1.150 |
| Cl | 3 | 6.567 | 3.073 | 3.300 | 9.400 |
| S | 30 | 2.340 | 0.277 | 1.900 | 2.650 |
| CAB | 30 | 479.934 | 125.769 | 305.521 | 645.683 |
| Fe | 30 | 222.733 | 262.306 | 89.500 | 460.500 |
| Mn | 30 | 102.833 | 51.730 | 54.000 | 179.500 |
| Zn | 30 | 23.933 | 4.394 | 19.000 | 28.500 |
| Cu | 30 | 7.333 | 1.326 | 5.600 | 9.100 |
| Se | 6 | 0.022 | 0.015 | 0.010 | 0.050 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 20 | 387.500 | 137.055 | 247.500 | 636.000 |
| Aska | 20 | 102.850 | 13.311 | 81.500 | 118.500 |
| OS smbh | 20 | 73.725 | 4.313 | 68.150 | 79.000 |
| Råprot | 20 | 151.950 | 26.237 | 118.000 | 186.000 |
| sRåprot | 1 | 279.000 | . | 279.000 | 279.000 |
| NDF | 20 | 461.050 | 46.974 | 392.500 | 517.500 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF | 20 | 166.306 | 46.888 | 102.574 | 225.501 |
| nhNDF | 20 | 4.403 | 0.847 | 3.177 | 5.703 |
| TAF | 20 | 79.800 | 18.783 | 84.000 | 84.000 |
| Mjölksyra | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Ättiksyra | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 20 | 77.800 | 32.367 | 37.500 | 117.500 |
| PRF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| BUF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 20 | 81.360 | 6.057 | 73.941 | 88.140 |
| PBVp20 | 20 | 26.038 | 18.740 | 1.054 | 50.047 |
| NELp20 | 20 | 5.913 | 0.395 | 5.356 | 6.392 |
| OE* | 20 | 10.371 | 0.630 | 9.550 | 11.150 |
| AAT* | 19 | 72.421 | 3.355 | 67.000 | 77.000 |
| PBV* | 19 | 25.842 | 23.215 | -7.000 | 60.000 |
| Ca | 19 | 7.805 | 2.076 | 4.900 | 11.200 |
| P | 19 | 3.221 | 0.450 | 2.600 | 3.900 |
| Mg | 19 | 2.579 | 0.378 | 2.100 | 3.100 |
| K | 19 | 27.074 | 7.483 | 16.100 | 35.900 |
| Na | 19 | 1.295 | 0.455 | 0.700 | 1.900 |
| Cl | 1 | 2.300 | . | 2.300 | 2.300 |
| S | 19 | 2.611 | 0.452 | 2.100 | 3.300 |
| CAB | 19 | 456.720 | 189.067 | 156.001 | 688.018 |
| Fe | 19 | 163.737 | 82.682 | 87.000 | 291.000 |
| Mn | 19 | 105.105 | 48.652 | 48.000 | 186.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 19 | 25.789 | 4.791 | 20.000 | 34.000 |
| Cu | 19 | 7.568 | 1.448 | 6.000 | 9.600 |
| Se | 7 | 0.028 | 0.015 | 0.011 | 0.050 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 350.000 | . | 350.000 | 350.000 |
| Aska | 1 | 102.000 | . | 102.000 | 102.000 |
| OS smbh | 1 | 84.800 | . | 84.800 | 84.800 |
| Råprot | 1 | 204.000 | . | 204.000 | 204.000 |
| NDF | 1 | 359.000 | . | 359.000 | 359.000 |
| iNDF | 1 | 55.710 | . | 55.710 | 55.710 |
| nhNDF | 1 | 7.410 | . | 7.410 | 7.410 |
| TAF | 1 | 84.000 | . | 84.000 | 84.000 |
| Socket | 1 | 121.000 | . | 121.000 | 121.000 |
| AATp20 | 1 | 93.847 | . | 93.847 | 93.847 |
| PBVp20 | 1 | 54.149 | . | 54.149 | 54.149 |
| NELp20 | 1 | 6.958 | . | 6.958 | 6.958 |
| OE* | 1 | 12.100 | . | 12.100 | 12.100 |
| AAT* | 1 | 81.000 | . | 81.000 | 81.000 |
| PBV* | 1 | 64.000 | . | 64.000 | 64.000 |
| Ca | 1 | 7.100 | . | 7.100 | 7.100 |
| P | 1 | 3.700 | . | 3.700 | 3.700 |
| Mg | 1 | 2.700 | . | 2.700 | 2.700 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K | 1 | 30.100 | . | 30.100 | 30.100 |
| Na | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| S | 1 | 2.800 | . | 2.800 | 2.800 |
| CAB | 1 | 505.905 | . | 505.905 | 505.905 |
| Fe | 1 | 130.000 | . | 130.000 | 130.000 |
| Mn | 1 | 100.000 | . | 100.000 | 100.000 |
| Zn | 1 | 25.000 | . | 25.000 | 25.000 |
| Cu | 1 | 8.300 | . | 8.300 | 8.300 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 43 | 389.930 | 121.750 | 273.000 | 490.000 |
| Aska | 43 | 83.860 | 24.844 | 61.000 | 99.000 |
| OS smbh | 43 | 71.447 | 5.407 | 64.500 | 77.500 |
| Råprot | 43 | 128.070 | 39.014 | 94.000 | 182.000 |
| sRåprot | 43 | 585.837 | 91.807 | 445.000 | 703.000 |
| NH3-N | 43 | 92.116 | 29.382 | 59.000 | 127.000 |
| NDF | 43 | 481.140 | 69.773 | 399.000 | 567.000 |
| iNDF | 43 | 188.484 | 42.552 | 138.262 | 239.675 |
| nhNDF | 43 | 3.944 | 0.664 | 3.163 | 4.782 |
| TAF | 43 | 69.267 | 25.716 | 37.500 | 103.100 |
| Mjölksyra | 43 | 53.767 | 23.754 | 24.000 | 85.000 |
| Ättiksyra | 43 | 12.372 | 4.287 | 7.000 | 17.000 |
| Socker | 43 | 46.302 | 31.302 | 15.000 | 97.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| BUF | 43 | 2.128 | 3.144 | 0.100 | 3.900 |
| AATp20 | 43 | 77.982 | 5.133 | 71.480 | 83.366 |
| PBVp20 | 43 | 9.275 | 30.525 | -19.828 | 48.030 |
| NELp20 | 43 | 5.743 | 0.558 | 5.124 | 6.349 |
| OE* | 43 | 10.202 | 0.847 | 9.300 | 11.300 |
| AAT* | 43 | 69.186 | 2.462 | 67.000 | 72.000 |
| PBV* | 43 | 9.070 | 35.399 | -26.000 | 57.000 |
| Ca | 38 | 6.037 | 2.416 | 3.100 | 9.400 |
| P | 38 | 2.634 | 0.622 | 1.700 | 3.400 |
| Mg | 38 | 2.147 | 0.766 | 1.200 | 3.100 |
| K | 38 | 23.587 | 5.448 | 16.900 | 29.600 |
| Na | 38 | 1.126 | 1.153 | 0.100 | 2.500 |
| Cl | 43 | 7.214 | 4.235 | 2.700 | 12.400 |
| S | 38 | 1.855 | 0.587 | 1.200 | 2.700 |
| CAB | 38 | 339.670 | 110.982 | 189.472 | 468.175 |
| Fe | 38 | 325.316 | 559.701 | 95.000 | 516.000 |
| Mn | 38 | 94.974 | 41.994 | 48.000 | 146.000 |
| Zn | 38 | 30.974 | 19.748 | 16.000 | 43.000 |
| Cu | 38 | 6.829 | 3.802 | 4.200 | 9.500 |
| Se | 8 | 0.026 | 0.012 | 0.007 | 0.046 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 312 | 398.808 | 123.021 | 272.000 | 556.000 |
| Aska | 312 | 69.830 | 11.897 | 57.000 | 83.000 |
| OS smbh | 314 | 72.014 | 4.257 | 66.600 | 77.400 |
| Råprot | 312 | 127.801 | 28.115 | 91.000 | 162.000 |
| sRåprot | 312 | 614.699 | 83.738 | 508.000 | 707.000 |
| NH3-N | 312 | 86.792 | 33.435 | 47.000 | 127.000 |
| NDF | 312 | 507.311 | 49.216 | 441.000 | 574.000 |
| iNDF | 314 | 176.609 | 40.918 | 125.117 | 225.473 |
| nhNDF | 314 | 4.169 | 0.684 | 3.330 | 5.067 |
| Stä | 5 | 57.600 | 56.110 | 16.000 | 152.000 |
| TAF | 314 | 65.628 | 27.050 | 28.400 | 101.800 |
| Mjölksyra | 312 | 49.176 | 22.850 | 20.000 | 81.000 |
| Ättiksyra | 312 | 12.689 | 6.133 | 5.000 | 20.000 |
| Socker | 312 | 48.641 | 33.402 | 12.000 | 102.000 |
| PRF | 46 | 4.413 | 2.176 | 2.000 | 7.000 |
| BUF | 312 | 2.174 | 3.946 | 0.100 | 4.400 |
| AATp20 | 314 | 79.618 | 4.210 | 74.519 | 84.349 |
| PBVp20 | 314 | 6.605 | 22.823 | -24.380 | 35.645 |
| NELp20 | 314 | 5.897 | 0.448 | 5.305 | 6.407 |
| OE* | 312 | 10.454 | 0.655 | 9.600 | 11.300 |
| AAT* | 266 | 70.026 | 2.014 | 67.000 | 72.000 |
| PBV* | 266 | 6.376 | 25.764 | -27.000 | 38.000 |
| Ca | 289 | 4.870 | 1.262 | 3.500 | 6.500 |
| P | 289 | 2.380 | 0.480 | 1.800 | 3.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mg | 289 | 1.774 | 0.306 | 1.400 | 2.200 |
| K | 289 | 23.099 | 5.339 | 15.500 | 29.800 |
| Na | 289 | 0.689 | 0.581 | 0.100 | 1.400 |
| Cl | 312 | 4.361 | 2.312 | 1.600 | 7.500 |
| S | 289 | 1.720 | 0.426 | 1.200 | 2.300 |
| CAB | 289 | 392.733 | 123.580 | 221.124 | 540.045 |
| Fe | 261 | 182.690 | 165.363 | 77.000 | 330.000 |
| Mn | 261 | 74.471 | 26.697 | 46.000 | 115.000 |
| Zn | 261 | 26.111 | 5.529 | 20.000 | 32.000 |
| Cu | 261 | 5.633 | 1.528 | 4.100 | 7.200 |
| Se | 65 | 0.019 | 0.031 | 0.007 | 0.029 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 204 | 437.176 | 141.783 | 276.000 | 648.000 |
| Aska | 203 | 81.517 | 14.982 | 68.000 | 95.000 |
| OS smbh | 204 | 73.732 | 3.772 | 68.800 | 78.000 |
| Råprot | 203 | 137.498 | 28.847 | 101.000 | 173.000 |
| sRåprot | 203 | 526.764 | 92.012 | 407.000 | 638.000 |
| NH3-N | 201 | 74.831 | 24.541 | 45.000 | 106.000 |
| NDF | 203 | 455.562 | 47.304 | 396.000 | 517.000 |
| iNDF | 204 | 174.098 | 37.105 | 128.277 | 221.811 |
| nhNDF | 204 | 4.134 | 0.646 | 3.299 | 4.992 |
| TAF | 204 | 62.479 | 30.242 | 21.500 | 103.100 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mjölksyra | 203 | 48.517 | 24.772 | 14.000 | 83.000 |
| Ättiksyra | 203 | 11.655 | 6.238 | 4.000 | 19.000 |
| Socker | 203 | 62.571 | 39.861 | 17.000 | 113.000 |
| PRF | 16 | 3.813 | 3.016 | 0.000 | 8.000 |
| BUF | 203 | 1.003 | 1.200 | 0.100 | 2.500 |
| AATp20 | 204 | 82.269 | 4.060 | 77.769 | 87.458 |
| PBVp20 | 204 | 11.154 | 25.405 | -20.493 | 42.211 |
| NELp20 | 204 | 5.949 | 0.409 | 5.376 | 6.472 |
| OE* | 203 | 10.609 | 0.590 | 9.800 | 11.300 |
| AAT* | 187 | 70.422 | 1.804 | 68.000 | 72.000 |
| PBV* | 187 | 16.075 | 27.288 | -18.000 | 50.000 |
| Ca | 193 | 6.826 | 2.118 | 4.600 | 9.700 |
| P | 193 | 2.749 | 0.440 | 2.200 | 3.300 |
| Mg | 193 | 2.223 | 0.426 | 1.700 | 2.700 |
| K | 193 | 24.050 | 4.609 | 19.100 | 29.600 |
| Na | 193 | 0.859 | 0.719 | 0.200 | 1.700 |
| Cl | 203 | 5.845 | 2.901 | 2.500 | 9.700 |
| S | 193 | 2.050 | 0.485 | 1.400 | 2.700 |
| CAB | 193 | 359.803 | 100.296 | 226.246 | 495.372 |
| Fe | 184 | 187.560 | 164.147 | 86.000 | 311.000 |
| Mn | 184 | 82.500 | 27.795 | 54.000 | 115.000 |
| Zn | 184 | 24.739 | 5.950 | 19.000 | 32.000 |
| Cu | 184 | 6.730 | 1.475 | 4.900 | 8.700 |
| Se | 29 | 0.020 | 0.010 | 0.009 | 0.038 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 139 | 418.086 | 127.842 | 277.000 | 617.000 |
| Aska | 139 | 87.712 | 12.298 | 71.000 | 103.000 |
| OS smbh | 139 | 74.512 | 2.930 | 70.300 | 78.000 |
| Råprot | 139 | 146.050 | 23.210 | 117.000 | 175.000 |
| sRåprot | 139 | 533.863 | 92.403 | 422.000 | 647.000 |
| NH3-N | 139 | 83.245 | 34.006 | 40.000 | 132.000 |
| NDF | 139 | 434.072 | 38.662 | 385.000 | 486.000 |
| iNDF | 139 | 173.392 | 41.768 | 126.538 | 221.472 |
| nhNDF | 139 | 4.127 | 0.684 | 3.173 | 4.993 |
| TAF | 139 | 67.032 | 30.461 | 24.400 | 102.100 |
| Mjölksyra | 139 | 51.173 | 25.797 | 16.000 | 84.000 |
| Ättiksyra | 139 | 12.698 | 5.598 | 5.000 | 21.000 |
| Socker | 139 | 59.806 | 37.113 | 14.000 | 109.000 |
| PRF | 17 | 3.941 | 1.983 | 1.000 | 7.000 |
| BUF | 139 | 1.802 | 3.708 | 0.100 | 3.900 |
| AATp20 | 139 | 82.407 | 4.791 | 76.540 | 88.299 |
| PBVp20 | 139 | 18.816 | 21.906 | -7.999 | 48.104 |
| NELp20 | 139 | 6.005 | 0.319 | 5.528 | 6.453 |
| OE* | 139 | 10.665 | 0.492 | 10.000 | 11.200 |
| AAT* | 122 | 70.639 | 1.477 | 69.000 | 72.000 |
| PBV* | 122 | 24.984 | 23.244 | -3.000 | 52.000 |
| Ca | 129 | 7.350 | 2.205 | 5.100 | 10.100 |
| P | 129 | 2.972 | 0.456 | 2.400 | 3.500 |
| Mg | 129 | 2.422 | 0.454 | 1.900 | 3.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K | 129 | 25.354 | 5.278 | 17.400 | 31.800 |
| Na | 129 | 1.170 | 1.574 | 0.400 | 2.100 |
| Cl | 139 | 6.170 | 3.098 | 2.300 | 10.700 |
| S | 129 | 2.233 | 0.438 | 1.600 | 2.700 |
| CAB | 129 | 387.482 | 124.533 | 232.553 | 519.392 |
| Fe | 122 | 231.008 | 162.415 | 99.000 | 412.000 |
| Mn | 122 | 99.262 | 40.623 | 59.000 | 145.000 |
| Zn | 122 | 24.689 | 5.760 | 19.000 | 30.000 |
| Cu | 122 | 7.179 | 1.361 | 5.700 | 8.700 |
| Se | 17 | 0.029 | 0.019 | 0.010 | 0.056 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 46 | 378.891 | 106.061 | 274.000 | 508.000 |
| Aska | 46 | 95.522 | 22.785 | 77.000 | 107.000 |
| OS smbh | 46 | 75.559 | 2.709 | 73.000 | 78.500 |
| Råprot | 46 | 147.500 | 21.737 | 110.000 | 173.000 |
| sRåprot | 46 | 569.565 | 68.347 | 501.000 | 652.000 |
| NH3-N | 46 | 83.935 | 25.648 | 49.000 | 104.000 |
| NDF | 46 | 421.761 | 33.553 | 373.000 | 462.000 |
| iNDF | 46 | 160.483 | 29.667 | 121.000 | 197.866 |
| nhNDF | 46 | 4.295 | 0.433 | 3.680 | 4.811 |
| TAF | 46 | 82.711 | 34.873 | 32.000 | 117.100 |
| Mjölksyra | 46 | 64.022 | 29.556 | 23.000 | 97.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ättiksyra | 46 | 15.978 | 6.692 | 6.000 | 24.000 |
| Socker | 46 | 48.478 | 35.117 | 13.000 | 105.000 |
| PRF | 10 | 3.500 | 2.121 | 1.000 | 6.000 |
| BUF | 46 | 1.167 | 2.089 | 0.000 | 3.600 |
| AATp20 | 46 | 80.721 | 5.055 | 75.915 | 87.116 |
| PBVp20 | 46 | 22.686 | 19.185 | -1.140 | 42.693 |
| NELp20 | 46 | 6.109 | 0.329 | 5.849 | 6.465 |
| OE* | 46 | 10.748 | 0.576 | 10.400 | 11.300 |
| AAT* | 36 | 70.750 | 1.903 | 70.000 | 73.000 |
| PBV* | 36 | 23.722 | 22.368 | -7.000 | 52.000 |
| Ca | 40 | 6.950 | 1.373 | 5.450 | 8.950 |
| P | 40 | 3.198 | 0.515 | 2.550 | 3.800 |
| Mg | 40 | 2.465 | 0.331 | 2.100 | 2.900 |
| K | 40 | 25.850 | 4.700 | 19.750 | 32.400 |
| Na | 40 | 1.303 | 0.607 | 0.650 | 2.200 |
| Cl | 46 | 6.983 | 3.040 | 3.600 | 11.100 |
| S | 40 | 2.605 | 0.474 | 2.050 | 3.150 |
| CAB | 40 | 367.126 | 84.305 | 272.022 | 468.614 |
| Fe | 34 | 387.588 | 819.620 | 129.000 | 446.000 |
| Mn | 34 | 106.588 | 31.989 | 72.000 | 146.000 |
| Zn | 34 | 24.824 | 6.216 | 19.000 | 30.000 |
| Cu | 34 | 7.000 | 1.083 | 5.900 | 8.500 |
| Se | 5 | 0.031 | 0.018 | 0.016 | 0.050 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 425.000 | 101.823 | 353.000 | 497.000 |
| Aska | 2 | 90.500 | 16.263 | 79.000 | 102.000 |
| OS smbh | 2 | 76.500 | 7.212 | 71.400 | 81.600 |
| Råprot | 2 | 154.500 | 47.376 | 121.000 | 188.000 |
| sRåprot | 2 | 576.500 | 2.121 | 575.000 | 578.000 |
| NH3-N | 2 | 63.000 | 8.485 | 57.000 | 69.000 |
| NDF | 2 | 419.000 | 50.912 | 383.000 | 455.000 |
| iNDF | 2 | 148.849 | 89.310 | 85.697 | 212.000 |
| nhNDF | 2 | 4.653 | 1.427 | 3.644 | 5.662 |
| TAF | 2 | 60.200 | 49.215 | 25.400 | 95.000 |
| Mjölksyra | 2 | 43.500 | 37.477 | 17.000 | 70.000 |
| Ättiksyra | 2 | 14.000 | 11.314 | 6.000 | 22.000 |
| Socker | 2 | 69.500 | 70.004 | 20.000 | 119.000 |
| PRF | 1 | 3.000 | . | 3.000 | 3.000 |
| BUF | 2 | 0.700 | 0.990 | 0.000 | 1.400 |
| AATp20 | 2 | 84.229 | 12.445 | 75.428 | 93.029 |
| PBVp20 | 2 | 23.727 | 24.161 | 6.642 | 40.811 |
| NELp20 | 2 | 6.182 | 0.488 | 5.837 | 6.527 |
| OE* | 2 | 10.930 | 0.948 | 10.260 | 11.600 |
| AAT* | 1 | 73.000 | . | 73.000 | 73.000 |
| PBV* | 1 | 62.000 | . | 62.000 | 62.000 |
| Ca | 2 | 5.050 | 1.061 | 4.300 | 5.800 |
| P | 2 | 2.650 | 0.495 | 2.300 | 3.000 |
| Mg | 2 | 2.350 | 0.495 | 2.000 | 2.700 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K | 2 | 24.400 | 9.899 | 17.400 | 31.400 |
| Na | 2 | 0.850 | 0.212 | 0.700 | 1.000 |
| Cl | 2 | 4.700 | 4.950 | 1.200 | 8.200 |
| S | 2 | 2.950 | 0.778 | 2.400 | 3.500 |
| CAB | 2 | 344.228 | 55.918 | 304.688 | 383.768 |
| Fe | 2 | 334.500 | 324.562 | 105.000 | 564.000 |
| Mn | 2 | 94.000 | 21.213 | 79.000 | 109.000 |
| Zn | 2 | 395.500 | 521.138 | 27.000 | 764.000 |
| Cu | 2 | 7.050 | 0.071 | 7.000 | 7.100 |
| Se | 1 | 0.050 | . | 0.050 | 0.050 |

Fodermedel=Helsäd & baljv. flera >51% baljv (178) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 427.000 | . | 427.000 | 427.000 |
| OS smbh | 1 | 70.600 | . | 70.600 | 70.600 |
| Råprot | 1 | 95.000 | . | 95.000 | 95.000 |
| iNDF | 1 | 370.530 | . | 370.530 | 370.530 |
| nhNDF | 1 | 5.363 | . | 5.363 | 5.363 |
| TAF | 1 | 117.000 | . | 117.000 | 117.000 |
| AATp20 | 1 | 68.343 | . | 68.343 | 68.343 |
| PBVp20 | 1 | -8.300 | . | -8.300 | -8.300 |
| NELp20 | 1 | 5.691 | . | 5.691 | 5.691 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 7 | 365.429 | 56.935 | 259.000 | 434.000 |
| Aska | 7 | 58.286 | 19.619 | 34.000 | 91.000 |
| OS smbh | 7 | 66.086 | 3.474 | 61.300 | 69.800 |
| Råprot | 7 | 93.429 | 19.730 | 74.000 | 130.000 |
| sRåprot | 7 | 625.857 | 83.125 | 519.000 | 722.000 |
| NH3-N | 7 | 80.714 | 29.119 | 28.000 | 103.000 |
| NDF | 7 | 448.143 | 27.649 | 400.000 | 480.000 |
| iNDF | 7 | 280.948 | 39.851 | 222.608 | 338.633 |
| nhNDF | 7 | 2.431 | 0.534 | 1.761 | 3.297 |
| Stä | 7 | 114.571 | 68.178 | 22.000 | 195.000 |
| TAF | 7 | 81.029 | 22.814 | 51.700 | 120.700 |
| Mjölksyra | 7 | 66.000 | 20.857 | 44.000 | 104.000 |
| Ättiksyra | 7 | 12.857 | 3.579 | 6.000 | 16.000 |
| Socker | 7 | 37.857 | 23.892 | 17.000 | 69.000 |
| PRF | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |
| BUF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 7 | 66.315 | 5.410 | 56.056 | 72.679 |
| PBVp20 | 7 | -12.276 | 18.759 | -38.910 | 15.488 |
| NELp20 | 7 | 5.346 | 0.333 | 4.862 | 5.682 |
| OE* | 4 | 9.965 | 0.047 | 9.900 | 10.000 |
| AAT* | 3 | 62.667 | 2.309 | 60.000 | 64.000 |
| PBV* | 3 | -21.667 | 25.736 | -38.000 | 8.000 |
| Ca | 7 | 4.400 | 2.072 | 2.000 | 8.100 |
| P | 7 | 2.557 | 0.583 | 1.700 | 3.200 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mg | 7 | 1.543 | 0.412 | 0.900 | 2.100 |
| K | 7 | 15.100 | 4.795 | 9.700 | 23.400 |
| Na | 7 | 0.914 | 0.549 | 0.300 | 1.700 |
| Cl | 7 | 2.500 | 1.536 | 0.500 | 4.900 |
| S | 7 | 1.686 | 0.641 | 1.200 | 3.100 |
| CAB | 7 | 250.161 | 148.053 | -9.783 | 409.431 |
| Fe | 6 | 230.667 | 206.163 | 82.000 | 629.000 |
| Mn | 6 | 86.500 | 45.715 | 28.000 | 160.000 |
| Zn | 6 | 23.333 | 7.891 | 12.000 | 35.000 |
| Cu | 6 | 4.000 | 1.337 | 2.200 | 5.800 |
| Se | 1 | 0.145 | . | 0.145 | 0.145 |

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 403.000 | . | 403.000 | 403.000 |
| Aska | 1 | 78.000 | . | 78.000 | 78.000 |
| OS smbh | 1 | 69.500 | . | 69.500 | 69.500 |
| Råprot | 1 | 148.000 | . | 148.000 | 148.000 |
| sRåprot | 1 | 520.000 | . | 520.000 | 520.000 |
| NH3-N | 1 | 61.000 | . | 61.000 | 61.000 |
| NDF | 1 | 400.000 | . | 400.000 | 400.000 |
| iNDF | 1 | 260.995 | . | 260.995 | 260.995 |
| nhNDF | 1 | 2.622 | . | 2.622 | 2.622 |
| Stä | 1 | 65.000 | . | 65.000 | 65.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TAF | 1 | 87.000 | . | 87.000 | 87.000 |
| Mjölksyra | 1 | 73.000 | . | 73.000 | 73.000 |
| Ättiksyra | 1 | 12.000 | . | 12.000 | 12.000 |
| Socker | 1 | 30.000 | . | 30.000 | 30.000 |
| AATp20 | 1 | 72.866 | . | 72.866 | 72.866 |
| PBVp20 | 1 | 28.565 | . | 28.565 | 28.565 |
| NElp20 | 1 | 5.740 | . | 5.740 | 5.740 |
| Ca | 1 | 7.900 | . | 7.900 | 7.900 |
| P | 1 | 3.100 | . | 3.100 | 3.100 |
| Mg | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| K | 1 | 22.300 | . | 22.300 | 22.300 |
| Na | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| Cl | 1 | 1.500 | . | 1.500 | 1.500 |
| S | 1 | 1.800 | . | 1.800 | 1.800 |
| CAB | 1 | 459.057 | . | 459.057 | 459.057 |
| Fe | 1 | 182.000 | . | 182.000 | 182.000 |
| Mn | 1 | 74.000 | . | 74.000 | 74.000 |
| Zn | 1 | 28.000 | . | 28.000 | 28.000 |
| Cu | 1 | 7.400 | . | 7.400 | 7.400 |
| Se | 1 | 0.022 | . | 0.022 | 0.022 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 3 | 337.333 | 62.003 | 269.000 | 390.000 |
| Aska | 3 | 60.000 | 11.790 | 47.000 | 70.000 |
| OS smbh | 3 | 60.000 | 6.286 | 52.800 | 64.400 |
| Råprot | 3 | 114.000 | 18.358 | 101.000 | 135.000 |
| sRåprot | 3 | 603.667 | 137.747 | 452.000 | 721.000 |
| NH3-N | 3 | 134.667 | 79.952 | 73.000 | 225.000 |
| NDF | 3 | 482.667 | 34.429 | 444.000 | 510.000 |
| iNDF | 3 | 330.808 | 58.445 | 289.858 | 397.739 |
| nhNDF | 3 | 1.949 | 0.615 | 1.257 | 2.431 |
| Stä | 3 | 118.333 | 25.541 | 98.000 | 147.000 |
| TAF | 3 | 61.233 | 9.292 | 54.900 | 71.900 |
| Mjölksyra | 3 | 46.000 | 11.533 | 37.000 | 59.000 |
| Ättiksyra | 3 | 13.333 | 2.517 | 11.000 | 16.000 |
| Socker | 3 | 21.000 | 14.799 | 11.000 | 38.000 |
| AATp20 | 3 | 64.033 | 6.136 | 57.173 | 68.998 |
| PBVp20 | 3 | 14.344 | 27.386 | -6.177 | 45.441 |
| NELp20 | 3 | 4.848 | 0.525 | 4.244 | 5.199 |
| OE* | 2 | 9.900 | 0.141 | 9.800 | 10.000 |
| AAT* | 2 | 63.500 | 3.536 | 61.000 | 66.000 |
| PBV* | 2 | -18.500 | 6.364 | -23.000 | -14.000 |
| Ca | 3 | 4.833 | 1.419 | 3.300 | 6.100 |
| P | 3 | 2.667 | 0.379 | 2.400 | 3.100 |
| Mg | 3 | 1.700 | 0.173 | 1.600 | 1.900 |
| K | 3 | 13.967 | 1.662 | 12.200 | 15.500 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na | 3 | 1.267 | 0.643 | 0.800 | 2.000 |
| Cl | 3 | 1.800 | 0.400 | 1.400 | 2.200 |
| S | 3 | 1.300 | 0.100 | 1.200 | 1.400 |
| CAB | 3 | 280.322 | 32.192 | 255.755 | 316.765 |
| Fe | 3 | 221.333 | 190.474 | 102.000 | 441.000 |
| Mn | 3 | 62.333 | 20.648 | 48.000 | 86.000 |
| Zn | 3 | 30.333 | 7.095 | 24.000 | 38.000 |
| Cu | 3 | 7.133 | 5.096 | 3.800 | 13.000 |

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 6 | 372.833 | 77.008 | 262.000 | 443.000 |
| Aska | 6 | 73.167 | 10.226 | 62.000 | 88.000 |
| OS smbh | 6 | 66.167 | 3.785 | 61.800 | 71.200 |
| Råprot | 6 | 114.333 | 10.386 | 101.000 | 131.000 |
| sRåprot | 6 | 633.333 | 53.264 | 553.000 | 689.000 |
| NH3-N | 6 | 107.833 | 14.986 | 81.000 | 125.000 |
| NDF | 6 | 445.167 | 44.179 | 388.000 | 503.000 |
| iNDF | 6 | 429.372 | 64.255 | 375.144 | 513.911 |
| nhNDF | 6 | 6.004 | 1.799 | 2.834 | 7.694 |
| Stä | 6 | 104.667 | 49.838 | 39.000 | 167.000 |
| TAF | 6 | 67.917 | 22.379 | 42.500 | 96.500 |
| Mjölksyra | 6 | 51.167 | 15.753 | 33.000 | 71.000 |
| Ättiksyra | 6 | 15.333 | 6.250 | 8.000 | 25.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socket | 6 | 28.333 | 14.264 | 6.000 | 40.000 |
| PRF | 1 | 4.000 | . | 4.000 | 4.000 |
| BUF | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| AATp20 | 6 | 68.475 | 3.175 | 65.261 | 72.899 |
| PBVp20 | 6 | 6.591 | 8.199 | -0.809 | 19.649 |
| NELp20 | 6 | 5.387 | 0.360 | 4.938 | 5.843 |
| OE* | 4 | 9.228 | 0.147 | 9.100 | 9.400 |
| AAT* | 3 | 58.333 | 1.155 | 57.000 | 59.000 |
| PBV* | 2 | 5.500 | 17.678 | -7.000 | 18.000 |
| Ca | 6 | 4.850 | 1.290 | 3.000 | 6.500 |
| P | 6 | 2.317 | 0.279 | 2.000 | 2.700 |
| Mg | 6 | 1.617 | 0.366 | 1.300 | 2.200 |
| K | 6 | 18.633 | 4.136 | 13.200 | 25.000 |
| Na | 6 | 0.733 | 0.350 | 0.200 | 1.200 |
| Cl | 6 | 4.200 | 2.960 | 0.600 | 8.000 |
| S | 6 | 1.517 | 0.248 | 1.100 | 1.800 |
| CAB | 6 | 295.338 | 64.389 | 211.161 | 377.952 |
| Fe | 6 | 263.000 | 232.046 | 62.000 | 693.000 |
| Mn | 6 | 64.000 | 31.528 | 26.000 | 120.000 |
| Zn | 6 | 28.167 | 7.834 | 19.000 | 40.000 |
| Cu | 6 | 5.683 | 1.245 | 4.500 | 8.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 6 | 443.833 | 104.584 | 322.000 | 636.000 |
| Aska | 6 | 62.167 | 14.372 | 49.000 | 89.000 |
| OS smbh | 6 | 64.150 | 1.967 | 61.200 | 66.500 |
| Råprot | 6 | 80.000 | 22.935 | 56.000 | 124.000 |
| sRåprot | 6 | 562.167 | 139.783 | 397.000 | 727.000 |
| NH3-N | 6 | 79.167 | 27.469 | 42.000 | 114.000 |
| NDF | 6 | 469.167 | 72.048 | 373.000 | 558.000 |
| iNDF | 6 | 303.943 | 45.894 | 247.647 | 347.827 |
| nhNDF | 6 | 2.392 | 0.628 | 1.627 | 3.120 |
| Stä | 6 | 117.167 | 75.761 | 18.000 | 207.000 |
| TAF | 6 | 63.333 | 29.255 | 11.000 | 94.000 |
| Mjölksyra | 6 | 45.667 | 20.887 | 6.000 | 64.000 |
| Ättiksyra | 6 | 15.500 | 9.138 | 5.000 | 27.000 |
| Socker | 6 | 39.167 | 37.440 | 11.000 | 113.000 |
| PRF | 1 | 8.000 | . | 8.000 | 8.000 |
| BUF | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |
| AATp20 | 6 | 69.985 | 3.977 | 65.507 | 76.834 |
| PBVp20 | 6 | -28.306 | 25.424 | -60.386 | 17.551 |
| NELp20 | 6 | 5.235 | 0.222 | 5.036 | 5.550 |
| OE* | 3 | 9.747 | 0.234 | 9.540 | 10.000 |
| AAT* | 2 | 64.500 | 0.707 | 64.000 | 65.000 |
| PBV* | 2 | -46.500 | 0.707 | -47.000 | -46.000 |
| Ca | 6 | 3.600 | 0.600 | 2.700 | 4.500 |
| P | 6 | 2.483 | 0.621 | 1.900 | 3.300 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mg | 6 | 1.550 | 0.418 | 1.100 | 2.300 |
| K | 6 | 17.417 | 8.107 | 12.600 | 33.800 |
| Na | 6 | 0.700 | 0.559 | 0.300 | 1.800 |
| Cl | 6 | 2.733 | 1.445 | 0.800 | 4.600 |
| S | 6 | 1.333 | 0.301 | 0.800 | 1.700 |
| CAB | 6 | 315.545 | 176.362 | 189.255 | 666.666 |
| Fe | 5 | 165.800 | 112.124 | 75.000 | 349.000 |
| Mn | 5 | 134.400 | 91.514 | 38.000 | 243.000 |
| Zn | 5 | 24.600 | 5.683 | 18.000 | 33.000 |
| Cu | 5 | 3.920 | 0.657 | 2.800 | 4.400 |
| Se | 1 | 0.031 | . | 0.031 | 0.031 |

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 4 | 332.500 | 126.729 | 245.000 | 516.000 |
| Aska | 4 | 79.500 | 9.037 | 69.000 | 88.000 |
| OS smbh | 4 | 64.375 | 2.629 | 61.500 | 67.600 |
| Råprot | 4 | 112.000 | 10.033 | 101.000 | 121.000 |
| sRåprot | 4 | 609.250 | 105.775 | 491.000 | 715.000 |
| NH3-N | 4 | 118.500 | 40.245 | 91.000 | 177.000 |
| NDF | 4 | 481.500 | 26.464 | 445.000 | 502.000 |
| iNDF | 4 | 275.657 | 21.649 | 254.412 | 294.591 |
| nhNDF | 4 | 2.621 | 0.273 | 2.348 | 2.946 |
| Stä | 4 | 50.500 | 39.653 | 18.000 | 104.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TAF | 4 | 76.750 | 37.456 | 40.000 | 127.000 |
| Mjölksyra | 4 | 56.750 | 34.731 | 25.000 | 106.000 |
| Ättiksyra | 4 | 20.000 | 6.633 | 15.000 | 29.000 |
| Socker | 4 | 30.750 | 28.906 | 14.000 | 74.000 |
| AATp20 | 4 | 64.387 | 3.529 | 61.102 | 67.487 |
| PBVp20 | 4 | 10.426 | 10.644 | -3.740 | 21.963 |
| NELp20 | 4 | 5.165 | 0.304 | 4.924 | 5.606 |
| Ca | 4 | 6.975 | 1.740 | 5.200 | 9.000 |
| P | 4 | 2.500 | 0.183 | 2.300 | 2.700 |
| Mg | 4 | 1.625 | 0.150 | 1.500 | 1.800 |
| K | 4 | 18.150 | 1.196 | 16.800 | 19.300 |
| Na | 4 | 0.300 | 0.183 | 0.100 | 0.500 |
| Cl | 4 | 4.575 | 2.066 | 2.800 | 7.400 |
| S | 4 | 1.425 | 0.320 | 1.200 | 1.900 |
| CAB | 4 | 259.302 | 79.233 | 168.467 | 355.222 |
| Fe | 4 | 243.000 | 178.505 | 79.000 | 433.000 |
| Mn | 4 | 88.000 | 20.281 | 63.000 | 105.000 |
| Zn | 4 | 27.250 | 2.217 | 25.000 | 30.000 |
| Cu | 4 | 5.850 | 1.387 | 4.600 | 7.700 |
| Se | 1 | 0.017 | . | 0.017 | 0.017 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 6 | 334.000 | 70.541 | 193.000 | 381.000 |
| Aska | 5 | 76.400 | 12.818 | 58.000 | 90.000 |
| OS smbh | 6 | 67.875 | 2.384 | 64.000 | 71.000 |
| Råprot | 5 | 124.000 | 33.038 | 96.000 | 179.000 |
| sRåprot | 5 | 549.400 | 97.544 | 442.000 | 676.000 |
| NH3-N | 5 | 99.600 | 40.004 | 64.000 | 162.000 |
| NDF | 5 | 445.200 | 18.860 | 417.000 | 468.000 |
| iNDF | 6 | 267.984 | 25.804 | 226.779 | 299.000 |
| nhNDF | 6 | 2.776 | 0.334 | 2.407 | 3.182 |
| Stä | 5 | 78.800 | 42.423 | 17.000 | 118.000 |
| TAF | 6 | 65.487 | 39.311 | 16.500 | 122.000 |
| Mjölksyra | 5 | 45.800 | 35.759 | 8.000 | 93.000 |
| Ättiksyra | 5 | 14.600 | 7.335 | 6.000 | 25.000 |
| Socker | 5 | 49.400 | 44.870 | 15.000 | 101.000 |
| PRF | 1 | 10.000 | . | 10.000 | 10.000 |
| BUF | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| AATp20 | 6 | 69.642 | 5.236 | 62.844 | 76.209 |
| PBVp20 | 6 | 2.915 | 30.828 | -28.299 | 52.550 |
| NELp20 | 6 | 5.501 | 0.294 | 5.151 | 5.809 |
| OE* | 3 | 9.857 | 0.051 | 9.800 | 9.900 |
| AAT* | 2 | 62.000 | 0.000 | 62.000 | 62.000 |
| PBV* | 2 | -21.000 | 4.243 | -24.000 | -18.000 |
| Ca | 5 | 6.020 | 3.508 | 3.300 | 11.700 |
| P | 5 | 2.480 | 0.466 | 2.200 | 3.300 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mg | 5 | 1.880 | 0.390 | 1.300 | 2.300 |
| K | 5 | 17.860 | 2.368 | 15.600 | 21.800 |
| Na | 5 | 1.080 | 1.148 | 0.400 | 3.100 |
| Cl | 5 | 3.980 | 3.628 | 1.000 | 8.600 |
| S | 5 | 1.900 | 0.656 | 1.400 | 3.000 |
| CAB | 5 | 272.871 | 136.179 | 102.104 | 446.767 |
| Fe | 5 | 211.400 | 117.853 | 79.000 | 340.000 |
| Mn | 5 | 85.000 | 13.693 | 69.000 | 106.000 |
| Zn | 5 | 29.600 | 5.413 | 23.000 | 36.000 |
| Cu | 5 | 6.960 | 2.269 | 4.800 | 10.200 |
| Se | 2 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.011 |

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 10 | 389.500 | 61.5129 | 311.000 | 483.500 |
| Aska | 10 | 52.300 | 7.9589 | 42.000 | 63.500 |
| OS smbh | 10 | 66.440 | 3.8399 | 60.300 | 70.600 |
| Råprot | 10 | 90.000 | 12.1747 | 73.500 | 105.500 |
| sRåprot | 10 | 573.700 | 78.9966 | 477.500 | 690.500 |
| NH3-N | 10 | 81.400 | 20.5815 | 56.000 | 111.500 |
| NDF | 10 | 430.700 | 26.7999 | 392.500 | 462.500 |
| iNDF | 10 | 292.606 | 37.5877 | 254.747 | 354.153 |
| nhNDF | 10 | 2.317 | 0.4859 | 1.633 | 2.931 |
| Stä | 10 | 145.900 | 49.0203 | 84.000 | 215.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TAF | 10 | 62.900 | 17.0193 | 46.500 | 85.000 |
| Mjölksyra | 10 | 47.700 | 13.1576 | 36.000 | 67.000 |
| Ättiksyra | 10 | 14.800 | 4.8028 | 8.500 | 21.000 |
| Socket | 10 | 33.800 | 19.9098 | 11.000 | 63.000 |
| PRF | 1 | 4.000 | . | 4.000 | 4.000 |
| BUF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 10 | 70.852 | 3.5897 | 66.823 | 76.602 |
| PBVp20 | 10 | -19.436 | 13.0217 | -38.722 | -3.585 |
| NELp20 | 10 | 5.449 | 0.3396 | 4.903 | 5.774 |
| OE* | 2 | 9.765 | 0.6576 | 9.300 | 10.230 |
| AAT* | 1 | 60.000 | . | 60.000 | 60.000 |
| PBV* | 1 | -13.000 | . | -13.000 | -13.000 |
| Ca | 10 | 5.000 | 1.1585 | 3.600 | 6.900 |
| P | 10 | 2.110 | 0.2424 | 1.900 | 2.500 |
| Mg | 10 | 1.520 | 0.2781 | 1.200 | 1.950 |
| K | 10 | 15.170 | 4.1777 | 10.250 | 20.900 |
| Na | 10 | 0.630 | 0.2406 | 0.250 | 0.900 |
| Cl | 10 | 3.120 | 1.0973 | 1.600 | 4.600 |
| S | 10 | 1.330 | 0.2751 | 1.000 | 1.750 |
| CAB | 10 | 244.359 | 81.9173 | 142.382 | 368.263 |
| Fe | 10 | 123.000 | 59.3202 | 66.500 | 217.500 |
| Mn | 10 | 85.900 | 67.0662 | 30.500 | 198.500 |
| Zn | 10 | 23.000 | 7.1957 | 16.000 | 34.500 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Cu | 10 | 4.490 | 1.0354 | 2.950 | 5.700 |
| Se | 2 | 0.053 | 0.0601 | 0.010 | 0.095 |

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 41 | 325.329 | 45.353 | 272.000 | 403.000 |
| Aska | 40 | 33.575 | 7.662 | 24.500 | 44.000 |
| OS smbh | 41 | 75.876 | 1.813 | 74.000 | 78.700 |
| Råprot | 40 | 72.425 | 7.900 | 60.500 | 83.500 |
| sRåprot | 40 | 536.250 | 58.419 | 466.000 | 606.500 |
| NH3-N | 40 | 55.575 | 24.954 | 20.500 | 91.500 |
| NDF | 40 | 390.400 | 43.346 | 342.500 | 442.000 |
| iNDF | 41 | 197.066 | 29.374 | 164.561 | 232.000 |
| nhNDF | 41 | 3.575 | 0.465 | 3.025 | 4.069 |
| Stä | 40 | 266.775 | 71.732 | 170.000 | 349.000 |
| TAF | 41 | 69.366 | 11.849 | 55.000 | 80.000 |
| Mjölksyra | 40 | 49.025 | 9.096 | 38.000 | 57.000 |
| Ättiksyra | 40 | 17.500 | 6.047 | 10.500 | 26.500 |
| Socker | 40 | 15.425 | 14.126 | 0.000 | 33.500 |
| PRF | 15 | 3.200 | 1.265 | 2.000 | 5.000 |
| BUF | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 41 | 82.070 | 2.666 | 78.993 | 85.064 |
| PBVp20 | 41 | -56.108 | 7.627 | -65.939 | -45.353 |
| NELp20 | 41 | 6.398 | 0.198 | 6.157 | 6.645 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE* | 22 | 11.330 | 0.328 | 10.800 | 11.650 |
| AAT* | 7 | 79.000 | 0.816 | 78.000 | 80.000 |
| PBV* | 7 | -72.286 | 8.220 | -81.000 | -60.000 |
| Ca | 38 | 1.689 | 0.381 | 1.200 | 2.100 |
| P | 38 | 1.929 | 0.249 | 1.500 | 2.300 |
| Mg | 38 | 1.071 | 0.125 | 0.900 | 1.200 |
| K | 38 | 9.826 | 1.411 | 8.200 | 11.400 |
| Na | 38 | 0.237 | 0.136 | 0.100 | 0.500 |
| Cl | 25 | 1.884 | 0.496 | 1.300 | 2.600 |
| S | 38 | 0.874 | 0.092 | 0.800 | 1.000 |
| CAB | 38 | 157.931 | 30.173 | 119.144 | 208.546 |
| Fe | 30 | 198.633 | 391.241 | 78.500 | 271.000 |
| Mn | 30 | 32.500 | 13.258 | 16.000 | 49.000 |
| Zn | 30 | 21.867 | 5.698 | 15.000 | 30.000 |
| Cu | 30 | 3.513 | 0.994 | 2.500 | 5.000 |
| Se | 7 | 0.014 | 0.016 | 0.005 | 0.050 |

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 343.500 | 26.163 | 325.000 | 362.000 |
| Aska | 2 | 48.000 | 2.828 | 46.000 | 50.000 |
| OS smbh | 2 | 62.850 | 8.839 | 56.600 | 69.100 |
| Råprot | 2 | 128.000 | 39.598 | 100.000 | 156.000 |
| sRåprot | 2 | 565.500 | 16.263 | 554.000 | 577.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NH3-N | 2 | 84.000 | 15.556 | 73.000 | 95.000 |
| NDF | 2 | 434.000 | 104.652 | 360.000 | 508.000 |
| iNDF | 2 | 333.413 | 32.616 | 310.350 | 356.476 |
| nhNDF | 2 | 1.787 | 0.188 | 1.654 | 1.919 |
| Stä | 2 | 146.000 | 76.368 | 92.000 | 200.000 |
| TAF | 2 | 80.500 | 17.678 | 68.000 | 93.000 |
| Mjölksyra | 2 | 65.000 | 19.799 | 51.000 | 79.000 |
| Ättiksyra | 2 | 15.500 | 2.121 | 14.000 | 17.000 |
| Socker | 2 | 12.500 | 2.121 | 11.000 | 14.000 |
| AATp20 | 2 | 65.922 | 10.825 | 58.268 | 73.576 |
| PBVp20 | 2 | 24.950 | 17.788 | 12.372 | 37.528 |
| NELp20 | 2 | 5.275 | 0.769 | 4.732 | 5.819 |
| Ca | 2 | 6.750 | 0.212 | 6.600 | 6.900 |
| P | 2 | 2.450 | 0.495 | 2.100 | 2.800 |
| Mg | 2 | 1.950 | 0.071 | 1.900 | 2.000 |
| K | 2 | 14.000 | 2.687 | 12.100 | 15.900 |
| Na | 2 | 0.250 | 0.071 | 0.200 | 0.300 |
| Cl | 2 | 0.700 | 0.141 | 0.600 | 0.800 |
| S | 2 | 1.400 | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
| CAB | 2 | 261.708 | 69.631 | 212.471 | 310.944 |
| Fe | 2 | 93.500 | 0.707 | 93.000 | 94.000 |
| Mn | 2 | 72.500 | 34.648 | 48.000 | 97.000 |
| Zn | 2 | 21.000 | 0.000 | 21.000 | 21.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Cu | 2 | 5.300 | 1.131 | 4.500 | 6.100 |
| Se | 2 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.016 |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 849.000 | . | 849.000 | 849.000 |
| Aska | 1 | 49.000 | . | 49.000 | 49.000 |
| OS smbh | 1 | 45.800 | . | 45.800 | 45.800 |
| Råprot | 1 | 79.000 | . | 79.000 | 79.000 |
| NDF | 1 | 622.000 | . | 622.000 | 622.000 |
| iNDF | 1 | 388.632 | . | 388.632 | 388.632 |
| nhNDF | 1 | 1.420 | . | 1.420 | 1.420 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 1 | 79.000 | . | 79.000 | 79.000 |
| AATp20 | 1 | 64.191 | . | 64.191 | 64.191 |
| PBVp20 | 1 | -12.471 | . | -12.471 | -12.471 |
| NELp20 | 1 | 3.464 | . | 3.464 | 3.464 |
| OE* | 1 | 6.300 | . | 6.300 | 6.300 |
| AAT* | 1 | 48.000 | . | 48.000 | 48.000 |
| PBV* | 1 | -4.000 | . | -4.000 | -4.000 |
| Ca | 1 | 4.000 | . | 4.000 | 4.000 |
| P | 1 | 1.500 | . | 1.500 | 1.500 |
| Mg | 1 | 1.600 | . | 1.600 | 1.600 |
| K | 1 | 5.300 | . | 5.300 | 5.300 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na | 1 | 1.400 | . | 1.400 | 1.400 |
| S | 1 | 1.600 | . | 1.600 | 1.600 |
| CAB | 1 | -44.426 | . | -44.426 | -44.426 |
| Fe | 1 | 91.000 | . | 91.000 | 91.000 |
| Mn | 1 | 104.000 | . | 104.000 | 104.000 |
| Zn | 1 | 22.000 | . | 22.000 | 22.000 |
| Cu | 1 | 5.200 | . | 5.200 | 5.200 |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 7 | 833.143 | 63.2915 | 723.000 | 890.000 |
| Aska | 7 | 59.571 | 10.1136 | 45.000 | 75.000 |
| OS smbh | 7 | 61.157 | 8.0950 | 42.900 | 65.100 |
| Råprot | 7 | 69.429 | 20.9671 | 47.000 | 97.000 |
| sRåprot | 1 | 412.000 | . | 412.000 | 412.000 |
| NDF | 7 | 590.286 | 58.8549 | 553.000 | 722.000 |
| iNDF | 7 | 265.340 | 48.2697 | 229.081 | 351.572 |
| nhNDF | 7 | 3.088 | 0.5240 | 1.960 | 3.549 |
| TAF | 7 | 1.571 | 4.1576 | 0.000 | 11.000 |
| Mjölksyra | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Ättiksyra | 1 | 4.000 | . | 4.000 | 4.000 |
| Socker | 7 | 107.000 | 42.2414 | 19.000 | 140.000 |
| PRF | 1 | 4.000 | . | 4.000 | 4.000 |
| BUF | 1 | 3.000 | . | 3.000 | 3.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AATp20 | 7 | 77.592 | 8.5578 | 58.859 | 83.731 |
| PBVp20 | 7 | -44.414 | 17.2773 | -66.103 | -26.477 |
| NELp20 | 7 | 4.647 | 0.6253 | 3.260 | 5.037 |
| OE* | 7 | 8.761 | 1.4043 | 5.600 | 9.500 |
| AAT* | 5 | 62.000 | 10.6771 | 43.000 | 68.000 |
| PBV* | 5 | -34.000 | 22.2823 | -66.000 | -18.000 |
| Ca | 5 | 2.640 | 1.2341 | 1.300 | 4.500 |
| P | 5 | 1.780 | 0.2280 | 1.400 | 2.000 |
| Mg | 5 | 1.260 | 0.4722 | 0.700 | 2.000 |
| K | 5 | 14.200 | 2.8766 | 10.200 | 17.300 |
| Na | 5 | 0.320 | 0.2864 | 0.100 | 0.800 |
| S | 5 | 1.120 | 0.3033 | 0.700 | 1.500 |
| CAB | 5 | 166.239 | 85.8598 | 39.318 | 267.643 |
| Fe | 4 | 70.250 | 20.4185 | 53.000 | 95.000 |
| Mn | 4 | 77.750 | 32.8773 | 35.000 | 106.000 |
| Zn | 4 | 18.000 | 3.3665 | 14.000 | 22.000 |
| Cu | 4 | 3.375 | 0.3948 | 2.800 | 3.700 |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 3 | 857.333 | 45.938 | 805.000 | 891.000 |
| Aska | 3 | 59.000 | 26.665 | 38.000 | 89.000 |
| OS smbh | 3 | 57.300 | 18.739 | 37.900 | 75.300 |
| Råprot | 3 | 79.667 | 63.634 | 39.000 | 153.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 3 | 589.667 | 105.510 | 513.000 | 710.000 |
| iNDF | 3 | 284.318 | 135.286 | 136.782 | 402.549 |
| nhNDF | 3 | 2.859 | 2.003 | 1.335 | 5.128 |
| TAF | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 3 | 90.667 | 44.636 | 61.000 | 142.000 |
| AATp20 | 3 | 74.598 | 21.852 | 54.035 | 97.543 |
| PBVp20 | 3 | -29.656 | 32.137 | -63.685 | 0.178 |
| NELp20 | 3 | 4.394 | 1.580 | 2.874 | 6.027 |
| OE* | 3 | 8.067 | 2.974 | 4.900 | 10.800 |
| AAT* | 3 | 58.333 | 18.771 | 38.000 | 75.000 |
| PBV* | 3 | -20.000 | 44.508 | -65.000 | 24.000 |
| Ca | 3 | 3.000 | 2.007 | 1.600 | 5.300 |
| P | 3 | 1.467 | 0.814 | 0.900 | 2.400 |
| Mg | 3 | 1.200 | 0.794 | 0.600 | 2.100 |
| K | 3 | 15.033 | 11.360 | 7.500 | 28.100 |
| Na | 3 | 0.467 | 0.635 | 0.100 | 1.200 |
| S | 3 | 1.200 | 1.039 | 0.600 | 2.400 |
| CAB | 3 | 188.929 | 253.368 | 17.819 | 479.999 |
| Fe | 3 | 137.667 | 94.564 | 63.000 | 244.000 |
| Mn | 3 | 88.333 | 28.290 | 72.000 | 121.000 |
| Zn | 3 | 15.667 | 4.726 | 12.000 | 21.000 |
| Cu | 3 | 3.733 | 3.004 | 1.900 | 7.200 |
| Se | 1 | 0.013 | . | 0.013 | 0.013 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 4 | 348.250 | 61.6624 | 282.000 | 429.000 |
| Aska | 4 | 95.750 | 7.0887 | 91.000 | 106.000 |
| OS smbh | 4 | 71.450 | 1.0724 | 69.900 | 72.300 |
| Råprot | 4 | 147.000 | 4.9666 | 141.000 | 153.000 |
| NDF | 4 | 411.500 | 13.8924 | 395.000 | 423.000 |
| iNDF | 4 | 323.433 | 12.4048 | 311.879 | 341.035 |
| nhNDF | 4 | 5.404 | 0.1737 | 5.191 | 5.606 |
| TAF | 4 | 72.000 | 0.0000 | 72.000 | 72.000 |
| Socket | 4 | 90.500 | 23.3024 | 58.000 | 112.000 |
| AATp20 | 4 | 78.114 | 1.3868 | 76.045 | 78.914 |
| PBVp20 | 4 | 30.403 | 4.8148 | 23.817 | 34.919 |
| NELp20 | 4 | 5.661 | 0.0884 | 5.529 | 5.709 |
| OE* | 4 | 10.075 | 0.2630 | 9.700 | 10.300 |
| AAT* | 4 | 71.000 | 1.4142 | 69.000 | 72.000 |
| PBV* | 4 | 24.500 | 5.5678 | 17.000 | 30.000 |
| Ca | 4 | 11.000 | 0.9092 | 10.000 | 12.200 |
| P | 4 | 2.425 | 0.2872 | 2.000 | 2.600 |
| Mg | 4 | 3.250 | 0.3109 | 2.900 | 3.600 |
| K | 4 | 25.025 | 2.2544 | 22.000 | 27.400 |
| Na | 4 | 0.725 | 0.0957 | 0.600 | 0.800 |
| S | 4 | 2.150 | 0.1732 | 2.000 | 2.300 |
| CAB | 4 | 407.595 | 58.3313 | 338.517 | 480.972 |
| Fe | 4 | 147.250 | 76.7957 | 81.000 | 257.000 |
| Mn | 4 | 54.750 | 15.3704 | 37.000 | 73.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 4 | 25.750 | 2.0616 | 23.000 | 28.000 |
| Cu | 4 | 9.300 | 0.6218 | 8.400 | 9.800 |
| Se | 4 | 0.023 | 0.0140 | 0.013 | 0.043 |

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 8 | 407.500 | 116.090 | 213.000 | 560.000 |
| Aska | 8 | 96.500 | 11.427 | 80.000 | 111.000 |
| OS smbh | 8 | 73.000 | 3.708 | 68.100 | 78.100 |
| Råprot | 8 | 156.750 | 15.854 | 135.000 | 185.000 |
| sRåprot | 3 | 381.333 | 35.907 | 354.000 | 422.000 |
| NDF | 8 | 401.500 | 29.818 | 363.000 | 459.000 |
| iNDF | 8 | 275.723 | 88.723 | 161.554 | 387.792 |
| nhNDF | 8 | 4.786 | 0.507 | 3.769 | 5.344 |
| TAF | 8 | 45.625 | 36.418 | 0.000 | 72.000 |
| Mjölksyra | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ättiksyra | 3 | 1.667 | 2.082 | 0.000 | 4.000 |
| Socket | 8 | 85.250 | 24.010 | 48.000 | 112.000 |
| PRF | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BUF | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 8 | 82.417 | 6.399 | 75.147 | 94.623 |
| PBVp20 | 8 | 32.946 | 16.379 | 8.434 | 53.133 |
| NELp20 | 8 | 5.779 | 0.353 | 5.255 | 6.246 |
| OE* | 8 | 10.330 | 0.636 | 9.500 | 11.210 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT* | 5 | 71.600 | 3.050 | 68.000 | 76.000 |
| PBV* | 5 | 34.600 | 12.116 | 16.000 | 48.000 |
| Ca | 8 | 10.713 | 2.076 | 8.100 | 14.000 |
| P | 8 | 3.063 | 0.548 | 2.600 | 4.100 |
| Mg | 8 | 3.075 | 0.604 | 2.200 | 4.100 |
| K | 8 | 27.600 | 2.717 | 23.500 | 29.800 |
| Na | 8 | 1.013 | 0.264 | 0.700 | 1.500 |
| Cl | 3 | 5.267 | 2.309 | 2.600 | 6.600 |
| S | 8 | 2.200 | 0.262 | 1.900 | 2.700 |
| CAB | 8 | 475.784 | 51.129 | 377.967 | 536.103 |
| Fe | 6 | 100.167 | 22.754 | 81.000 | 144.000 |
| Mn | 6 | 62.000 | 13.446 | 49.000 | 86.000 |
| Zn | 6 | 24.500 | 1.975 | 22.000 | 26.000 |
| Cu | 6 | 10.483 | 2.140 | 7.500 | 12.200 |
| Se | 4 | 0.022 | 0.004 | 0.017 | 0.026 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 4 | 373.500 | 42.241 | 331.000 | 416.000 |
| Aska | 4 | 90.250 | 24.851 | 66.000 | 120.000 |
| OS smbh | 4 | 74.175 | 4.543 | 69.600 | 80.200 |
| Råprot | 4 | 159.500 | 59.669 | 114.000 | 246.000 |
| sRåprot | 4 | 593.500 | 71.970 | 498.000 | 652.000 |
| NH3-N | 4 | 83.000 | 31.549 | 54.000 | 124.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 4 | 425.500 | 116.920 | 278.000 | 542.000 |
| iNDF | 4 | 197.204 | 73.424 | 100.144 | 272.000 |
| nhNDF | 4 | 4.597 | 1.832 | 3.291 | 7.312 |
| TAF | 4 | 81.200 | 23.025 | 59.000 | 110.000 |
| Mjölksyra | 4 | 63.750 | 24.676 | 35.000 | 93.000 |
| Ättiksyra | 4 | 14.000 | 4.830 | 7.000 | 18.000 |
| Socker | 4 | 32.250 | 11.587 | 21.000 | 48.000 |
| PRF | 2 | 3.000 | 2.828 | 1.000 | 5.000 |
| BUF | 4 | 1.450 | 1.636 | 0.000 | 3.800 |
| AATp20 | 4 | 77.951 | 3.373 | 75.452 | 82.609 |
| PBVp20 | 4 | 42.667 | 53.162 | -2.051 | 118.434 |
| NELp20 | 4 | 6.103 | 0.367 | 5.763 | 6.527 |
| OE* | 4 | 10.588 | 0.599 | 10.020 | 11.200 |
| AAT* | 2 | 71.500 | 0.707 | 71.000 | 72.000 |
| PBV* | 2 | 56.000 | 91.924 | -9.000 | 121.000 |
| Ca | 4 | 8.150 | 4.022 | 4.100 | 13.100 |
| P | 4 | 3.275 | 0.846 | 2.200 | 4.200 |
| Mg | 4 | 2.275 | 0.613 | 1.700 | 2.900 |
| K | 4 | 28.825 | 9.329 | 21.100 | 42.400 |
| Na | 4 | 0.775 | 0.492 | 0.200 | 1.400 |
| Cl | 4 | 4.375 | 4.861 | 1.200 | 11.600 |
| S | 4 | 2.000 | 0.548 | 1.200 | 2.400 |
| CAB | 4 | 522.668 | 87.291 | 439.535 | 642.421 |
| Fe | 2 | 139.000 | 31.113 | 117.000 | 161.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn | 2 | 39.500 | 14.849 | 29.000 | 50.000 |
| Zn | 2 | 20.500 | 3.536 | 18.000 | 23.000 |
| Cu | 2 | 7.400 | 2.970 | 5.300 | 9.500 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 6 | 362.667 | 87.6166 | 244.000 | 506.000 |
| Aska | 6 | 85.500 | 11.8279 | 65.000 | 96.000 |
| OS smbh | 6 | 72.633 | 3.9788 | 64.900 | 75.700 |
| Råprot | 6 | 151.167 | 37.0590 | 120.000 | 223.000 |
| sRåprot | 6 | 564.333 | 54.0247 | 486.000 | 628.000 |
| NH3-N | 6 | 93.333 | 48.4589 | 9.000 | 149.000 |
| NDF | 6 | 435.000 | 61.9548 | 326.000 | 498.000 |
| iNDF | 6 | 253.161 | 67.3318 | 170.000 | 368.000 |
| nhNDF | 6 | 4.977 | 1.2848 | 3.936 | 7.221 |
| TAF | 6 | 83.550 | 25.3960 | 35.000 | 110.400 |
| Mjölksyra | 6 | 62.333 | 20.2550 | 25.000 | 85.000 |
| Ättiksyra | 6 | 17.667 | 5.4650 | 8.000 | 22.000 |
| Socker | 6 | 37.000 | 27.3569 | 15.000 | 89.000 |
| PRF | 3 | 2.667 | 0.5774 | 2.000 | 3.000 |
| BUF | 6 | 1.717 | 1.8830 | 0.000 | 4.000 |
| AATp20 | 6 | 77.044 | 4.7627 | 68.633 | 83.110 |
| PBVp20 | 6 | 36.187 | 37.1280 | -3.588 | 105.583 |
| NELp20 | 6 | 5.982 | 0.3824 | 5.267 | 6.336 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE* | 6 | 10.397 | 0.7066 | 9.040 | 10.900 |
| AAT* | 3 | 70.333 | 0.5774 | 70.000 | 71.000 |
| PBV* | 3 | 44.667 | 48.0867 | 13.000 | 100.000 |
| Ca | 6 | 8.533 | 2.4881 | 4.700 | 11.800 |
| P | 6 | 3.083 | 0.4792 | 2.200 | 3.600 |
| Mg | 6 | 2.533 | 0.6772 | 1.400 | 3.500 |
| K | 6 | 26.383 | 1.6253 | 24.700 | 28.600 |
| Na | 6 | 1.167 | 0.5922 | 0.400 | 1.900 |
| Cl | 6 | 5.483 | 1.2624 | 4.000 | 7.700 |
| S | 6 | 2.183 | 0.1169 | 2.000 | 2.300 |
| CAB | 6 | 434.572 | 68.4469 | 372.421 | 542.151 |
| Fe | 3 | 151.000 | 45.1331 | 99.000 | 180.000 |
| Mn | 3 | 56.333 | 24.5832 | 37.000 | 84.000 |
| Zn | 3 | 27.333 | 7.5719 | 22.000 | 36.000 |
| Cu | 3 | 7.733 | 3.1214 | 5.500 | 11.300 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 3 | 357.000 | 107.056 | 248.000 | 462.000 |
| Aska | 3 | 91.333 | 10.214 | 84.000 | 103.000 |
| OS smbh | 3 | 74.933 | 2.194 | 72.400 | 76.200 |
| Råprot | 3 | 149.667 | 6.110 | 143.000 | 155.000 |
| sRåprot | 3 | 556.333 | 40.649 | 510.000 | 586.000 |
| NH3-N | 3 | 92.333 | 1.528 | 91.000 | 94.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 3 | 390.667 | 42.771 | 364.000 | 440.000 |
| iNDF | 3 | 255.876 | 65.877 | 198.411 | 327.772 |
| nhNDF | 3 | 5.138 | 0.765 | 4.495 | 5.984 |
| TAF | 3 | 80.467 | 16.251 | 64.300 | 96.800 |
| Mjölksyra | 3 | 65.000 | 14.107 | 52.000 | 80.000 |
| Ättiksyra | 3 | 14.000 | 2.646 | 11.000 | 16.000 |
| Socker | 3 | 43.333 | 18.502 | 25.000 | 62.000 |
| BUF | 3 | 0.467 | 0.289 | 0.300 | 0.800 |
| AATp20 | 3 | 78.877 | 4.397 | 73.929 | 82.336 |
| PBVp20 | 3 | 31.582 | 11.646 | 22.623 | 44.747 |
| NELp20 | 3 | 6.054 | 0.269 | 5.755 | 6.275 |
| OE* | 3 | 10.700 | 0.520 | 10.100 | 11.000 |
| AAT* | 3 | 70.333 | 1.155 | 69.000 | 71.000 |
| PBV* | 3 | 28.000 | 8.000 | 20.000 | 36.000 |
| Ca | 2 | 8.250 | 0.778 | 7.700 | 8.800 |
| P | 2 | 2.650 | 0.071 | 2.600 | 2.700 |
| Mg | 2 | 2.350 | 0.495 | 2.000 | 2.700 |
| K | 2 | 26.150 | 0.354 | 25.900 | 26.400 |
| Na | 2 | 1.050 | 0.212 | 0.900 | 1.200 |
| Cl | 3 | 6.700 | 4.359 | 3.700 | 11.700 |
| S | 2 | 2.050 | 0.636 | 1.600 | 2.500 |
| CAB | 2 | 355.339 | 99.836 | 284.745 | 425.934 |
| Fe | 2 | 141.500 | 55.861 | 102.000 | 181.000 |
| Mn | 2 | 82.500 | 10.607 | 75.000 | 90.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 2 | 24.000 | 1.414 | 23.000 | 25.000 |
| Cu | 2 | 6.600 | 0.283 | 6.400 | 6.800 |
| Se | 1 | 0.008 | . | 0.008 | 0.008 |

Fodermedel=Ensilage, sudangräs (567) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 526.000 | . | 526.000 | 526.000 |
| Aska | 1 | 83.000 | . | 83.000 | 83.000 |
| OS smbh | 1 | 51.500 | . | 51.500 | 51.500 |
| Råprot | 1 | 91.000 | . | 91.000 | 91.000 |
| sRåprot | 1 | 401.000 | . | 401.000 | 401.000 |
| NH3-N | 1 | 36.000 | . | 36.000 | 36.000 |
| NDF | 1 | 531.000 | . | 531.000 | 531.000 |
| iNDF | 1 | 384.940 | . | 384.940 | 384.940 |
| nhNDF | 1 | 1.513 | . | 1.513 | 1.513 |
| TAF | 1 | 40.200 | . | 40.200 | 40.200 |
| Mjölksyra | 1 | 28.000 | . | 28.000 | 28.000 |
| Ättiksyra | 1 | 10.000 | . | 10.000 | 10.000 |
| Socker | 1 | 36.000 | . | 36.000 | 36.000 |
| BUF | 1 | 1.200 | . | 1.200 | 1.200 |
| AATp20 | 1 | 62.849 | . | 62.849 | 62.849 |
| PBVp20 | 1 | 0.460 | . | 0.460 | 0.460 |
| NELp20 | 1 | 3.955 | . | 3.955 | 3.955 |
| OE* | 1 | 7.000 | . | 7.000 | 7.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, sudangräs (567) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT* | 1 | 59.000 | . | 59.000 | 59.000 |
| PBV* | 1 | -10.000 | . | -10.000 | -10.000 |
| Ca | 1 | 10.900 | . | 10.900 | 10.900 |
| P | 1 | 1.700 | . | 1.700 | 1.700 |
| Mg | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| K | 1 | 14.500 | . | 14.500 | 14.500 |
| Na | 1 | 0.300 | . | 0.300 | 0.300 |
| Cl | 1 | 4.900 | . | 4.900 | 4.900 |
| S | 1 | 2.300 | . | 2.300 | 2.300 |
| CAB | 1 | 102.109 | . | 102.109 | 102.109 |
| Fe | 1 | 208.000 | . | 208.000 | 208.000 |
| Mn | 1 | 140.000 | . | 140.000 | 140.000 |
| Zn | 1 | 28.000 | . | 28.000 | 28.000 |
| Cu | 1 | 8.100 | . | 8.100 | 8.100 |

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 8 | 367.750 | 91.312 | 248.000 | 494.000 |
| Aska | 8 | 75.750 | 11.949 | 61.000 | 94.000 |
| OS smbh | 8 | 74.975 | 3.018 | 68.300 | 77.600 |
| Råprot | 8 | 145.625 | 4.104 | 140.000 | 152.000 |
| sRåprot | 8 | 528.750 | 34.837 | 479.000 | 586.000 |
| NH3-N | 8 | 65.875 | 21.748 | 33.000 | 89.000 |
| NDF | 8 | 390.750 | 50.754 | 318.000 | 467.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF | 8 | 207.875 | 31.434 | 178.000 | 279.000 |
| nhNDF | 8 | 3.923 | 0.436 | 3.417 | 4.878 |
| Stä | 8 | 91.000 | 36.723 | 21.000 | 144.000 |
| TAF | 8 | 93.250 | 22.620 | 67.000 | 122.000 |
| Mjölksyra | 8 | 69.125 | 19.723 | 43.000 | 94.000 |
| Ättiksyra | 8 | 19.125 | 4.998 | 12.000 | 28.000 |
| Socker | 8 | 27.875 | 36.267 | 2.000 | 104.000 |
| PRF | 8 | 4.750 | 1.282 | 3.000 | 7.000 |
| BUF | 8 | 0.250 | 0.707 | 0.000 | 2.000 |
| AATp20 | 8 | 82.246 | 4.165 | 77.517 | 87.968 |
| PBVp20 | 8 | 22.362 | 5.249 | 11.806 | 28.402 |
| NELp20 | 8 | 6.406 | 0.272 | 5.795 | 6.628 |
| OE* | 8 | 10.885 | 0.543 | 9.830 | 11.430 |
| Ca | 8 | 6.813 | 0.762 | 5.700 | 8.000 |
| P | 8 | 3.950 | 0.518 | 3.100 | 4.800 |
| Mg | 8 | 3.713 | 1.746 | 2.200 | 7.000 |
| K | 8 | 22.238 | 3.131 | 19.000 | 27.700 |
| Na | 8 | 2.400 | 0.787 | 1.300 | 3.500 |
| Cl | 8 | 5.075 | 2.122 | 3.200 | 9.300 |
| S | 8 | 2.950 | 0.687 | 2.300 | 4.200 |
| CAB | 8 | 345.749 | 110.198 | 205.707 | 518.146 |
| Fe | 4 | 291.250 | 118.207 | 208.000 | 466.000 |
| Mn | 4 | 126.750 | 48.527 | 83.000 | 175.000 |
| Zn | 4 | 109.750 | 44.799 | 70.000 | 172.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Cu | 4 | 21.500 | 9.609 | 13.000 | 34.000 |
| Se | 4 | 0.573 | 0.343 | 0.270 | 1.040 |

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 393.500 | 9.1924 | 387.000 | 400.000 |
| Aska | 2 | 83.500 | 2.1213 | 82.000 | 85.000 |
| OS smbh | 2 | 78.250 | 2.8991 | 76.200 | 80.300 |
| Råprot | 2 | 165.000 | 4.2426 | 162.000 | 168.000 |
| sRåprot | 2 | 518.500 | 64.3467 | 473.000 | 564.000 |
| NH3-N | 2 | 68.000 | 2.8284 | 66.000 | 70.000 |
| NDF | 2 | 352.000 | 2.8284 | 350.000 | 354.000 |
| iNDF | 2 | 155.090 | 48.3271 | 120.918 | 189.263 |
| nhNDF | 2 | 4.065 | 0.8796 | 3.443 | 4.687 |
| Stä | 2 | 111.500 | 51.6188 | 75.000 | 148.000 |
| Socket | 2 | 48.500 | 12.0208 | 40.000 | 57.000 |
| NELp20 | 2 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Ca | 1 | 5.900 | . | 5.900 | 5.900 |
| P | 1 | 4.100 | . | 4.100 | 4.100 |
| Mg | 1 | 2.900 | . | 2.900 | 2.900 |
| K | 1 | 22.200 | . | 22.200 | 22.200 |
| Na | 1 | 3.200 | . | 3.200 | 3.200 |
| Cl | 2 | 8.600 | 0.5657 | 8.200 | 9.000 |
| S | 1 | 2.900 | . | 2.900 | 2.900 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB | 1 | 294.669 | . | 294.669 | 294.669 |
| Fe | 1 | 572.000 | . | 572.000 | 572.000 |
| Mn | 1 | 103.000 | . | 103.000 | 103.000 |
| Zn | 1 | 75.000 | . | 75.000 | 75.000 |
| Cu | 1 | 12.300 | . | 12.300 | 12.300 |

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 852.0 | 36.770 | 826.0 | 878.0 |
| Aska | 2 | 57.5 | 47.376 | 24.0 | 91.0 |
| OS smbh | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| Råprot | 2 | 230.0 | 94.752 | 163.0 | 297.0 |
| NH3-N | 2 | 3.5 | 2.121 | 2.0 | 5.0 |
| NDF | 1 | 281.0 | . | 281.0 | 281.0 |
| Stä | 2 | 303.0 | 350.725 | 55.0 | 551.0 |
| TAF | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| NELp20 | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| Ca | 1 | 9.8 | . | 9.8 | 9.8 |
| P | 1 | 8.7 | . | 8.7 | 8.7 |
| Mg | 1 | 5.2 | . | 5.2 | 5.2 |
| K | 1 | 11.0 | . | 11.0 | 11.0 |
| Na | 1 | 8.0 | . | 8.0 | 8.0 |
| S | 1 | 7.3 | . | 7.3 | 7.3 |
| Fe | 1 | 303.0 | . | 303.0 | 303.0 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Statistik för område E

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn | 1 | 101.0 | . | 101.0 | 101.0 |
| Zn | 1 | 101.0 | . | 101.0 | 101.0 |
| Cu | 1 | 24.6 | . | 24.6 | 24.6 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet