


Dräktighetsprocent

Detta är ett följedokument med tips och råd kring åtgärderna gällande dräktighetsprocent i flödesschemat för detta.



Version 1 (2022-06-20)

Inseminationsteknik

- Seminera när kon är i brunst, 8-12 timmar efter brunstens början
- Fixera djuren ordentligt innan inseminationen
- Tina strået i 35 grader i 12 sekunder. Stoppar strået i en *förvärmd* pistollett
- Håll pistolletten i armvecket på väg till kon för att bibehålla rätt temperatur i strået samt för att säkerställa att pistolletten hålls ren
- Seminören står i rätt höjd vid när hen ska seminera, pall används vid behov
- Håll området runt vulva så rent som möjligt vid inseminationen
- Deponera sperman i livmoderkroppen, inte i livmoderhornen och inte i livmoderhalsen
- Planera så att seminerings (och dräktighetsundersökningar) kan utföras även under betesperioden

Sexuell hälsokontroll nöt

- Undersök kor som inte visat brunst från 40 dagar efter kalvning. Dessa följs sedan upp 1 gång per månad genom undersökning av husdjurstekniker eller veterinär.
- Behandla kor som har avvikelser vid undersökning
- Upprätta en rutin för uppföljning av behandlade kor
- Progesteron:
 - Ta progesteronprov före seminering på osäkra brunster
 - Svaga brunstsymptom
 - Dräktighetsförklarade kor som brunstar
 - Onormalt intervall sedan föregående seminering
 - Ta progesteronprov på kor som inte har brunstnotering från 40 dagar efter kalvning.
 - Ta progesteronprov som uppföljning efter behandling av äggstockscystor.

Rutiner för transitionskon

- Planera för sex till sju veckors sintid
- Hullbedöm vid mittlaktation, sinläggning och kalvning. Är kon för fet eller mager vid mittlaktation så finns tid att korrigera detta innan sinläggning. Hullet ska vara detsamma vid sinläggning som vid kalvning (3,0-3,5 hullpoäng).
- Anpassa sinkofoderstat med rätt mineraler samt en långsam upptrappning av kraftfodret efter kalvning
- Se till att hygien är god på liggplatser i sinko-avdelning, kalvningsbox och i mjölkavdelningen
- Ha en standardrutin för hur och när djuren flyttas under perioden runt kalvning för att minimera stress
 - Planera för så få flyttar som möjligt
 - Gör alla flyttar utom den till kalvningsboxen tillsammans med minst ett annat djur från samma grupp
 - Undvik omflyttningar (utom till kalvningsboxen) under de 3 sista veckorna före kalvning