


Flödesscheman för fruktsamhetsrådgivning

Dessa flödesscheman är framtagna för att användas i grundläggande fruktsamhetsrådgivning i besättningar som seminerar. Det finns många scenarion där anpassad rådgivning också eller istället behövs.


Nyckeltalen som nämns i flödesschemana är vägledande och andra nyckeltal och omständigheter kan behöva tas i beaktande. Till exempel kan kalvningsintervallet vara falskt lågt vid hög utslagning på grund av fruktsamhet. Utslagsprocent på grund av fruktsamhet över 7 % bör ses som en varningsklocka.

Det är också viktigt att ha i åtanke att fruktsamheten är tätt kopplad till hälsa, resurser och miljö. Dessa flödesscheman ger viss vägledning inom detta men är inte heltäckande.

Flödesschema INKALVNINGSÅLDER, > 25 mån




Flödesschema KALVINGSINTERVALL > 12,5 mån*



* Anpassas om ett längre kalvningsintervall önskas

Flödesschema INSEMINATIONSPROCENT mindre än 80*, förstakalvare och kor



Koncepterna förbrukningsstödet för andringsstödet, Europas livsmedel i jordbrukssektorn

*förutsätter att andelen seminerings som görs med intervall <18 dgr är max 5%



Flödesschema DRÄKTIGHETSPROCENT



* Djuren kan fixeras, den som seminerar kan arbeta ostört och i rätt höjd, strået kan tinas och hållas i rätt temperatur hela vägen till djuret