

Datum för upprättande av klövhälsoplan
Klövhälsoplanen är upprättad i samråd med (rådgivare/klövvårdare)
SE-nummer
Kontaktperson (namn och telefonnummer)

Klövård

Ansvarig klövvårdare:

Genomförda klövverkningsår detta år:

Kommande klövverkningsår:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Övrig kommentar (t.ex. verkar enligt SOP 1 gång per månad):

Klövhälsostatus

Klövlidande	Förekomst i din besättning	Gräns värden	Överskridet gränsvärde	Problemtyp
Klövsulesår och sår/böld i vita linjen		5 %	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Trauma/Fångrelaterat
Digital dermatit		5 %	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Smittsamt/Hygienrelaterat
Limax		3 %	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Smittsamt/Hygienrelaterat

Om gränsvärdet för någon av ovan nämnda sjukdomar överskrids skall även en åtgärdsplan nedan utföras.

Åtgärdsplan

Åtgärd	Prio	Påbörjas	Färdigt	Ansvarig

För att upprätta en åtgärdsplan skall minst en åtgärd anges ovan. Beskriv själv vilken/vilka åtgärder du vill genomföra, alternativt välj ur relevant åtgärdslista på efterföljande sidor.

Trauma/Fångrelaterade åtgärder

Klövård

- Verka djur vid strategiska tidpunkter i laktationen (enligt standardrutiner, SOP) d.v.s.
 - Verka sinkor/kvigor ca 2 mån före kalvning
 - Verka höglakterande kor ca 2 mån efter kalvning
 - Extra verkning vid behov ca 4 mån efter föregående verkning

Behandling

- Sätt på klots vid allvarliga klövhornsskador (*såsom klövsulesår och sår/böld i vita linjen*) och följ upp dessa behandlingar genom att ta upp kon i verkstol
- Slå ut kor med kroniska/allvarliga klövhornsskador som inte svarar på behandling

Skötselinsatser

- Se över/ändra rutiner vid mjölkning för att minska tid i väntefålla
- Säkerställ att alla kor har tillgång till liggplats efter mjölkning
- Inför/ändra rutiner för tillvänjning av nytt underlag i samband med kalvning. T ex att kvigor som kommer från mjukt underlag bör gå kvar på mjukt underlag i 2-3 veckor efter kalvning.

Ombyggnation

- Lägg in gummimatta i:
 - samlingsfålla
 - gång vid foderbord
 - ätbås
 - gång vid liggbås
- Förbättra kokomfort så att korna inte står halvt in i liggbåsen, t ex genom att flytta nackbommen
- Bygg bort tvära svängar och/eller lägg in gummimatta där

Foder

- Se över foderstat och förändra eventuellt denna för en väl fungerande idissling
- Se över utfodringsrutiner och förändra eventuellt dessa för en väl fungerande idissling

Avel

- Gallra bort alla kor med korkskruvsklöv och inåtstucken yttervägg
- Använd tjurar med högt klövhälsoindex på kor som haft klövhornsskador

Noteringar

Smitta/hygienrelaterade åtgärder

Klövård

- Ta omedelbart upp halta kor i verkstol för att identifiera, behandla och registrera smittsamma klövlidanden såsom klövspaltsinflammation, digital dermatit och limax

Smittskydd

- Se över rutiner vid inköp av djur för att minimera risken att köpa in smittade djur. T ex genom att titta på klövhälsorapporten.
- Se över smittskyddet mellan avdelningar, t ex mellan kostall och ungdjursstall med exempelvis stövelbyte och olika redskap i olika avdelningar
- Se till att utrustningen som klövvårdaren har med sig är väl rengjord
- Köp egen verkstol och klövvårdsutrustning

Skötselinsatser

- Förbättra golvhygien. T ex genom extra skrapning av gångar eller med hjälp av "dyngbagge" på spalt

Behandling

- Rengör och bandagera med salicylsyra vid digital dermatit, limax, vårta och klövspaltsinflammation
- Isolera kor med klövspaltsinflammation under behandlingstiden
- Ta bort bandage och följ upp behandlingsresultat i verkstol
- Överväg att slå ut kroniskt infekterade djur, d.v.s. djur med återkommande digital dermatit, limax och vårta

Klövbad

- Inför klövtvätt och/eller klövbad
- Se över befintligt klövbad, t ex genom att se över:
 - Vad används i badet, kopparsulfat eller annat effektivt medel?
 - Vilken koncentration används?
 - Hur många passager sker innan det byts ut?
- Se över klövbadets placering för att få optimerad kotrafik

Ombyggnation

- Skapa utrymme för verkstol och klövvårdsutrustning
- Se till att skrapornas ändlägen ligger utanför kornas golvyta
- Bygg så att urin separeras i skrapgångar t ex genom fall mot en ränna för urinseparering som sedan hålls ren med skrapor
- Bygg minst 4 meter bred fodergång och helst med ätbås
- Bygg spaltgolv i samlingsfålla, framförallt vid AMS

Avel

- Använd tjur med högt klövhälsoindex

Noteringar: