# Statistik för område E

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | TS | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF | Mjölk-syra | Ättik-syra | Socker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korn, kärna (001) | 1 | 7 | 869 | 23 | 61.4 | 118 | 327 | | 135 | 123 | 3.15 | 530 | 0.000 | | | 7 |
| Havre, kärna, hög NDF (002) | 1 | 1 | 829 | 38 | 75.0 | 115 | | 7.0 | | 392 | 2.00 | 368 | 0.000 | | | |
| Vete, kärna (005) | 1 | 5 | 858 | 17 | 88.0 | 120 | | 5.5 | 124 | 187 | 3.50 | 660 | 0.000 | | | |
| Mäsk, färsk drav (100) | 1 | 1 | 167 | 44 | 0.0 | 168 | 203 | | 299 | 25 | 4.30 | 231 | 0.000 | | | 5 |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 2 | 865 | 18 | 87.0 | 118 | | 6.0 | 167 | 173 | 3.30 | 637 | 0.000 | | | |
| Ärter, kärna (006) | 1 | 1 | 857 | 28 | 92.0 | 224 | | 3.0 | | 13 | 7.90 | 474 | 0.000 | | | |
| Åkerböna, kärna (007) | 1 | 3 | 889 | 35 | 59.3 | 289 | 749 | 2.0 | 162 | 30 | 4.70 | 385 | 0.000 | | | 5 |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 13 | 312 | 28 | 76.4 | 74 | 376 | | 377 | 177 | 3.36 | 311 | 57.000 | | | 29 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 1 | 2 | 300 | 77 | 80.7 | 215 | 362 | | 417 | 83 | 5.24 | | 61.000 | | | 113 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 3 | 1 | 158 | 110 | 85.4 | 277 | 297 | | 388 | 51 | 9.24 | | 61.000 | | | 99 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 4 | 3 | 294 | 70 | 75.8 | 173 | 245 | | 439 | 168 | 4.33 | | 61.000 | | | 88 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 25 | 469 | 65 | 72.6 | 130 | 566 | 75.1 | 488 | 188 | 4.31 | | 70.560 | 50.6 | 17.4 | 61 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 2 | 6 | 330 | 83 | 74.7 | 146 | 556 | 93.8 | 429 | 175 | 4.04 | | 82.117 | 63.5 | 16.3 | 40 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 3 | 4 | 364 | 82 | 73.4 | 150 | 535 | 136 | 452 | 191 | 4.22 | | 79.200 | 40.3 | 25.5 | 72 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 5 | 2 | 271 | 88 | 72.9 | 194 | 555 | 175 | 475 | 192 | 4.53 | | 118.000 | 56.5 | 44.0 | 10 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 3 | 467 | 88 | 77.9 | 151 | | | 445 | 124 | 5.27 | | 84.000 | | | 113 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 56 | 393 | 72 | 78.2 | 148 | 433 | | 458 | 112 | 5.15 | | 84.000 | | | 124 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 47 | 442 | 89 | 76.2 | 159 | 399 | | 470 | 134 | 4.84 | | 84.000 | | | 89 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 31 | 429 | 91 | 73.1 | 161 | 361 | | 434 | 200 | 4.06 | | 84.000 | | | 82 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 15 | 356 | 93 | 77.0 | 181 | 369 | | 443 | 144 | 5.17 | | 84.000 | | | 89 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 10 | 404 | 84 | 72.2 | 129 | 551 | 84.7 | 447 | 197 | 3.70 | | 67.100 | 49.4 | 13.3 | 65 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 195 | 409 | 73 | 76.2 | 142 | 640 | 85.6 | 454 | 146 | 4.70 | | 65.908 | 50.0 | 13.1 | 69 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 167 | 466 | 83 | 74.8 | 149 | 532 | 73.4 | 448 | 168 | 4.37 | 80 | 55.510 | 40.7 | 12.1 | 68 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 75 | 473 | 84 | 75.3 | 159 | 508 | 67.4 | 414 | 177 | 4.17 | | 51.149 | 37.2 | 11.3 | 77 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 12 | 356 | 92 | 75.0 | 167 | 560 | 71.8 | 417 | 184 | 4.29 | | 82.342 | 66.5 | 14.2 | 44 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

# Statistik för område E

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | TS | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF | Mjölk-syra | Ättik-syra | Socker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 5 | 1 | 519 | 84 | 79.8 | 166 | 632 | 58.0 | 417 | 107 | 5.28 | | 76.000 | 69.0 | 7.0 | 75 |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 17 | 457 | 63 | 69.5 | 97 | 620 | 74.4 | 437 | 243 | 2.89 | 131 | 50.082 | 33.8 | 13.5 | 77 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 11 | 418 | 67 | 67.6 | 104 | 602 | 83.6 | 434 | 270 | 2.58 | 134 | 61.000 | 44.5 | 14.5 | 43 |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | 393 | 73 | 69.2 | 134 | 554 | 61.0 | 369 | 333 | 2.66 | 145 | 101.667 | 67.0 | 28.3 | 40 |
| Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage | 1 | 2 | 419 | 67 | 65.0 | 106 | 524 | 56.0 | 437 | 430 | 4.96 | 111 | 60.250 | 46.0 | 11.5 | 40 |
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 9 | 383 | 61 | 66.1 | 90 | 587 | 90.9 | 460 | 284 | 2.67 | 99 | 69.222 | 50.4 | 16.9 | 51 |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1 | 3 | 399 | 61 | 66.8 | 127 | 540 | 68.7 | 459 | 263 | 2.71 | 71 | 69.333 | 49.3 | 20.0 | 45 |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 6 | 430 | 64 | 67.7 | 97 | 635 | 85.0 | 498 | 242 | 3.22 | 60 | 62.417 | 43.8 | 16.0 | 68 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1 | 16 | 383 | 55 | 71.7 | 107 | 606 | 69.2 | 389 | 244 | 2.74 | 183 | 55.938 | 42.7 | 12.3 | 52 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 10 | 339 | 28 | 75.9 | 76 | 544 | 42.2 | 361 | 205 | 3.12 | 329 | 73.900 | 56.3 | 12.8 | 6 |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311) | 1 | 1 | 333 | 85 | 76.8 | 77 | 829 | 107 | 440 | 142 | 4.71 | 17 | 64.000 | 40.0 | 24.0 | 149 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 1 | 879 | 54 | 64.1 | 113 | | | 591 | 234 | 3.30 | | 0.000 | | | 104 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 7 | 803 | 56 | 65.9 | 90 | 414 | | 582 | 222 | 3.56 | | 0.000 | | | 107 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 2 | 2 | 431 | 90 | 72.7 | 181 | 506 | | 388 | 350 | 6.85 | | 70.000 | | | 90 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 1 | 247 | 79 | 72.4 | 143 | 639 | 90.0 | 474 | 208 | 4.37 | | 120.000 | 93.0 | 26.0 | 12 |
| Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) | 1 | 6 | 440 | 61 | 74.5 | 150 | 492 | 49.0 | 341 | 231 | 2.87 | 198 | 44.667 | 31.0 | 10.0 | 40 |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 1 | 435 | 79 | 68.0 | 128 | 477 | 72.0 | 458 | 246 | 2.96 | 74 | | | | 34 |
| Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) | 1 | 2 | 852 | 21 | 0.0 | 122 | | 6.0 | 151 | | | 581 | 0.000 | | | |

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE* | AAT* | PBV* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korn, kärna (001) | 1 | 7 | | | | 95.4 | -25 | 7.32 | 13.0 | 107 | -23 |
| Havre, kärna, hög NDF (002) | 1 | 1 | | | | 80.2 | 1.4 | 6.02 | 11.4 | 69.0 | 2.0 |
| Vete, kärna (005) | 1 | 5 | | | | 113 | -46 | 7.90 | 14.0 | 95.0 | -23 |
| Mäsk, färsk drav (100) | 1 | 1 | | | | 104 | 1.2 | 6.88 | | | |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 2 | | | | 104 | -36 | 7.53 | | | |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

# Statistik för område E

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE* | AAT* | PBV* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärter, kärna (006) | 1 | 1 | | | | 103 | 74.6 | 7.65 | 13.8 | 99.0 | 65.0 |
| Åkerböna, kärna (007) | 1 | 3 | | | | 100 | 139 | 7.75 | 13.5 | | |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 13 | | | | 88.1 | -64 | 6.45 | 11.4 | 80.0 | -70 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 1 | 2 | | | | 99.8 | 51.5 | 6.75 | 11.8 | | |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 3 | 1 | | | | 110 | 91.1 | 7.23 | 12.1 | | |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 4 | 3 | | | | 95.9 | 19.1 | 6.21 | 11.1 | | |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 25 | 2.63636 | 0.8400 | | 79.6 | 6.4 | 5.98 | 10.6 | 71.4 | -9.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 2 | 6 | | 1.2833 | | 80.2 | 19.9 | 6.09 | 10.7 | 70.8 | 24.2 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 3 | 4 | 9.50000 | 8.2000 | | 80.3 | 23.7 | 5.95 | 10.6 | 71.0 | -11 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 5 | 2 | 7.50000 | 10.0000 | | 78.3 | 67.1 | 6.17 | 10.4 | | |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 3 | | | | 85.7 | 17.9 | 6.35 | 11.2 | 77.0 | 18.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 56 | | | | 88.0 | 11.9 | 6.44 | 11.5 | 78.6 | 9.2 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 47 | | | | 86.1 | 24.9 | 6.26 | 10.9 | 74.8 | 28.8 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 31 | | | | 82.7 | 31.7 | 5.92 | 10.4 | 71.7 | 34.8 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 15 | | | | 88.1 | 42.5 | 6.35 | 11.0 | 75.4 | 51.9 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 10 | | 3.4000 | | 79.1 | 7.8 | 5.79 | 10.3 | 69.6 | 8.8 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 195 | 1.85714 | 1.7277 | | 83.2 | 13.6 | 6.29 | 11.1 | 72.0 | 16.3 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 167 | 2.00000 | 1.4491 | | 84.5 | 18.5 | 6.12 | 10.8 | 70.9 | 24.2 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 75 | 0.92857 | 1.2770 | | 85.9 | 25.2 | 6.12 | 10.8 | 71.0 | 30.6 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 12 | 0.83333 | 0.7583 | | 81.9 | 39.6 | 6.20 | 10.7 | 70.3 | 35.3 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 5 | 1 | 0.00000 | 0.0000 | | 86.1 | 31.2 | 6.68 | 11.6 | | |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 17 | 4.50000 | 1.5000 | | 72.2 | -19 | 5.60 | 10.2 | 63.0 | -40 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 11 | | | | 70.7 | -6.1 | 5.54 | 10.1 | 62.5 | -14 |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | 5.00000 | 1.3333 | | 68.9 | 23.4 | 5.83 | 10.0 | | |
| Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage | 1 | 2 | 3.00000 | 2.0000 | | 69.5 | -2.9 | 5.45 | 9.8 | | |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE* | AAT* | PBV* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 9 | 5.00000 | 3.5000 | | 71.7 | -22 | 5.45 | 9.7 | 64.5 | -43 |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1 | 3 | | | | 69.4 | 15.3 | 5.53 | | | |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 6 | 2.00000 | 1.0000 | | 69.6 | -15 | 5.50 | 10.1 | | |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1 | 16 | 1.66667 | 1.0000 | | 76.5 | -14 | 5.96 | 10.5 | 63.5 | -27 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 10 | 4.80000 | 0.0000 | | 81.8 | -52 | 6.66 | 11.6 | | |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311) | 1 | 1 | | | | 73.0 | -37 | 5.92 | | | |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 1 | | | | 85.2 | -16 | 5.07 | 9.3 | 67.0 | -2.0 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 7 | | | | 85.6 | -39 | 5.14 | 9.6 | 68.3 | -28 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 2 | 2 | | | | 80.4 | 59.6 | 5.94 | 10.3 | 69.0 | -8.0 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 1 | 1.00000 | 0.0000 | | 72.9 | 34.8 | 6.18 | 10.4 | | |
| Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) | 1 | 6 | 3.66667 | 0.0000 | | 88.4 | 17.7 | 6.37 | 11.0 | | |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 1 | | | | | | 0.00 | | | |
| Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) | 1 | 2 | | | | | | 0.00 | | | |

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. Ca | Ca | P | Mg | K | Na | Cl | S | CAB | Ant. Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korn, kärna (001) | 1 | 6 | 0.8 | 3.6 | 1.2 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 1.4 | -6 | 6 | 77.0 | 18.3 | 41.3 | 5.4 | 0.1 |
| Vete, kärna (005) | 1 | 4 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | 5.0 | 0.1 | | 1.3 | 26 | 4 | 43.5 | 37.8 | 29.5 | 5.2 | |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | 5.6 | 0.1 | | 1.3 | 41 | 2 | 50.0 | 23.0 | 33.5 | 5.5 | |
| Ärter, kärna (006) | 1 | 1 | 1.0 | 3.9 | 1.4 | 10.8 | 0.1 | | 2.0 | 99 | 1 | 55.0 | 10.0 | 28.0 | 7.3 | 0.0 |
| Åkerböna, kärna (007) | 1 | 2 | 1.2 | 4.7 | 1.4 | 11.7 | 0.1 | | 1.9 | 155 | 2 | 58.0 | 17.0 | 51.0 | 15.9 | |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 13 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 8.9 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 138 | 9 | 75.8 | 25.9 | 18.8 | 3.7 | 0.0 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 1 | 2 | 6.1 | 2.8 | 2.2 | 26.5 | 1.1 | 10.1 | 2.6 | 345 | 1 | 65.0 | 53.0 | 28.0 | 9.0 | |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 3 | 1 | 4.7 | 3.4 | 2.1 | 35.7 | 0.4 | 17.7 | 3.9 | 188 | 1 | 88.0 | 33.0 | 31.0 | 9.0 | |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 4 | 3 | 6.8 | 3.3 | 2.4 | 23.0 | 1.1 | 5.6 | 2.5 | 330 | 0 | | | | | |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 25 | 5.2 | 2.4 | 1.9 | 19.9 | 0.6 | 4.4 | 1.7 | 304 | 23 | 157.5 | 92.6 | 26.3 | 6.5 | 0.0 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. Ca | Ca | P | Mg | K | Na | Cl | S | CAB | Ant. Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 2 | 6 | 7.6 | 2.9 | 2.4 | 25.8 | 0.5 | 5.9 | 2.1 | 389 | 6 | 125.2 | 58.7 | 24.0 | 7.5 | |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 3 | 4 | 7.3 | 2.9 | 2.7 | 21.1 | 1.0 | 5.5 | 2.6 | 268 | 3 | 159.3 | 116.7 | 24.7 | 7.1 | 0.1 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 5 | 2 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 28.2 | 1.1 | 8.1 | 3.2 | 344 | 1 | 188.0 | 60.0 | 25.0 | 10.0 | 0.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 2 | 6.2 | 3.0 | 2.4 | 24.6 | 0.6 | | 2.9 | 343 | 2 | 212.5 | 125.0 | 23.5 | 7.5 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 53 | 5.1 | 2.6 | 1.7 | 25.8 | 0.6 | 7.7 | 1.9 | 401 | 44 | 106.1 | 54.5 | 26.0 | 6.1 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 44 | 6.5 | 2.9 | 2.3 | 28.3 | 0.9 | 10.0 | 2.3 | 424 | 35 | 103.7 | 61.0 | 28.6 | 8.0 | 0.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 26 | 9.2 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 1.1 | 7.8 | 2.3 | 342 | 20 | 145.9 | 60.2 | 26.4 | 8.3 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 14 | 8.0 | 3.5 | 2.7 | 28.9 | 1.5 | 10.0 | 2.9 | 425 | 11 | 160.4 | 72.8 | 31.4 | 8.4 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 10 | 7.5 | 2.7 | 2.3 | 22.8 | 0.9 | 6.8 | 1.7 | 329 | 10 | 356.0 | 85.6 | 24.0 | 6.7 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 192 | 5.2 | 2.6 | 1.8 | 24.4 | 0.6 | 5.7 | 1.9 | 374 | 175 | 174.8 | 61.7 | 27.9 | 5.9 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 163 | 6.8 | 2.8 | 2.3 | 26.4 | 0.9 | 8.3 | 2.2 | 343 | 152 | 158.0 | 70.0 | 27.8 | 7.5 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 74 | 8.7 | 2.6 | 2.8 | 24.2 | 1.2 | 8.9 | 2.5 | 266 | 66 | 160.7 | 70.2 | 26.0 | 7.8 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 12 | 8.5 | 2.9 | 2.6 | 25.0 | 1.0 | 10.1 | 2.7 | 231 | 10 | 301.9 | 83.0 | 26.7 | 8.6 | 0.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 5 | 1 | 6.6 | 3.6 | 1.7 | 25.4 | 0.8 | 14.8 | 3.0 | 80 | 1 | 88.0 | 122.0 | 18.0 | 8.0 | |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 14 | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 17.4 | 0.9 | 5.8 | 1.6 | 219 | 12 | 218.1 | 57.5 | 23.2 | 5.0 | |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 10 | 5.0 | 2.6 | 1.9 | 18.5 | 0.9 | 6.3 | 1.5 | 240 | 10 | 273.5 | 73.6 | 29.6 | 5.4 | |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | 6.9 | 2.6 | 1.9 | 19.1 | 5.2 | 12.7 | 2.6 | 198 | 2 | 421.5 | 82.5 | 63.0 | 8.5 | |
| Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage | 1 | 2 | 6.4 | 3.3 | 2.4 | 17.6 | 1.1 | 4.6 | 2.0 | 246 | 1 | 183.0 | 173.0 | 169.0 | 6.5 | |
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 9 | 4.9 | 2.2 | 1.6 | 18.0 | 0.8 | 4.1 | 1.3 | 297 | 9 | 127.9 | 52.4 | 20.8 | 5.5 | |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1 | 3 | 6.7 | 2.6 | 2.5 | 15.5 | 0.7 | 5.0 | 1.6 | 188 | 3 | 133.7 | 83.7 | 29.7 | 5.9 | 0.0 |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 17.7 | 0.5 | 6.0 | 1.4 | 216 | 5 | 152.4 | 84.0 | 22.8 | 5.3 | 0.0 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1 | 16 | 4.9 | 2.4 | 1.7 | 14.3 | 0.7 | 5.7 | 1.5 | 150 | 15 | 97.2 | 35.5 | 24.3 | 5.7 | 0.0 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 10 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 8.7 | 0.3 | 2.9 | 0.9 | 120 | 4 | 127.8 | 26.8 | 21.5 | 6.8 | 0.1 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 1 | 4.7 | 2.4 | 1.7 | 8.3 | 2.0 | | 1.9 | 40 | 1 | 63.0 | 62.0 | 23.0 | 5.9 | |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 5 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 14.0 | 0.6 | 5.9 | 1.6 | 142 | 4 | 139.3 | 119.8 | 26.3 | 6.0 | 0.0 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. Ca | Ca | P | Mg | K | Na | Cl | S | CAB | Ant. Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 2 | 2 | 11.3 | 3.1 | 3.9 | 22.3 | 0.4 | 8.8 | 2.3 | 279 | 1 | 66.0 | 96.0 | 32.0 | 8.7 | |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 1 | 9.5 | 3.0 | 2.1 | 27.4 | 1.0 | 3.7 | 1.9 | 521 | 0 | | | | | |
| Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) | 1 | 6 | 6.2 | 3.9 | 2.9 | 16.1 | 2.8 | 11.1 | 2.3 | 80 | 2 | 251.0 | 65.0 | 31.5 | 12.0 | 0.1 |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 1 | 5.5 | 3.0 | 4.3 | 16.1 | 2.1 | 5.3 | 2.6 | 191 | 1 | 463.0 | 199.0 | 137.0 | 25.6 | |
| Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) | 1 | 2 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | 5.6 | 0.1 | | 1.5 | | 2 | 58.0 | 35.5 | 31.5 | 4.8 | 0.0 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

# Statistik för område E

**Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 7 | 868.571 | 25.703 | 838.000 | 912.000 |
| Aska | 7 | 23.214 | 5.114 | 19.000 | 34.000 |
| OS smbh | 7 | 61.429 | 41.964 | 0.000 | 86.000 |
| Råprot | 7 | 117.600 | 41.432 | 84.000 | 208.000 |
| sRåprot | 2 | 326.500 | 23.335 | 310.000 | 343.000 |
| NDF | 2 | 135.000 | 11.314 | 127.000 | 143.000 |
| iNDF | 7 | 122.857 | 66.849 | 25.000 | 162.000 |
| nhNDF | 7 | 3.150 | 0.000 | 3.150 | 3.150 |
| Stä | 7 | 530.129 | 209.779 | 62.000 | 649.200 |
| TAF | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 3 | 7.000 | 3.464 | 5.000 | 11.000 |
| AATp20 | 7 | 95.355 | 1.438 | 93.249 | 97.660 |
| PBVp20 | 7 | -25.155 | 42.139 | -60.172 | 66.367 |
| NELp20 | 7 | 7.322 | 0.071 | 7.231 | 7.429 |
| OE* | 5 | 13.000 | 0.897 | 11.400 | 13.500 |
| AAT* | 3 | 107.000 | 24.249 | 93.000 | 135.000 |
| PBV* | 3 | -23.333 | 22.030 | -38.000 | 2.000 |
| Ca | 6 | 0.750 | 0.907 | 0.300 | 2.600 |
| P | 6 | 3.550 | 0.782 | 3.100 | 5.100 |
| Mg | 6 | 1.217 | 0.264 | 1.000 | 1.700 |
| K | 6 | 4.817 | 2.218 | 0.300 | 5.900 |
| Na | 6 | 0.117 | 0.041 | 0.100 | 0.200 |
| Cl | 1 | 4.400 | . | 4.400 | 4.400 |
| S | 6 | 1.367 | 0.561 | 1.000 | 2.500 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

# Statistik för område E

**Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CAB | 6 | -5.982 | 90.516 | -178.032 | 58.940 |
| Fe | 6 | 77.000 | 66.705 | 33.000 | 211.000 |
| Mn | 6 | 18.333 | 11.877 | 11.000 | 42.000 |
| Zn | 6 | 41.333 | 30.204 | 21.000 | 102.000 |
| Cu | 6 | 5.433 | 2.035 | 4.000 | 9.400 |
| Se | 1 | 0.050 | . | 0.050 | 0.050 |

**Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 829.000 | . | 829.000 | 829.000 |
| Aska | 1 | 38.000 | . | 38.000 | 38.000 |
| OS smbh | 1 | 75.000 | . | 75.000 | 75.000 |
| Råprot | 1 | 115.000 | . | 115.000 | 115.000 |
| NH3-N | 1 | 7.000 | . | 7.000 | 7.000 |
| iNDF | 1 | 392.000 | . | 392.000 | 392.000 |
| nhNDF | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| Stä | 1 | 368.000 | . | 368.000 | 368.000 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 1 | 80.165 | . | 80.165 | 80.165 |
| PBVp20 | 1 | 1.361 | . | 1.361 | 1.361 |
| NELp20 | 1 | 6.019 | . | 6.019 | 6.019 |
| OE* | 1 | 11.400 | . | 11.400 | 11.400 |
| AAT* | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |
| PBV* | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

# Statistik för område E

**Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 5 | 858.200 | 11.4324 | 839.000 | 869.000 |
| Aska | 5 | 17.220 | 1.5040 | 16.100 | 19.800 |
| OS smbh | 5 | 88.000 | 0.0000 | 88.000 | 88.000 |
| Råprot | 5 | 119.800 | 14.1462 | 103.600 | 133.000 |
| NH3-N | 2 | 5.500 | 0.7071 | 5.000 | 6.000 |
| NDF | 1 | 124.000 | . | 124.000 | 124.000 |
| iNDF | 5 | 187.000 | 0.0000 | 187.000 | 187.000 |
| nhNDF | 5 | 3.500 | 0.0000 | 3.500 | 3.500 |
| Stä | 5 | 659.960 | 22.9049 | 638.000 | 688.700 |
| TAF | 5 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 5 | 113.280 | 1.8833 | 111.245 | 115.981 |
| PBVp20 | 5 | -46.126 | 11.8174 | -59.471 | -36.683 |
| NELp20 | 5 | 7.901 | 0.0384 | 7.859 | 7.939 |
| OE* | 1 | 14.000 | . | 14.000 | 14.000 |
| AAT* | 1 | 95.000 | . | 95.000 | 95.000 |
| PBV* | 1 | -23.000 | . | -23.000 | -23.000 |
| Ca | 4 | 0.350 | 0.0577 | 0.300 | 0.400 |
| P | 4 | 3.500 | 0.3367 | 3.000 | 3.700 |
| Mg | 4 | 1.275 | 0.1500 | 1.200 | 1.500 |
| K | 4 | 4.950 | 0.2380 | 4.700 | 5.200 |
| Na | 4 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 4 | 1.275 | 0.0957 | 1.200 | 1.400 |
| CAB | 4 | 25.907 | 1.8990 | 24.200 | 28.180 |
| Fe | 4 | 43.500 | 5.2599 | 39.000 | 51.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn | 4 | 37.750 | 9.6047 | 32.000 | 52.000 |
| Zn | 4 | 29.500 | 1.7321 | 28.000 | 31.000 |
| Cu | 4 | 5.175 | 0.2630 | 4.800 | 5.400 |

**Fodermedel=Mäsk, färsk drav (100) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 167.000 | . | 167.000 | 167.000 |
| Aska | 1 | 44.000 | . | 44.000 | 44.000 |
| OS smbh | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Råprot | 1 | 168.000 | . | 168.000 | 168.000 |
| sRåprot | 1 | 203.000 | . | 203.000 | 203.000 |
| NDF | 1 | 299.000 | . | 299.000 | 299.000 |
| iNDF | 1 | 25.000 | . | 25.000 | 25.000 |
| nhNDF | 1 | 4.300 | . | 4.300 | 4.300 |
| Stä | 1 | 231.000 | . | 231.000 | 231.000 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |
| AATp20 | 1 | 103.777 | . | 103.777 | 103.777 |
| PBVp20 | 1 | 1.210 | . | 1.210 | 1.210 |
| NELp20 | 1 | 6.875 | . | 6.875 | 6.875 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

# Statistik för område E

**Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 2 | 864.500 | 10.6066 | 857.000 | 872.000 |
| Aska | 2 | 18.400 | 1.9799 | 17.000 | 19.800 |
| OS smbh | 2 | 87.000 | 0.0000 | 87.000 | 87.000 |
| Råprot | 2 | 117.600 | 3.6770 | 115.000 | 120.200 |
| NH3-N | 1 | 6.000 | . | 6.000 | 6.000 |
| NDF | 1 | 167.000 | . | 167.000 | 167.000 |
| iNDF | 2 | 173.000 | 0.0000 | 173.000 | 173.000 |
| nhNDF | 2 | 3.300 | 0.0000 | 3.300 | 3.300 |
| Stä | 2 | 637.050 | 9.9702 | 630.000 | 644.100 |
| TAF | 2 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 2 | 104.394 | 0.4355 | 104.086 | 104.702 |
| PBVp20 | 2 | -36.376 | 2.9434 | -38.457 | -34.294 |
| NELp20 | 2 | 7.531 | 0.1295 | 7.440 | 7.623 |
| Ca | 2 | 0.400 | 0.0000 | 0.400 | 0.400 |
| P | 2 | 3.450 | 0.0707 | 3.400 | 3.500 |
| Mg | 2 | 1.250 | 0.0707 | 1.200 | 1.300 |
| K | 2 | 5.600 | 0.1414 | 5.500 | 5.700 |
| Na | 2 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 2 | 1.250 | 0.0707 | 1.200 | 1.300 |
| CAB | 2 | 41.276 | 0.8025 | 40.709 | 41.844 |
| Fe | 2 | 50.000 | 9.8995 | 43.000 | 57.000 |
| Mn | 2 | 23.000 | 8.4853 | 17.000 | 29.000 |
| Zn | 2 | 33.500 | 4.9497 | 30.000 | 37.000 |
| Cu | 2 | 5.450 | 0.4950 | 5.100 | 5.800 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 857.000 | . | 857.000 | 857.000 |
| Aska | 1 | 28.000 | . | 28.000 | 28.000 |
| OS smbh | 1 | 92.000 | . | 92.000 | 92.000 |
| Råprot | 1 | 224.000 | . | 224.000 | 224.000 |
| NH3-N | 1 | 3.000 | . | 3.000 | 3.000 |
| iNDF | 1 | 13.000 | . | 13.000 | 13.000 |
| nhNDF | 1 | 7.900 | . | 7.900 | 7.900 |
| Stä | 1 | 474.000 | . | 474.000 | 474.000 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 1 | 102.604 | . | 102.604 | 102.604 |
| PBVp20 | 1 | 74.640 | . | 74.640 | 74.640 |
| NELp20 | 1 | 7.648 | . | 7.648 | 7.648 |
| OE* | 1 | 13.800 | . | 13.800 | 13.800 |
| AAT* | 1 | 99.000 | . | 99.000 | 99.000 |
| PBV* | 1 | 65.000 | . | 65.000 | 65.000 |
| Ca | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| P | 1 | 3.900 | . | 3.900 | 3.900 |
| Mg | 1 | 1.400 | . | 1.400 | 1.400 |
| K | 1 | 10.800 | . | 10.800 | 10.800 |
| Na | 1 | 0.100 | . | 0.100 | 0.100 |
| S | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| CAB | 1 | 99.225 | . | 99.225 | 99.225 |
| Fe | 1 | 55.000 | . | 55.000 | 55.000 |
| Mn | 1 | 10.000 | . | 10.000 | 10.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn | 1 | 28.000 | . | 28.000 | 28.000 |
| Cu | 1 | 7.300 | . | 7.300 | 7.300 |
| Se | 1 | 0.005 | . | 0.005 | 0.005 |

**Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 3 | 889.000 | 26.5141 | 866.000 | 918.000 |
| Aska | 3 | 35.000 | 3.4641 | 33.000 | 39.000 |
| OS smbh | 3 | 59.306 | 51.3604 | 0.000 | 88.959 |
| Råprot | 3 | 289.333 | 15.0444 | 272.000 | 299.000 |
| sRåprot | 1 | 749.000 | . | 749.000 | 749.000 |
| NH3-N | 2 | 2.000 | 0.0000 | 2.000 | 2.000 |
| NDF | 2 | 162.000 | 66.4680 | 115.000 | 209.000 |
| iNDF | 3 | 29.667 | 4.0415 | 25.000 | 32.000 |
| nhNDF | 3 | 4.700 | 0.0000 | 4.700 | 4.700 |
| Stä | 3 | 384.667 | 34.3851 | 345.000 | 406.000 |
| TAF | 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |
| AATp20 | 3 | 100.234 | 2.3710 | 97.641 | 102.290 |
| PBVp20 | 3 | 139.441 | 12.5728 | 125.165 | 148.863 |
| NELp20 | 3 | 7.751 | 0.0703 | 7.706 | 7.832 |
| OE* | 1 | 13.500 | . | 13.500 | 13.500 |
| Ca | 2 | 1.200 | 0.0000 | 1.200 | 1.200 |
| P | 2 | 4.650 | 1.0607 | 3.900 | 5.400 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mg | 2 | 1.350 | 0.0707 | 1.300 | 1.400 |
| K | 2 | 11.650 | 1.0607 | 10.900 | 12.400 |
| Na | 2 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 2 | 1.900 | 0.4243 | 1.600 | 2.200 |
| CAB | 2 | 155.383 | 53.6434 | 117.451 | 193.314 |
| Fe | 2 | 58.000 | 7.0711 | 53.000 | 63.000 |
| Mn | 2 | 17.000 | 2.8284 | 15.000 | 19.000 |
| Zn | 2 | 51.000 | 5.6569 | 47.000 | 55.000 |
| Cu | 2 | 15.850 | 0.2121 | 15.700 | 16.000 |

**Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 13 | 312.462 | 36.8479 | 277.000 | 365.000 |
| Aska | 13 | 28.154 | 2.8239 | 26.000 | 30.000 |
| OS smbh | 13 | 76.438 | 2.2415 | 73.000 | 79.200 |
| Råprot | 13 | 74.385 | 5.3313 | 68.000 | 81.000 |
| sRåprot | 13 | 375.615 | 23.6803 | 348.000 | 406.000 |
| NDF | 13 | 377.231 | 30.6272 | 348.000 | 406.000 |
| iNDF | 13 | 176.833 | 21.8684 | 162.661 | 200.000 |
| nhNDF | 13 | 3.360 | 0.5534 | 2.578 | 3.996 |
| Stä | 13 | 311.385 | 31.7110 | 272.000 | 342.000 |
| TAF | 13 | 57.000 | 0.0000 | 57.000 | 57.000 |
| Socker | 13 | 29.154 | 28.6614 | 10.000 | 75.000 |
| AATp20 | 13 | 88.130 | 2.3905 | 84.583 | 91.072 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| PBVp20 | 13 | -64.204 | 7.0122 | -72.201 | -56.819 |
| NELp20 | 13 | 6.452 | 0.2078 | 6.108 | 6.690 |
| OE* | 12 | 11.436 | 0.2275 | 11.080 | 11.630 |
| AAT* | 6 | 80.000 | 0.0000 | 80.000 | 80.000 |
| PBV* | 6 | -70.000 | 3.5214 | -74.000 | -66.000 |
| Ca | 13 | 1.815 | 0.2996 | 1.500 | 2.200 |
| P | 13 | 1.762 | 0.1758 | 1.600 | 2.000 |
| Mg | 13 | 1.162 | 0.1446 | 1.000 | 1.300 |
| K | 13 | 8.854 | 0.8202 | 7.700 | 9.600 |
| Na | 11 | 0.345 | 0.1368 | 0.200 | 0.500 |
| Cl | 9 | 1.622 | 0.2863 | 1.300 | 2.100 |
| S | 13 | 0.946 | 0.1330 | 0.800 | 1.100 |
| CAB | 13 | 138.252 | 25.3238 | 106.208 | 169.279 |
| Fe | 9 | 75.778 | 33.5551 | 51.000 | 159.000 |
| Mn | 9 | 25.889 | 12.9561 | 13.000 | 49.000 |
| Zn | 9 | 18.778 | 4.9441 | 13.000 | 29.000 |
| Cu | 9 | 3.678 | 0.4919 | 2.800 | 4.300 |
| Se | 6 | 0.007 | 0.0026 | 0.005 | 0.012 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 2 | 299.500 | 116.673 | 217.000 | 382.000 |
| Aska | 2 | 77.000 | 8.485 | 71.000 | 83.000 |
| OS smbh | 2 | 80.650 | 0.212 | 80.500 | 80.800 |
| Råprot | 2 | 215.000 | 55.154 | 176.000 | 254.000 |
| sRåprot | 2 | 362.000 | 49.497 | 327.000 | 397.000 |
| NDF | 2 | 416.500 | 23.335 | 400.000 | 433.000 |
| iNDF | 2 | 82.500 | 50.205 | 47.000 | 118.000 |
| nhNDF | 2 | 5.239 | 1.137 | 4.435 | 6.043 |
| TAF | 2 | 61.000 | 0.000 | 61.000 | 61.000 |
| Socker | 2 | 112.500 | 4.950 | 109.000 | 116.000 |
| AATp20 | 2 | 99.814 | 6.187 | 95.439 | 104.190 |
| PBVp20 | 2 | 51.507 | 40.842 | 22.627 | 80.387 |
| NELp20 | 2 | 6.751 | 0.131 | 6.658 | 6.843 |
| OE* | 2 | 11.800 | 0.071 | 11.750 | 11.850 |
| Ca | 2 | 6.050 | 2.616 | 4.200 | 7.900 |
| P | 2 | 2.800 | 0.707 | 2.300 | 3.300 |
| Mg | 2 | 2.200 | 1.131 | 1.400 | 3.000 |
| K | 2 | 26.500 | 1.980 | 25.100 | 27.900 |
| Na | 1 | 1.100 | . | 1.100 | 1.100 |
| Cl | 1 | 10.100 | . | 10.100 | 10.100 |
| S | 2 | 2.550 | 0.636 | 2.100 | 3.000 |
| CAB | 2 | 344.829 | 179.698 | 217.763 | 471.895 |
| Fe | 1 | 65.000 | . | 65.000 | 65.000 |
| Mn | 1 | 53.000 | . | 53.000 | 53.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn | 1 | 28.000 | . | 28.000 | 28.000 |
| Cu | 1 | 9.000 | . | 9.000 | 9.000 |

**Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 158.000 | . | 158.000 | 158.000 |
| Aska | 1 | 110.000 | . | 110.000 | 110.000 |
| OS smbh | 1 | 85.400 | . | 85.400 | 85.400 |
| Råprot | 1 | 277.000 | . | 277.000 | 277.000 |
| sRåprot | 1 | 297.000 | . | 297.000 | 297.000 |
| NDF | 1 | 388.000 | . | 388.000 | 388.000 |
| iNDF | 1 | 51.000 | . | 51.000 | 51.000 |
| nhNDF | 1 | 9.241 | . | 9.241 | 9.241 |
| TAF | 1 | 61.000 | . | 61.000 | 61.000 |
| Socker | 1 | 99.000 | . | 99.000 | 99.000 |
| AATp20 | 1 | 110.336 | . | 110.336 | 110.336 |
| PBVp20 | 1 | 91.054 | . | 91.054 | 91.054 |
| NELp20 | 1 | 7.232 | . | 7.232 | 7.232 |
| OE* | 1 | 12.130 | . | 12.130 | 12.130 |
| Ca | 1 | 4.700 | . | 4.700 | 4.700 |
| P | 1 | 3.400 | . | 3.400 | 3.400 |
| Mg | 1 | 2.100 | . | 2.100 | 2.100 |
| K | 1 | 35.700 | . | 35.700 | 35.700 |
| Na | 1 | 0.400 | . | 0.400 | 0.400 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Cl | 1 | 17.700 | . | 17.700 | 17.700 |
| S | 1 | 3.900 | . | 3.900 | 3.900 |
| CAB | 1 | 188.093 | . | 188.093 | 188.093 |
| Fe | 1 | 88.000 | . | 88.000 | 88.000 |
| Mn | 1 | 33.000 | . | 33.000 | 33.000 |
| Zn | 1 | 31.000 | . | 31.000 | 31.000 |
| Cu | 1 | 9.000 | . | 9.000 | 9.000 |

**Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=4**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 3 | 294.000 | 44.306 | 253.000 | 341.000 |
| Aska | 3 | 70.333 | 18.148 | 51.000 | 87.000 |
| OS smbh | 3 | 75.800 | 3.387 | 73.100 | 79.600 |
| Råprot | 3 | 172.667 | 66.161 | 98.000 | 224.000 |
| sRåprot | 3 | 245.333 | 118.023 | 152.000 | 378.000 |
| NDF | 3 | 438.667 | 51.287 | 380.000 | 475.000 |
| iNDF | 3 | 167.667 | 117.304 | 64.000 | 295.000 |
| nhNDF | 3 | 4.330 | 0.597 | 3.694 | 4.878 |
| TAF | 3 | 61.000 | 0.000 | 61.000 | 61.000 |
| Socker | 3 | 88.000 | 13.528 | 74.000 | 101.000 |
| AATp20 | 3 | 95.851 | 11.249 | 85.356 | 107.727 |
| PBVp20 | 3 | 19.141 | 44.816 | -32.558 | 46.967 |
| NELp20 | 3 | 6.207 | 0.528 | 5.837 | 6.812 |
| OE* | 3 | 11.087 | 0.616 | 10.450 | 11.680 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=4**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ca | 3 | 6.833 | 4.008 | 3.900 | 11.400 |
| P | 3 | 3.333 | 0.351 | 3.000 | 3.700 |
| Mg | 3 | 2.367 | 0.702 | 1.700 | 3.100 |
| K | 3 | 22.967 | 3.253 | 19.800 | 26.300 |
| Na | 2 | 1.100 | 0.141 | 1.000 | 1.200 |
| Cl | 2 | 5.600 | 3.111 | 3.400 | 7.800 |
| S | 3 | 2.467 | 0.971 | 1.400 | 3.300 |
| CAB | 3 | 330.134 | 31.622 | 298.840 | 362.074 |

**Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 25 | 469.000 | 214.119 | 284.000 | 839.000 |
| Aska | 25 | 65.360 | 13.546 | 51.000 | 82.000 |
| OS smbh | 25 | 72.648 | 5.601 | 65.100 | 78.800 |
| Råprot | 25 | 130.120 | 50.833 | 70.000 | 212.000 |
| sRåprot | 25 | 565.680 | 147.670 | 319.000 | 682.000 |
| NH3-N | 23 | 75.087 | 31.164 | 18.000 | 109.000 |
| NDF | 25 | 487.680 | 52.751 | 424.000 | 572.000 |
| iNDF | 25 | 187.509 | 68.119 | 117.404 | 290.000 |
| nhNDF | 25 | 4.310 | 0.785 | 3.489 | 5.379 |
| TAF | 25 | 70.560 | 38.974 | 9.000 | 111.100 |
| Mjölksyra | 25 | 50.600 | 30.250 | 5.000 | 81.000 |
| Ättiksyra | 25 | 17.400 | 10.100 | 4.000 | 31.000 |
| Socker | 25 | 61.000 | 44.048 | 21.000 | 116.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| PRF | 11 | 2.636 | 2.248 | 0.000 | 5.000 |
| BUF | 25 | 0.840 | 0.976 | 0.000 | 2.600 |
| AATp20 | 25 | 79.581 | 3.260 | 75.957 | 83.741 |
| PBVp20 | 25 | 6.418 | 45.521 | -41.669 | 81.682 |
| NELp20 | 25 | 5.979 | 0.653 | 5.036 | 6.629 |
| OE* | 25 | 10.608 | 0.872 | 9.400 | 11.700 |
| AAT* | 14 | 71.357 | 2.735 | 67.000 | 74.000 |
| PBV* | 14 | -9.000 | 27.627 | -40.000 | 34.000 |
| Ca | 25 | 5.212 | 1.073 | 3.900 | 6.600 |
| P | 25 | 2.380 | 0.451 | 1.800 | 3.000 |
| Mg | 25 | 1.868 | 0.436 | 1.400 | 2.500 |
| K | 25 | 19.944 | 5.748 | 12.900 | 28.300 |
| Na | 25 | 0.560 | 0.404 | 0.200 | 1.100 |
| Cl | 24 | 4.383 | 1.979 | 2.300 | 7.200 |
| S | 25 | 1.696 | 0.674 | 1.000 | 2.800 |
| CAB | 25 | 304.256 | 117.461 | 179.919 | 465.501 |
| Fe | 23 | 157.478 | 82.806 | 72.000 | 288.000 |
| Mn | 23 | 92.565 | 66.756 | 49.000 | 180.000 |
| Zn | 23 | 26.304 | 5.304 | 21.000 | 35.000 |
| Cu | 23 | 6.522 | 2.689 | 4.200 | 9.000 |
| Se | 2 | 0.035 | 0.021 | 0.020 | 0.050 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 6 | 330.333 | 22.4024 | 292.000 | 353.000 |
| Aska | 6 | 83.167 | 6.7355 | 73.000 | 94.000 |
| OS smbh | 6 | 74.650 | 1.6233 | 72.200 | 76.600 |
| Råprot | 6 | 146.167 | 11.8561 | 129.000 | 162.000 |
| sRåprot | 6 | 555.500 | 45.9293 | 487.000 | 630.000 |
| NH3-N | 6 | 93.833 | 21.3393 | 76.000 | 135.000 |
| NDF | 6 | 429.333 | 22.5359 | 399.000 | 464.000 |
| iNDF | 6 | 175.359 | 30.6530 | 137.935 | 221.762 |
| nhNDF | 6 | 4.040 | 0.6342 | 3.148 | 4.903 |
| TAF | 6 | 82.117 | 13.0391 | 60.200 | 96.100 |
| Mjölksyra | 6 | 63.500 | 12.4378 | 47.000 | 73.000 |
| Ättiksyra | 6 | 16.333 | 6.1210 | 8.000 | 24.000 |
| Socker | 6 | 40.167 | 15.2501 | 21.000 | 62.000 |
| BUF | 6 | 1.283 | 2.4774 | 0.100 | 6.300 |
| AATp20 | 6 | 80.210 | 2.3912 | 75.659 | 81.929 |
| PBVp20 | 6 | 19.905 | 11.7485 | 5.016 | 33.847 |
| NELp20 | 6 | 6.092 | 0.2450 | 5.770 | 6.419 |
| OE* | 6 | 10.733 | 0.2733 | 10.300 | 11.100 |
| AAT* | 6 | 70.833 | 0.7528 | 70.000 | 72.000 |
| PBV* | 6 | 24.167 | 11.8223 | 8.000 | 40.000 |
| Ca | 6 | 7.583 | 1.4006 | 5.800 | 9.400 |
| P | 6 | 2.883 | 0.1169 | 2.800 | 3.100 |
| Mg | 6 | 2.433 | 0.3559 | 2.100 | 3.100 |
| K | 6 | 25.800 | 3.8074 | 21.200 | 32.600 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 6 | 0.533 | 0.2066 | 0.300 | 0.800 |
| Cl | 6 | 5.900 | 4.4672 | 3.100 | 14.600 |
| S | 6 | 2.050 | 0.3728 | 1.500 | 2.500 |
| CAB | 6 | 388.713 | 55.4308 | 292.329 | 440.667 |
| Fe | 6 | 125.167 | 44.7456 | 83.000 | 202.000 |
| Mn | 6 | 58.667 | 13.0179 | 36.000 | 76.000 |
| Zn | 6 | 24.000 | 2.0976 | 21.000 | 26.000 |
| Cu | 6 | 7.483 | 0.6676 | 6.500 | 8.400 |

**Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 4 | 363.500 | 158.807 | 242.000 | 582.000 |
| Aska | 4 | 81.500 | 15.588 | 60.000 | 93.000 |
| OS smbh | 4 | 73.425 | 3.524 | 68.600 | 76.900 |
| Råprot | 4 | 150.250 | 49.358 | 97.000 | 210.000 |
| sRåprot | 4 | 535.250 | 83.060 | 439.000 | 624.000 |
| NH3-N | 4 | 135.500 | 138.856 | 51.000 | 341.000 |
| NDF | 4 | 451.500 | 48.267 | 406.000 | 516.000 |
| iNDF | 4 | 191.088 | 51.578 | 135.000 | 260.000 |
| nhNDF | 4 | 4.222 | 0.476 | 3.770 | 4.774 |
| TAF | 4 | 79.200 | 50.219 | 18.600 | 134.000 |
| Mjölksyra | 4 | 40.250 | 37.748 | 11.000 | 91.000 |
| Ättiksyra | 4 | 25.500 | 20.761 | 5.000 | 48.000 |
| Socker | 4 | 72.000 | 80.718 | 5.000 | 172.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| PRF | 2 | 9.500 | 9.192 | 3.000 | 16.000 |
| BUF | 4 | 8.200 | 13.219 | 0.600 | 28.000 |
| AATp20 | 4 | 80.268 | 3.819 | 75.595 | 83.409 |
| PBVp20 | 4 | 23.708 | 49.955 | -30.056 | 80.821 |
| NELp20 | 4 | 5.955 | 0.450 | 5.569 | 6.593 |
| OE* | 4 | 10.560 | 0.613 | 9.650 | 10.990 |
| AAT* | 2 | 71.000 | 0.000 | 71.000 | 71.000 |
| PBV* | 2 | -10.500 | 20.506 | -25.000 | 4.000 |
| Ca | 4 | 7.300 | 0.993 | 6.100 | 8.500 |
| P | 4 | 2.925 | 0.650 | 2.300 | 3.800 |
| Mg | 4 | 2.700 | 0.271 | 2.300 | 2.900 |
| K | 4 | 21.075 | 5.826 | 13.700 | 27.600 |
| Na | 4 | 1.025 | 0.450 | 0.800 | 1.700 |
| Cl | 4 | 5.475 | 0.793 | 4.500 | 6.300 |
| S | 4 | 2.575 | 0.435 | 2.200 | 3.000 |
| CAB | 4 | 268.405 | 129.974 | 120.906 | 426.098 |
| Fe | 3 | 159.333 | 151.477 | 64.000 | 334.000 |
| Mn | 3 | 116.667 | 42.395 | 78.000 | 162.000 |
| Zn | 3 | 24.667 | 3.055 | 22.000 | 28.000 |
| Cu | 3 | 7.133 | 3.421 | 4.500 | 11.000 |
| Se | 1 | 0.050 | . | 0.050 | 0.050 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=5**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 2 | 270.500 | 4.950 | 267.000 | 274.000 |
| Aska | 2 | 88.000 | 1.414 | 87.000 | 89.000 |
| OS smbh | 2 | 72.900 | 4.950 | 69.400 | 76.400 |
| Råprot | 2 | 194.000 | 22.627 | 178.000 | 210.000 |
| sRåprot | 2 | 554.500 | 120.915 | 469.000 | 640.000 |
| NH3-N | 2 | 174.500 | 91.217 | 110.000 | 239.000 |
| NDF | 2 | 475.000 | 63.640 | 430.000 | 520.000 |
| iNDF | 2 | 191.500 | 65.761 | 145.000 | 238.000 |
| nhNDF | 2 | 4.529 | 0.137 | 4.432 | 4.625 |
| TAF | 2 | 118.000 | 15.556 | 107.000 | 129.000 |
| Mjölksyra | 2 | 56.500 | 31.820 | 34.000 | 79.000 |
| Ättiksyra | 2 | 44.000 | 0.000 | 44.000 | 44.000 |
| Socker | 2 | 9.500 | 2.121 | 8.000 | 11.000 |
| PRF | 2 | 7.500 | 6.364 | 3.000 | 12.000 |
| BUF | 2 | 10.000 | 9.899 | 3.000 | 17.000 |
| AATp20 | 2 | 78.280 | 0.228 | 78.119 | 78.441 |
| PBVp20 | 2 | 67.118 | 20.149 | 52.871 | 81.365 |
| NELp20 | 2 | 6.166 | 0.535 | 5.787 | 6.544 |
| OE* | 2 | 10.405 | 0.785 | 9.850 | 10.960 |
| Ca | 2 | 6.050 | 0.071 | 6.000 | 6.100 |
| P | 2 | 3.550 | 0.354 | 3.300 | 3.800 |
| Mg | 2 | 2.300 | 0.424 | 2.000 | 2.600 |
| K | 2 | 28.200 | 4.101 | 25.300 | 31.100 |
| Na | 2 | 1.100 | 0.707 | 0.600 | 1.600 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=5**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Cl | 2 | 8.100 | 5.940 | 3.900 | 12.300 |
| S | 2 | 3.150 | 0.354 | 2.900 | 3.400 |
| CAB | 2 | 344.010 | 115.266 | 262.505 | 425.515 |
| Fe | 1 | 188.000 | . | 188.000 | 188.000 |
| Mn | 1 | 60.000 | . | 60.000 | 60.000 |
| Zn | 1 | 25.000 | . | 25.000 | 25.000 |
| Cu | 1 | 10.000 | . | 10.000 | 10.000 |
| Se | 1 | 0.050 | . | 0.050 | 0.050 |

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 3 | 467.333 | 138.414 | 339.000 | 614.000 |
| Aska | 3 | 88.000 | 23.065 | 70.000 | 114.000 |
| OS smbh | 3 | 77.933 | 4.535 | 72.900 | 81.700 |
| Råprot | 3 | 151.000 | 21.633 | 133.000 | 175.000 |
| NDF | 3 | 445.000 | 18.248 | 424.000 | 457.000 |
| iNDF | 3 | 123.900 | 45.919 | 84.340 | 174.254 |
| nhNDF | 3 | 5.272 | 1.021 | 4.151 | 6.149 |
| TAF | 3 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socker | 3 | 113.333 | 46.285 | 60.000 | 143.000 |
| AATp20 | 3 | 85.737 | 6.637 | 78.418 | 91.363 |
| PBVp20 | 3 | 17.864 | 17.389 | -1.804 | 31.198 |
| NELp20 | 3 | 6.351 | 0.493 | 5.815 | 6.786 |
| OE* | 3 | 11.200 | 0.964 | 10.100 | 11.900 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AAT* | 3 | 77.000 | 5.196 | 71.000 | 80.000 |
| PBV* | 3 | 18.000 | 20.298 | -4.000 | 36.000 |
| Ca | 2 | 6.200 | 1.273 | 5.300 | 7.100 |
| P | 2 | 2.950 | 0.495 | 2.600 | 3.300 |
| Mg | 2 | 2.400 | 0.566 | 2.000 | 2.800 |
| K | 2 | 24.550 | 7.000 | 19.600 | 29.500 |
| Na | 2 | 0.600 | 0.424 | 0.300 | 0.900 |
| S | 2 | 2.900 | 0.566 | 2.500 | 3.300 |
| CAB | 2 | 343.137 | 195.946 | 204.582 | 481.692 |
| Fe | 2 | 212.500 | 139.300 | 114.000 | 311.000 |
| Mn | 2 | 125.000 | 80.610 | 68.000 | 182.000 |
| Zn | 2 | 23.500 | 0.707 | 23.000 | 24.000 |
| Cu | 2 | 7.450 | 0.071 | 7.400 | 7.500 |
| Se | 2 | 0.032 | 0.021 | 0.017 | 0.047 |

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 56 | 393.018 | 89.353 | 280.000 | 508.000 |
| Aska | 56 | 72.250 | 11.892 | 57.000 | 90.000 |
| OS smbh | 56 | 78.177 | 3.898 | 72.900 | 82.900 |
| Råprot | 56 | 148.393 | 24.795 | 119.000 | 179.000 |
| sRåprot | 21 | 432.714 | 27.341 | 396.000 | 458.000 |
| NDF | 56 | 457.500 | 45.199 | 395.000 | 510.000 |
| iNDF | 56 | 111.960 | 44.186 | 67.000 | 177.692 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| nhNDF | 56 | 5.155 | 1.082 | 3.811 | 6.672 |
| TAF | 56 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socker | 56 | 123.589 | 39.752 | 69.000 | 166.000 |
| AATp20 | 56 | 87.993 | 4.933 | 81.364 | 92.948 |
| PBVp20 | 56 | 11.850 | 17.999 | -8.118 | 30.238 |
| NELp20 | 56 | 6.438 | 0.382 | 5.959 | 6.850 |
| OE* | 56 | 11.454 | 0.645 | 10.540 | 12.200 |
| AAT* | 35 | 78.600 | 3.897 | 73.000 | 83.000 |
| PBV* | 35 | 9.229 | 22.307 | -13.000 | 47.000 |
| Ca | 53 | 5.064 | 1.655 | 3.500 | 7.500 |
| P | 53 | 2.628 | 0.451 | 2.100 | 3.100 |
| Mg | 53 | 1.742 | 0.404 | 1.300 | 2.300 |
| K | 53 | 25.842 | 3.639 | 20.300 | 29.100 |
| Na | 49 | 0.596 | 0.375 | 0.200 | 1.100 |
| Cl | 21 | 7.748 | 3.269 | 4.300 | 12.200 |
| S | 53 | 1.917 | 0.324 | 1.600 | 2.300 |
| CAB | 53 | 400.823 | 106.628 | 256.882 | 529.019 |
| Fe | 44 | 106.091 | 41.970 | 69.000 | 153.000 |
| Mn | 44 | 54.500 | 22.322 | 34.000 | 69.000 |
| Zn | 44 | 26.000 | 4.441 | 21.000 | 33.000 |
| Cu | 44 | 6.130 | 1.245 | 4.700 | 8.000 |
| Se | 20 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 0.019 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 47 | 442.468 | 136.772 | 299.000 | 629.000 |
| Aska | 47 | 88.574 | 14.507 | 72.000 | 111.000 |
| OS smbh | 47 | 76.211 | 3.047 | 72.400 | 80.400 |
| Råprot | 47 | 158.894 | 22.279 | 128.000 | 189.000 |
| sRåprot | 19 | 399.368 | 58.204 | 354.000 | 450.000 |
| NDF | 47 | 469.553 | 46.227 | 399.000 | 514.000 |
| iNDF | 47 | 133.519 | 44.846 | 70.000 | 188.439 |
| nhNDF | 47 | 4.836 | 0.822 | 3.951 | 6.132 |
| TAF | 47 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socker | 47 | 89.170 | 41.468 | 25.000 | 134.000 |
| AATp20 | 47 | 86.051 | 4.984 | 80.299 | 92.811 |
| PBVp20 | 47 | 24.876 | 17.755 | -0.090 | 46.555 |
| NELp20 | 47 | 6.264 | 0.333 | 5.839 | 6.740 |
| OE* | 47 | 10.939 | 0.547 | 10.200 | 11.650 |
| AAT* | 28 | 74.821 | 2.763 | 71.000 | 79.000 |
| PBV* | 28 | 28.750 | 21.193 | 5.000 | 58.000 |
| Ca | 44 | 6.520 | 2.451 | 3.900 | 10.400 |
| P | 44 | 2.939 | 0.404 | 2.400 | 3.500 |
| Mg | 44 | 2.293 | 0.591 | 1.600 | 3.100 |
| K | 44 | 28.314 | 5.026 | 23.200 | 34.400 |
| Na | 44 | 0.939 | 0.686 | 0.400 | 1.400 |
| Cl | 19 | 9.968 | 4.430 | 3.700 | 17.100 |
| S | 44 | 2.316 | 0.389 | 1.900 | 2.700 |
| CAB | 44 | 423.977 | 141.733 | 227.436 | 617.781 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe | 35 | 103.743 | 40.251 | 74.000 | 141.000 |
| Mn | 35 | 61.000 | 25.191 | 32.000 | 84.000 |
| Zn | 35 | 28.629 | 12.417 | 21.000 | 33.000 |
| Cu | 35 | 7.960 | 1.355 | 6.600 | 10.300 |
| Se | 12 | 0.074 | 0.188 | 0.009 | 0.050 |

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 31 | 429.000 | 112.305 | 303.000 | 564.000 |
| Aska | 29 | 90.931 | 15.050 | 71.000 | 112.000 |
| OS smbh | 31 | 73.106 | 4.146 | 68.000 | 78.500 |
| Råprot | 29 | 161.103 | 17.797 | 136.000 | 181.000 |
| sRåprot | 11 | 360.636 | 77.448 | 300.000 | 410.000 |
| NDF | 29 | 434.310 | 46.765 | 354.000 | 487.000 |
| iNDF | 31 | 200.047 | 75.451 | 117.000 | 295.596 |
| nhNDF | 31 | 4.058 | 1.165 | 2.245 | 5.407 |
| TAF | 31 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socker | 29 | 81.724 | 34.169 | 22.000 | 128.000 |
| AATp20 | 31 | 82.720 | 6.491 | 73.859 | 89.296 |
| PBVp20 | 31 | 31.745 | 15.426 | 16.370 | 53.142 |
| NELp20 | 31 | 5.920 | 0.458 | 5.295 | 6.467 |
| OE* | 29 | 10.388 | 0.786 | 9.300 | 11.400 |
| AAT* | 18 | 71.722 | 4.561 | 67.000 | 78.000 |
| PBV* | 18 | 34.778 | 14.587 | 17.000 | 64.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ca | 26 | 9.154 | 3.380 | 5.300 | 13.900 |
| P | 26 | 2.677 | 0.475 | 1.900 | 3.200 |
| Mg | 26 | 2.938 | 0.858 | 1.900 | 4.400 |
| K | 26 | 23.704 | 3.627 | 18.700 | 27.900 |
| Na | 26 | 1.123 | 0.371 | 0.800 | 1.600 |
| Cl | 11 | 7.764 | 3.913 | 5.200 | 11.600 |
| S | 26 | 2.323 | 0.349 | 1.900 | 2.900 |
| CAB | 26 | 342.160 | 89.803 | 228.631 | 462.526 |
| Fe | 20 | 145.900 | 121.996 | 70.000 | 199.000 |
| Mn | 20 | 60.200 | 16.898 | 39.500 | 80.500 |
| Zn | 20 | 26.350 | 2.390 | 23.000 | 29.500 |
| Cu | 20 | 8.315 | 1.805 | 6.600 | 11.500 |
| Se | 13 | 0.044 | 0.029 | 0.012 | 0.067 |

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 15 | 356.200 | 179.734 | 198.000 | 585.000 |
| Aska | 15 | 92.867 | 15.028 | 64.000 | 113.000 |
| OS smbh | 15 | 76.973 | 2.331 | 75.200 | 80.400 |
| Råprot | 15 | 181.267 | 23.138 | 137.000 | 206.000 |
| sRåprot | 6 | 368.833 | 14.162 | 347.000 | 389.000 |
| NDF | 15 | 443.467 | 28.276 | 406.000 | 475.000 |
| iNDF | 15 | 143.601 | 39.832 | 84.979 | 200.000 |
| nhNDF | 15 | 5.172 | 0.910 | 4.043 | 6.410 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TAF | 15 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socker | 15 | 88.533 | 43.492 | 29.000 | 121.000 |
| AATp20 | 15 | 88.146 | 3.837 | 84.031 | 92.300 |
| PBVp20 | 15 | 42.495 | 22.959 | -0.593 | 70.597 |
| NELp20 | 15 | 6.347 | 0.195 | 6.109 | 6.592 |
| OE* | 15 | 11.005 | 0.477 | 10.500 | 11.600 |
| AAT* | 9 | 75.444 | 3.206 | 70.000 | 81.000 |
| PBV* | 9 | 51.889 | 25.335 | -3.000 | 85.000 |
| Ca | 14 | 7.964 | 1.975 | 6.200 | 10.600 |
| P | 14 | 3.464 | 0.681 | 2.700 | 4.200 |
| Mg | 14 | 2.693 | 0.511 | 1.900 | 3.200 |
| K | 14 | 28.907 | 4.862 | 23.700 | 33.900 |
| Na | 13 | 1.477 | 0.551 | 0.800 | 2.200 |
| Cl | 6 | 9.967 | 4.845 | 1.400 | 15.500 |
| S | 14 | 2.900 | 0.551 | 2.000 | 3.400 |
| CAB | 14 | 425.297 | 127.595 | 243.847 | 549.243 |
| Fe | 11 | 160.364 | 96.385 | 73.000 | 272.000 |
| Mn | 11 | 72.818 | 38.958 | 38.000 | 135.000 |
| Zn | 11 | 31.364 | 8.846 | 24.000 | 48.000 |
| Cu | 11 | 8.391 | 1.149 | 7.000 | 9.200 |
| Se | 6 | 0.043 | 0.059 | 0.010 | 0.162 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 10 | 404.400 | 142.631 | 258.000 | 607.50 |
| Aska | 10 | 84.300 | 30.302 | 54.500 | 127.50 |
| OS smbh | 10 | 72.210 | 5.045 | 64.950 | 77.95 |
| Råprot | 10 | 128.500 | 27.666 | 81.000 | 158.50 |
| sRåprot | 10 | 550.700 | 94.865 | 436.000 | 664.50 |
| NH3-N | 10 | 84.700 | 45.233 | 43.000 | 155.50 |
| NDF | 10 | 446.600 | 101.701 | 372.500 | 632.50 |
| iNDF | 10 | 197.014 | 45.957 | 145.811 | 257.41 |
| nhNDF | 10 | 3.702 | 0.712 | 2.695 | 4.41 |
| TAF | 10 | 67.100 | 27.539 | 29.300 | 103.60 |
| Mjölksyra | 10 | 49.400 | 20.057 | 17.500 | 71.00 |
| Ättiksyra | 10 | 13.300 | 5.539 | 7.000 | 22.50 |
| Socker | 10 | 65.200 | 38.795 | 23.000 | 124.00 |
| BUF | 10 | 3.400 | 6.652 | 0.100 | 12.40 |
| AATp20 | 10 | 79.111 | 6.037 | 70.067 | 85.37 |
| PBVp20 | 10 | 7.819 | 25.730 | -31.683 | 38.87 |
| NELp20 | 10 | 5.791 | 0.457 | 5.163 | 6.30 |
| OE* | 10 | 10.330 | 0.872 | 9.150 | 11.30 |
| AAT* | 10 | 69.600 | 2.757 | 66.000 | 72.50 |
| PBV* | 10 | 8.800 | 25.455 | -33.500 | 37.50 |
| Ca | 10 | 7.460 | 3.123 | 3.650 | 11.30 |
| P | 10 | 2.650 | 0.406 | 2.050 | 3.10 |
| Mg | 10 | 2.290 | 0.746 | 1.300 | 3.15 |
| K | 10 | 22.810 | 3.668 | 17.600 | 27.05 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 10 | 0.900 | 0.706 | 0.300 | 2.05 |
| Cl | 10 | 6.760 | 2.571 | 3.600 | 10.40 |
| S | 10 | 1.650 | 0.363 | 1.250 | 2.20 |
| CAB | 10 | 328.959 | 122.580 | 164.340 | 502.98 |
| Fe | 10 | 356.000 | 589.879 | 62.000 | 1156.00 |
| Mn | 10 | 85.600 | 34.600 | 49.500 | 137.50 |
| Zn | 10 | 24.000 | 2.625 | 20.000 | 27.00 |
| Cu | 10 | 6.710 | 1.730 | 4.350 | 9.00 |
| Se | 3 | 0.018 | 0.005 | 0.013 | 0.02 |

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 195 | 408.979 | 123.576 | 284.000 | 570.000 |
| Aska | 195 | 72.503 | 11.849 | 62.000 | 82.000 |
| OS smbh | 197 | 76.196 | 4.367 | 69.500 | 80.100 |
| Råprot | 195 | 141.779 | 26.908 | 104.000 | 176.000 |
| sRåprot | 195 | 639.769 | 90.090 | 531.000 | 737.000 |
| NH3-N | 194 | 85.603 | 31.401 | 46.000 | 118.000 |
| NDF | 195 | 454.164 | 50.382 | 401.000 | 525.000 |
| iNDF | 197 | 146.207 | 47.600 | 104.230 | 206.233 |
| nhNDF | 197 | 4.703 | 0.717 | 3.750 | 5.571 |
| TAF | 197 | 65.908 | 29.548 | 22.000 | 103.100 |
| Mjölksyra | 195 | 49.959 | 25.424 | 13.000 | 83.000 |
| Ättiksyra | 195 | 13.067 | 6.469 | 6.000 | 20.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Socker | 195 | 68.949 | 39.675 | 21.000 | 125.000 |
| PRF | 35 | 1.857 | 2.212 | 0.000 | 6.000 |
| BUF | 195 | 1.728 | 2.725 | 0.000 | 3.700 |
| AATp20 | 197 | 83.178 | 4.314 | 77.448 | 88.223 |
| PBVp20 | 197 | 13.641 | 22.719 | -13.921 | 41.674 |
| NELp20 | 197 | 6.292 | 0.451 | 5.638 | 6.723 |
| OE* | 195 | 11.127 | 0.724 | 10.000 | 11.800 |
| AAT* | 160 | 72.038 | 2.065 | 69.000 | 74.000 |
| PBV* | 160 | 16.288 | 23.760 | -15.000 | 46.000 |
| Ca | 192 | 5.230 | 1.497 | 3.800 | 7.400 |
| P | 192 | 2.557 | 0.410 | 2.000 | 3.100 |
| Mg | 192 | 1.752 | 0.373 | 1.400 | 2.200 |
| K | 192 | 24.433 | 4.355 | 18.600 | 29.100 |
| Na | 192 | 0.648 | 0.512 | 0.200 | 1.300 |
| Cl | 195 | 5.677 | 2.845 | 2.100 | 9.500 |
| S | 192 | 1.890 | 0.395 | 1.400 | 2.400 |
| CAB | 192 | 374.031 | 109.759 | 235.923 | 483.415 |
| Fe | 175 | 174.811 | 124.981 | 78.000 | 322.000 |
| Mn | 175 | 61.686 | 29.033 | 38.000 | 87.000 |
| Zn | 175 | 27.880 | 18.316 | 21.000 | 31.000 |
| Cu | 175 | 5.910 | 1.242 | 4.400 | 7.300 |
| Se | 40 | 0.018 | 0.015 | 0.006 | 0.047 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 167 | 466.395 | 142.971 | 301.000 | 682.000 |
| Aska | 167 | 82.599 | 10.193 | 69.000 | 95.000 |
| OS smbh | 167 | 74.817 | 2.426 | 71.700 | 77.800 |
| Råprot | 167 | 149.246 | 26.998 | 114.000 | 183.000 |
| sRåprot | 167 | 532.389 | 97.320 | 392.000 | 640.000 |
| NH3-N | 163 | 73.448 | 29.396 | 36.000 | 111.000 |
| NDF | 167 | 448.293 | 39.787 | 385.000 | 495.000 |
| iNDF | 167 | 167.940 | 35.390 | 130.223 | 212.573 |
| nhNDF | 167 | 4.367 | 0.778 | 3.431 | 5.088 |
| Stä | 1 | 80.000 | . | 80.000 | 80.000 |
| TAF | 167 | 55.510 | 27.630 | 17.500 | 91.100 |
| Mjölksyra | 167 | 40.737 | 22.640 | 10.000 | 71.000 |
| Ättiksyra | 165 | 12.103 | 6.333 | 5.000 | 19.000 |
| Socker | 167 | 67.856 | 39.015 | 19.000 | 121.000 |
| PRF | 26 | 2.000 | 2.245 | 0.000 | 6.000 |
| BUF | 165 | 1.449 | 3.382 | 0.000 | 3.300 |
| AATp20 | 167 | 84.482 | 4.496 | 79.652 | 90.194 |
| PBVp20 | 167 | 18.548 | 25.194 | -14.816 | 49.300 |
| NELp20 | 167 | 6.117 | 0.293 | 5.729 | 6.484 |
| OE* | 167 | 10.773 | 0.371 | 10.300 | 11.300 |
| AAT* | 139 | 70.906 | 1.103 | 69.000 | 72.000 |
| PBV* | 139 | 24.201 | 23.437 | -8.000 | 56.000 |
| Ca | 163 | 6.763 | 1.883 | 4.600 | 9.700 |
| P | 163 | 2.810 | 0.383 | 2.300 | 3.300 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mg | 163 | 2.300 | 0.408 | 1.800 | 2.800 |
| K | 163 | 26.436 | 4.688 | 19.900 | 32.100 |
| Na | 163 | 0.912 | 0.726 | 0.300 | 1.700 |
| Cl | 166 | 8.300 | 4.899 | 3.900 | 13.100 |
| S | 163 | 2.206 | 0.479 | 1.600 | 2.800 |
| CAB | 163 | 342.859 | 127.643 | 216.023 | 488.233 |
| Fe | 152 | 158.033 | 153.527 | 74.000 | 269.000 |
| Mn | 152 | 70.033 | 24.925 | 41.000 | 105.000 |
| Zn | 152 | 27.757 | 12.818 | 22.000 | 32.000 |
| Cu | 152 | 7.530 | 1.596 | 5.600 | 9.500 |
| Se | 29 | 0.021 | 0.013 | 0.010 | 0.044 |

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 75 | 472.960 | 134.289 | 330.000 | 654.000 |
| Aska | 75 | 84.160 | 8.542 | 74.000 | 95.000 |
| OS smbh | 77 | 75.268 | 2.774 | 72.000 | 78.500 |
| Råprot | 75 | 159.067 | 25.692 | 130.000 | 191.000 |
| sRåprot | 75 | 508.267 | 103.363 | 393.000 | 625.000 |
| NH3-N | 75 | 67.360 | 29.571 | 29.000 | 97.000 |
| NDF | 75 | 413.800 | 35.902 | 362.000 | 453.000 |
| iNDF | 77 | 176.560 | 40.440 | 129.229 | 228.329 |
| nhNDF | 77 | 4.169 | 0.845 | 3.079 | 4.937 |
| TAF | 77 | 51.149 | 27.193 | 17.500 | 87.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölksyra | 75 | 37.213 | 23.759 | 11.000 | 70.000 |
| Ättiksyra | 74 | 11.257 | 5.753 | 5.000 | 19.000 |
| Socker | 75 | 77.080 | 39.262 | 31.000 | 133.000 |
| PRF | 14 | 0.929 | 1.269 | 0.000 | 3.000 |
| BUF | 74 | 1.277 | 2.509 | 0.000 | 2.600 |
| AATp20 | 77 | 85.902 | 5.433 | 78.450 | 92.462 |
| PBVp20 | 77 | 25.183 | 22.852 | -2.366 | 56.492 |
| NELp20 | 77 | 6.122 | 0.309 | 5.698 | 6.478 |
| OE* | 75 | 10.835 | 0.478 | 10.220 | 11.400 |
| AAT* | 60 | 70.967 | 1.461 | 69.000 | 72.500 |
| PBV* | 60 | 30.567 | 22.417 | 0.000 | 58.000 |
| Ca | 74 | 8.684 | 2.644 | 6.000 | 13.300 |
| P | 74 | 2.615 | 0.451 | 2.000 | 3.200 |
| Mg | 74 | 2.762 | 0.484 | 2.300 | 3.500 |
| K | 74 | 24.195 | 3.800 | 19.500 | 28.300 |
| Na | 74 | 1.203 | 2.071 | 0.300 | 2.000 |
| Cl | 75 | 8.928 | 5.231 | 3.800 | 14.300 |
| S | 74 | 2.470 | 0.500 | 1.900 | 3.000 |
| CAB | 74 | 266.097 | 111.527 | 134.769 | 413.614 |
| Fe | 66 | 160.727 | 129.018 | 82.000 | 266.000 |
| Mn | 66 | 70.152 | 25.658 | 42.000 | 105.000 |
| Zn | 66 | 25.970 | 4.644 | 21.000 | 32.000 |
| Cu | 66 | 7.789 | 1.694 | 5.900 | 10.100 |
| Se | 18 | 0.039 | 0.022 | 0.012 | 0.074 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 12 | 355.583 | 87.800 | 262.000 | 450.000 |
| Aska | 12 | 92.417 | 13.304 | 80.000 | 108.000 |
| OS smbh | 12 | 74.983 | 3.088 | 71.800 | 79.200 |
| Råprot | 12 | 167.333 | 28.710 | 141.000 | 212.000 |
| sRåprot | 12 | 559.500 | 46.489 | 517.000 | 626.000 |
| NH3-N | 12 | 71.750 | 26.039 | 44.000 | 107.000 |
| NDF | 12 | 416.583 | 41.736 | 371.000 | 462.000 |
| iNDF | 12 | 183.523 | 54.680 | 106.051 | 229.347 |
| nhNDF | 12 | 4.288 | 0.816 | 3.245 | 5.294 |
| TAF | 12 | 82.342 | 33.734 | 58.000 | 132.000 |
| Mjölksyra | 12 | 66.500 | 28.558 | 45.000 | 113.000 |
| Ättiksyra | 12 | 14.167 | 6.436 | 7.000 | 19.000 |
| Socker | 12 | 43.667 | 46.032 | 10.000 | 90.000 |
| PRF | 6 | 0.833 | 1.602 | 0.000 | 4.000 |
| BUF | 12 | 0.758 | 1.401 | 0.000 | 1.900 |
| AATp20 | 12 | 81.856 | 4.196 | 77.905 | 86.403 |
| PBVp20 | 12 | 39.605 | 27.086 | 5.026 | 77.607 |
| NELp20 | 12 | 6.202 | 0.334 | 5.806 | 6.552 |
| OE* | 12 | 10.698 | 0.515 | 10.200 | 11.460 |
| AAT* | 6 | 70.333 | 1.862 | 69.000 | 74.000 |
| PBV* | 6 | 35.333 | 30.878 | -1.000 | 90.000 |
| Ca | 12 | 8.450 | 1.599 | 6.100 | 10.100 |
| P | 12 | 2.867 | 0.579 | 2.200 | 3.600 |
| Mg | 12 | 2.575 | 0.352 | 2.100 | 3.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| K | 12 | 25.000 | 4.896 | 18.700 | 31.200 |
| Na | 12 | 1.025 | 0.705 | 0.200 | 2.000 |
| Cl | 12 | 10.125 | 6.908 | 4.500 | 18.800 |
| S | 12 | 2.692 | 0.480 | 2.200 | 3.200 |
| CAB | 12 | 230.511 | 189.872 | -61.942 | 434.071 |
| Fe | 10 | 301.900 | 226.688 | 110.000 | 690.500 |
| Mn | 10 | 83.000 | 37.473 | 46.500 | 139.500 |
| Zn | 10 | 26.700 | 3.773 | 21.000 | 31.000 |
| Cu | 10 | 8.580 | 2.571 | 6.250 | 12.500 |
| Se | 1 | 0.070 | . | 0.070 | 0.070 |

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 519.000 | . | 519.000 | 519.000 |
| Aska | 1 | 84.000 | . | 84.000 | 84.000 |
| OS smbh | 1 | 79.800 | . | 79.800 | 79.800 |
| Råprot | 1 | 166.000 | . | 166.000 | 166.000 |
| sRåprot | 1 | 632.000 | . | 632.000 | 632.000 |
| NH3-N | 1 | 58.000 | . | 58.000 | 58.000 |
| NDF | 1 | 417.000 | . | 417.000 | 417.000 |
| iNDF | 1 | 107.000 | . | 107.000 | 107.000 |
| nhNDF | 1 | 5.278 | . | 5.278 | 5.278 |
| TAF | 1 | 76.000 | . | 76.000 | 76.000 |
| Mjölksyra | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ättiksyra | 1 | 7.000 | . | 7.000 | 7.000 |
| Socker | 1 | 75.000 | . | 75.000 | 75.000 |
| PRF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| BUF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 1 | 86.115 | . | 86.115 | 86.115 |
| PBVp20 | 1 | 31.239 | . | 31.239 | 31.239 |
| NELp20 | 1 | 6.677 | . | 6.677 | 6.677 |
| OE* | 1 | 11.570 | . | 11.570 | 11.570 |
| Ca | 1 | 6.600 | . | 6.600 | 6.600 |
| P | 1 | 3.600 | . | 3.600 | 3.600 |
| Mg | 1 | 1.700 | . | 1.700 | 1.700 |
| K | 1 | 25.400 | . | 25.400 | 25.400 |
| Na | 1 | 0.800 | . | 0.800 | 0.800 |
| Cl | 1 | 14.800 | . | 14.800 | 14.800 |
| S | 1 | 3.000 | . | 3.000 | 3.000 |
| CAB | 1 | 79.998 | . | 79.998 | 79.998 |
| Fe | 1 | 88.000 | . | 88.000 | 88.000 |
| Mn | 1 | 122.000 | . | 122.000 | 122.000 |
| Zn | 1 | 18.000 | . | 18.000 | 18.000 |
| Cu | 1 | 8.000 | . | 8.000 | 8.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 17 | 456.647 | 86.441 | 375.000 | 578.000 |
| Aska | 17 | 63.471 | 15.472 | 43.000 | 86.000 |
| OS smbh | 17 | 69.529 | 2.938 | 64.900 | 73.000 |
| Råprot | 17 | 96.941 | 25.359 | 70.000 | 123.000 |
| sRåprot | 17 | 620.353 | 117.876 | 475.000 | 767.000 |
| NH3-N | 17 | 74.353 | 28.222 | 45.000 | 106.000 |
| NDF | 17 | 436.824 | 75.294 | 321.000 | 539.000 |
| iNDF | 17 | 243.306 | 38.309 | 183.978 | 283.818 |
| nhNDF | 17 | 2.892 | 0.826 | 1.512 | 3.929 |
| Stä | 17 | 131.176 | 97.384 | 18.000 | 262.000 |
| TAF | 17 | 50.082 | 25.739 | 18.700 | 94.000 |
| Mjölksyra | 17 | 33.765 | 16.961 | 9.000 | 54.000 |
| Ättiksyra | 17 | 13.529 | 10.094 | 4.000 | 18.000 |
| Socker | 17 | 76.706 | 33.401 | 37.000 | 123.000 |
| PRF | 4 | 4.500 | 6.137 | 0.000 | 13.000 |
| BUF | 4 | 1.500 | 1.291 | 0.000 | 3.000 |
| AATp20 | 17 | 72.231 | 3.317 | 67.772 | 77.074 |
| PBVp20 | 17 | -19.006 | 22.888 | -41.590 | 1.590 |
| NELp20 | 17 | 5.595 | 0.307 | 5.145 | 5.921 |
| OE* | 5 | 10.244 | 0.327 | 9.700 | 10.530 |
| AAT* | 1 | 63.000 | . | 63.000 | 63.000 |
| PBV* | 1 | -40.000 | . | -40.000 | -40.000 |
| Ca | 14 | 3.771 | 1.257 | 2.300 | 5.000 |
| P | 14 | 2.593 | 0.772 | 1.800 | 3.700 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mg | 14 | 1.657 | 0.488 | 1.100 | 2.300 |
| K | 14 | 17.371 | 5.666 | 10.900 | 23.500 |
| Na | 14 | 0.879 | 0.351 | 0.400 | 1.400 |
| Cl | 17 | 5.818 | 3.338 | 2.400 | 10.300 |
| S | 14 | 1.643 | 0.477 | 1.100 | 2.200 |
| CAB | 14 | 219.440 | 97.310 | 128.226 | 381.679 |
| Fe | 12 | 218.083 | 412.958 | 65.000 | 170.000 |
| Mn | 12 | 57.500 | 45.063 | 13.000 | 97.000 |
| Zn | 12 | 23.167 | 6.436 | 18.000 | 30.000 |
| Cu | 12 | 5.017 | 1.316 | 3.900 | 6.200 |

**Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 11 | 418.455 | 71.655 | 353.000 | 501.000 |
| Aska | 11 | 67.000 | 15.868 | 52.000 | 88.000 |
| OS smbh | 11 | 67.564 | 2.127 | 65.200 | 70.100 |
| Råprot | 11 | 104.182 | 20.537 | 80.000 | 118.000 |
| sRåprot | 11 | 602.091 | 117.561 | 450.000 | 725.000 |
| NH3-N | 11 | 83.636 | 28.678 | 46.000 | 107.000 |
| NDF | 11 | 434.273 | 32.032 | 407.000 | 465.000 |
| iNDF | 11 | 270.205 | 27.621 | 229.949 | 300.757 |
| nhNDF | 11 | 2.581 | 0.408 | 2.199 | 3.137 |
| Stä | 11 | 133.636 | 88.001 | 31.000 | 218.000 |
| TAF | 11 | 61.000 | 19.494 | 48.000 | 87.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölksyra | 11 | 44.545 | 17.700 | 32.000 | 65.000 |
| Ättiksyra | 11 | 14.455 | 3.698 | 11.000 | 19.000 |
| Socker | 11 | 42.909 | 32.986 | 13.000 | 77.000 |
| AATp20 | 11 | 70.747 | 3.831 | 65.414 | 74.019 |
| PBVp20 | 11 | -6.117 | 20.055 | -29.019 | 13.134 |
| NELp20 | 11 | 5.540 | 0.196 | 5.339 | 5.800 |
| OE* | 2 | 10.100 | 0.000 | 10.100 | 10.100 |
| AAT* | 2 | 62.500 | 2.121 | 61.000 | 64.000 |
| PBV* | 2 | -14.000 | 9.899 | -21.000 | -7.000 |
| Ca | 10 | 5.010 | 1.142 | 3.300 | 6.400 |
| P | 10 | 2.580 | 0.444 | 2.150 | 3.300 |
| Mg | 10 | 1.890 | 0.443 | 1.350 | 2.500 |
| K | 10 | 18.500 | 5.102 | 13.550 | 27.150 |
| Na | 10 | 0.940 | 0.593 | 0.350 | 1.750 |
| Cl | 11 | 6.255 | 3.621 | 2.700 | 11.100 |
| S | 10 | 1.510 | 0.288 | 1.200 | 2.000 |
| CAB | 10 | 240.485 | 113.928 | 63.991 | 359.065 |
| Fe | 10 | 273.500 | 252.361 | 88.000 | 686.000 |
| Mn | 10 | 73.600 | 39.914 | 24.500 | 127.500 |
| Zn | 10 | 29.600 | 7.792 | 20.000 | 41.500 |
| Cu | 10 | 5.350 | 1.028 | 4.050 | 6.650 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 3 | 392.667 | 61.076 | 323.000 | 437.000 |
| Aska | 3 | 72.667 | 4.509 | 68.000 | 77.000 |
| OS smbh | 3 | 69.233 | 2.458 | 66.900 | 71.800 |
| Råprot | 3 | 134.333 | 8.386 | 129.000 | 144.000 |
| sRåprot | 3 | 554.000 | 30.806 | 526.000 | 587.000 |
| NH3-N | 3 | 61.000 | 32.419 | 32.000 | 96.000 |
| NDF | 3 | 369.000 | 63.095 | 304.000 | 430.000 |
| iNDF | 3 | 333.000 | 36.756 | 294.000 | 367.000 |
| nhNDF | 3 | 2.662 | 0.900 | 1.788 | 3.586 |
| Stä | 3 | 145.333 | 85.594 | 76.000 | 241.000 |
| TAF | 3 | 101.667 | 18.148 | 81.000 | 115.000 |
| Mjölksyra | 3 | 67.000 | 6.245 | 62.000 | 74.000 |
| Ättiksyra | 3 | 28.333 | 12.014 | 16.000 | 40.000 |
| Socker | 3 | 40.333 | 18.502 | 22.000 | 59.000 |
| PRF | 3 | 5.000 | 4.359 | 0.000 | 8.000 |
| BUF | 3 | 1.333 | 2.309 | 0.000 | 4.000 |
| AATp20 | 3 | 68.859 | 4.355 | 65.658 | 73.818 |
| PBVp20 | 3 | 23.395 | 0.802 | 22.469 | 23.868 |
| NELp20 | 3 | 5.834 | 0.235 | 5.630 | 6.091 |
| OE* | 3 | 9.973 | 0.457 | 9.540 | 10.450 |
| Ca | 3 | 6.867 | 1.518 | 5.500 | 8.500 |
| P | 3 | 2.600 | 0.819 | 1.900 | 3.500 |
| Mg | 3 | 1.867 | 0.551 | 1.500 | 2.500 |
| K | 3 | 19.133 | 1.305 | 18.100 | 20.600 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 3 | 5.233 | 6.813 | 1.300 | 13.100 |
| Cl | 3 | 12.667 | 13.560 | 4.100 | 28.300 |
| S | 3 | 2.600 | 0.917 | 1.600 | 3.400 |
| CAB | 3 | 197.572 | 98.953 | 86.736 | 277.036 |
| Fe | 2 | 421.500 | 287.792 | 218.000 | 625.000 |
| Mn | 2 | 82.500 | 48.790 | 48.000 | 117.000 |
| Zn | 2 | 63.000 | 12.728 | 54.000 | 72.000 |
| Cu | 2 | 8.500 | 0.707 | 8.000 | 9.000 |

**Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 2 | 419.000 | 135.765 | 323.000 | 515.000 |
| Aska | 2 | 66.500 | 7.778 | 61.000 | 72.000 |
| OS smbh | 2 | 65.000 | 3.818 | 62.300 | 67.700 |
| Råprot | 2 | 106.000 | 4.243 | 103.000 | 109.000 |
| sRåprot | 2 | 524.000 | 55.154 | 485.000 | 563.000 |
| NH3-N | 2 | 56.000 | 32.527 | 33.000 | 79.000 |
| NDF | 2 | 436.500 | 47.376 | 403.000 | 470.000 |
| iNDF | 2 | 430.368 | 120.729 | 345.000 | 515.736 |
| nhNDF | 2 | 4.959 | 3.182 | 2.709 | 7.209 |
| Stä | 2 | 111.000 | 45.255 | 79.000 | 143.000 |
| TAF | 2 | 60.250 | 46.315 | 27.500 | 93.000 |
| Mjölksyra | 2 | 46.000 | 41.012 | 17.000 | 75.000 |
| Ättiksyra | 2 | 11.500 | 2.121 | 10.000 | 13.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Socker | 2 | 39.500 | 26.163 | 21.000 | 58.000 |
| PRF | 1 | 3.000 | . | 3.000 | 3.000 |
| BUF | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| AATp20 | 2 | 69.519 | 2.359 | 67.851 | 71.187 |
| PBVp20 | 2 | -2.854 | 7.508 | -8.163 | 2.454 |
| NELp20 | 2 | 5.449 | 0.503 | 5.093 | 5.804 |
| OE* | 1 | 9.840 | . | 9.840 | 9.840 |
| Ca | 2 | 6.400 | 0.283 | 6.200 | 6.600 |
| P | 2 | 3.300 | 0.283 | 3.100 | 3.500 |
| Mg | 2 | 2.400 | 0.283 | 2.200 | 2.600 |
| K | 2 | 17.600 | 6.364 | 13.100 | 22.100 |
| Na | 2 | 1.050 | 0.778 | 0.500 | 1.600 |
| Cl | 2 | 4.550 | 0.354 | 4.300 | 4.800 |
| S | 2 | 1.950 | 0.071 | 1.900 | 2.000 |
| CAB | 2 | 245.736 | 134.483 | 150.642 | 340.830 |
| Fe | 1 | 183.000 | . | 183.000 | 183.000 |
| Mn | 1 | 173.000 | . | 173.000 | 173.000 |
| Zn | 1 | 169.000 | . | 169.000 | 169.000 |
| Cu | 1 | 6.500 | . | 6.500 | 6.500 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 9 | 382.889 | 103.129 | 243.000 | 598.000 |
| Aska | 9 | 60.667 | 19.118 | 22.000 | 88.000 |
| OS smbh | 9 | 66.067 | 4.124 | 60.700 | 73.000 |
| Råprot | 9 | 90.222 | 36.431 | 54.000 | 160.000 |
| sRåprot | 9 | 586.556 | 110.964 | 426.000 | 740.000 |
| NH3-N | 9 | 90.889 | 27.854 | 52.000 | 142.000 |
| NDF | 9 | 459.889 | 39.954 | 397.000 | 530.000 |
| iNDF | 9 | 283.790 | 53.142 | 183.836 | 378.000 |
| nhNDF | 9 | 2.667 | 0.648 | 1.747 | 3.950 |
| Stä | 9 | 99.333 | 79.232 | 17.000 | 224.000 |
| TAF | 9 | 69.222 | 25.999 | 32.000 | 114.000 |
| Mjölksyra | 9 | 50.444 | 23.415 | 15.000 | 94.000 |
| Ättiksyra | 9 | 16.889 | 4.372 | 8.000 | 23.000 |
| Socker | 9 | 50.778 | 20.105 | 14.000 | 71.000 |
| PRF | 2 | 5.000 | 1.414 | 4.000 | 6.000 |
| BUF | 2 | 3.500 | 0.707 | 3.000 | 4.000 |
| AATp20 | 9 | 71.721 | 5.797 | 62.910 | 81.519 |
| PBVp20 | 9 | -22.375 | 28.194 | -50.974 | 37.640 |
| NELp20 | 9 | 5.452 | 0.379 | 4.825 | 6.062 |
| OE* | 4 | 9.735 | 0.381 | 9.170 | 10.000 |
| AAT* | 2 | 64.500 | 0.707 | 64.000 | 65.000 |
| PBV* | 2 | -43.000 | 5.657 | -47.000 | -39.000 |
| Ca | 9 | 4.889 | 3.271 | 2.100 | 13.100 |
| P | 9 | 2.200 | 0.620 | 0.900 | 2.800 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mg | 9 | 1.589 | 0.688 | 0.500 | 3.000 |
| K | 9 | 18.011 | 7.315 | 5.200 | 27.500 |
| Na | 9 | 0.789 | 0.571 | 0.300 | 2.100 |
| Cl | 9 | 4.133 | 3.811 | 0.800 | 12.100 |
| S | 9 | 1.311 | 0.504 | 0.500 | 2.300 |
| CAB | 9 | 296.565 | 149.198 | 47.831 | 537.455 |
| Fe | 9 | 127.889 | 62.816 | 77.000 | 279.000 |
| Mn | 9 | 52.444 | 24.719 | 17.000 | 91.000 |
| Zn | 9 | 20.778 | 5.630 | 10.000 | 28.000 |
| Cu | 9 | 5.489 | 2.594 | 3.200 | 10.000 |

**Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 3 | 399.000 | 76.177 | 340.000 | 485.000 |
| Aska | 3 | 61.333 | 6.658 | 54.000 | 67.000 |
| OS smbh | 3 | 66.800 | 5.909 | 60.200 | 71.600 |
| Råprot | 3 | 127.000 | 24.637 | 101.000 | 150.000 |
| sRåprot | 3 | 540.000 | 147.075 | 441.000 | 709.000 |
| NH3-N | 3 | 68.667 | 38.592 | 38.000 | 112.000 |
| NDF | 3 | 459.333 | 45.281 | 410.000 | 499.000 |
| iNDF | 3 | 263.444 | 46.711 | 231.763 | 317.088 |
| nhNDF | 3 | 2.705 | 0.514 | 2.112 | 3.013 |
| Stä | 3 | 71.333 | 36.005 | 35.000 | 107.000 |
| TAF | 3 | 69.333 | 22.368 | 54.000 | 95.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölksyra | 3 | 49.333 | 23.965 | 35.000 | 77.000 |
| Ättiksyra | 3 | 20.000 | 3.464 | 18.000 | 24.000 |
| Socker | 3 | 44.667 | 37.233 | 17.000 | 87.000 |
| AATp20 | 3 | 69.358 | 4.075 | 65.485 | 73.608 |
| PBVp20 | 3 | 15.296 | 27.062 | -15.005 | 37.058 |
| NELp20 | 3 | 5.534 | 0.481 | 5.054 | 6.016 |
| Ca | 3 | 6.733 | 0.493 | 6.400 | 7.300 |
| P | 3 | 2.633 | 0.404 | 2.200 | 3.000 |
| Mg | 3 | 2.467 | 0.306 | 2.200 | 2.800 |
| K | 3 | 15.533 | 1.762 | 13.900 | 17.400 |
| Na | 3 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.700 |
| Cl | 3 | 5.033 | 1.387 | 3.500 | 6.200 |
| S | 3 | 1.567 | 0.306 | 1.300 | 1.900 |
| CAB | 3 | 188.006 | 52.990 | 128.341 | 229.585 |
| Fe | 3 | 133.667 | 48.809 | 82.000 | 179.000 |
| Mn | 3 | 83.667 | 25.541 | 55.000 | 104.000 |
| Zn | 3 | 29.667 | 6.028 | 24.000 | 36.000 |
| Cu | 3 | 5.933 | 1.457 | 4.900 | 7.600 |
| Se | 2 | 0.025 | 0.000 | 0.025 | 0.025 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 6 | 430.333 | 127.550 | 292.000 | 664.000 |
| Aska | 6 | 64.333 | 7.118 | 54.000 | 72.000 |
| OS smbh | 6 | 67.650 | 2.839 | 63.400 | 71.300 |
| Råprot | 6 | 97.000 | 6.782 | 88.000 | 109.000 |
| sRåprot | 6 | 634.500 | 77.482 | 543.000 | 763.000 |
| NH3-N | 6 | 85.000 | 37.699 | 25.000 | 137.000 |
| NDF | 6 | 497.500 | 69.276 | 417.000 | 582.000 |
| iNDF | 6 | 241.854 | 26.960 | 218.879 | 292.000 |
| nhNDF | 6 | 3.222 | 0.235 | 2.960 | 3.585 |
| Stä | 6 | 60.333 | 41.200 | 17.000 | 104.000 |
| TAF | 6 | 62.417 | 21.308 | 24.500 | 85.500 |
| Mjölksyra | 6 | 43.833 | 18.894 | 10.000 | 61.000 |
| Ättiksyra | 6 | 16.000 | 4.940 | 11.000 | 22.000 |
| Socker | 6 | 68.000 | 51.057 | 16.000 | 145.000 |
| PRF | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| BUF | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| AATp20 | 6 | 69.601 | 4.693 | 64.981 | 75.780 |
| PBVp20 | 6 | -15.227 | 8.176 | -25.981 | -8.311 |
| NELp20 | 6 | 5.498 | 0.210 | 5.178 | 5.781 |
| OE* | 1 | 10.080 | . | 10.080 | 10.080 |
| Ca | 5 | 3.480 | 0.988 | 2.700 | 5.200 |
| P | 5 | 2.020 | 0.259 | 1.700 | 2.300 |
| Mg | 5 | 1.500 | 0.453 | 1.200 | 2.300 |
| K | 5 | 17.720 | 2.965 | 14.100 | 22.100 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 5 | 0.460 | 0.230 | 0.200 | 0.700 |
| Cl | 6 | 6.000 | 1.845 | 3.200 | 8.900 |
| S | 5 | 1.420 | 0.164 | 1.300 | 1.700 |
| CAB | 5 | 215.996 | 31.223 | 173.755 | 252.891 |
| Fe | 5 | 152.400 | 82.712 | 92.000 | 294.000 |
| Mn | 5 | 84.000 | 49.573 | 51.000 | 170.000 |
| Zn | 5 | 22.800 | 3.033 | 18.000 | 26.000 |
| Cu | 5 | 5.280 | 0.740 | 4.500 | 6.400 |
| Se | 1 | 0.010 | . | 0.010 | 0.010 |

**Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 16 | 383.125 | 82.700 | 301.000 | 529.000 |
| Aska | 16 | 55.313 | 12.684 | 40.000 | 74.000 |
| OS smbh | 16 | 71.694 | 1.958 | 69.300 | 74.400 |
| Råprot | 16 | 106.563 | 26.174 | 83.000 | 159.000 |
| sRåprot | 16 | 606.375 | 109.937 | 451.000 | 783.000 |
| NH3-N | 16 | 69.188 | 29.392 | 27.000 | 114.000 |
| NDF | 16 | 389.188 | 55.175 | 323.000 | 453.000 |
| iNDF | 16 | 243.873 | 37.740 | 192.000 | 286.752 |
| nhNDF | 16 | 2.742 | 0.885 | 1.424 | 4.423 |
| Stä | 15 | 183.267 | 109.359 | 30.000 | 338.000 |
| TAF | 16 | 55.938 | 28.203 | 14.000 | 89.000 |
| Mjölksyra | 16 | 42.688 | 24.038 | 0.000 | 72.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ättiksyra | 16 | 12.250 | 5.950 | 4.000 | 20.000 |
| Socker | 16 | 51.563 | 31.407 | 12.000 | 98.000 |
| PRF | 6 | 1.667 | 2.338 | 0.000 | 6.000 |
| BUF | 6 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 5.000 |
| AATp20 | 16 | 76.484 | 5.153 | 70.983 | 83.470 |
| PBVp20 | 16 | -14.148 | 22.296 | -38.592 | 13.228 |
| NELp20 | 16 | 5.963 | 0.254 | 5.686 | 6.249 |
| OE* | 8 | 10.530 | 0.434 | 9.900 | 11.000 |
| AAT* | 2 | 63.500 | 0.707 | 63.000 | 64.000 |
| PBV* | 2 | -26.500 | 14.849 | -37.000 | -16.000 |
| Ca | 16 | 4.850 | 1.271 | 2.900 | 6.500 |
| P | 16 | 2.406 | 0.449 | 2.000 | 3.000 |
| Mg | 16 | 1.719 | 0.490 | 1.200 | 2.600 |
| K | 16 | 14.325 | 5.133 | 6.300 | 21.300 |
| Na | 16 | 0.713 | 0.937 | 0.100 | 1.400 |
| Cl | 15 | 5.693 | 2.921 | 2.600 | 8.200 |
| S | 16 | 1.450 | 0.568 | 1.000 | 2.300 |
| CAB | 16 | 150.084 | 130.783 | 18.586 | 290.151 |
| Fe | 15 | 97.200 | 48.318 | 46.000 | 195.000 |
| Mn | 15 | 35.467 | 27.058 | 15.000 | 62.000 |
| Zn | 15 | 24.333 | 5.948 | 17.000 | 29.000 |
| Cu | 15 | 5.707 | 1.300 | 4.000 | 7.100 |
| Se | 2 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.012 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 10 | 339.000 | 32.0659 | 307.500 | 386.000 |
| Aska | 10 | 28.000 | 2.7889 | 25.000 | 32.000 |
| OS smbh | 10 | 75.920 | 1.6930 | 73.100 | 77.450 |
| Råprot | 10 | 76.400 | 5.7388 | 68.500 | 83.000 |
| sRåprot | 10 | 543.800 | 86.5599 | 416.500 | 644.000 |
| NH3-N | 10 | 42.200 | 20.3623 | 15.000 | 65.000 |
| NDF | 10 | 361.200 | 30.1434 | 331.500 | 413.500 |
| iNDF | 10 | 204.600 | 19.2250 | 182.000 | 233.500 |
| nhNDF | 10 | 3.125 | 0.2939 | 2.719 | 3.512 |
| Stä | 10 | 329.000 | 36.1694 | 278.500 | 379.500 |
| TAF | 10 | 73.900 | 12.6618 | 58.500 | 92.500 |
| Mjölksyra | 10 | 56.300 | 10.3500 | 45.000 | 72.000 |
| Ättiksyra | 10 | 12.800 | 3.5214 | 9.000 | 18.000 |
| Socker | 10 | 5.800 | 1.0328 | 5.000 | 7.000 |
| PRF | 10 | 4.800 | 1.8135 | 3.000 | 7.500 |
| BUF | 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 10 | 81.846 | 3.4021 | 76.875 | 86.522 |
| PBVp20 | 10 | -52.356 | 5.9128 | -62.135 | -47.638 |
| NELp20 | 10 | 6.665 | 0.1717 | 6.393 | 6.843 |
| OE* | 10 | 11.610 | 0.3134 | 11.095 | 11.885 |
| Ca | 10 | 1.870 | 0.2627 | 1.500 | 2.200 |
| P | 10 | 1.850 | 0.1269 | 1.650 | 2.000 |
| Mg | 10 | 1.060 | 0.2171 | 0.800 | 1.400 |
| K | 10 | 8.690 | 1.1902 | 7.400 | 10.350 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 10 | 0.270 | 0.1636 | 0.100 | 0.500 |
| Cl | 4 | 2.850 | 0.5447 | 2.400 | 3.500 |
| S | 10 | 0.910 | 0.2331 | 0.600 | 1.100 |
| CAB | 10 | 119.650 | 30.9586 | 73.790 | 156.244 |
| Fe | 4 | 127.750 | 60.6651 | 70.000 | 200.000 |
| Mn | 4 | 26.750 | 6.8007 | 20.000 | 34.000 |
| Zn | 4 | 21.500 | 5.1962 | 16.000 | 28.000 |
| Cu | 4 | 6.750 | 4.2720 | 4.000 | 13.000 |
| Se | 1 | 0.050 | . | 0.050 | 0.050 |

**Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 333.000 | . | 333.000 | 333.000 |
| Aska | 1 | 85.000 | . | 85.000 | 85.000 |
| OS smbh | 1 | 76.800 | . | 76.800 | 76.800 |
| Råprot | 1 | 77.000 | . | 77.000 | 77.000 |
| sRåprot | 1 | 829.000 | . | 829.000 | 829.000 |
| NH3-N | 1 | 107.000 | . | 107.000 | 107.000 |
| NDF | 1 | 440.000 | . | 440.000 | 440.000 |
| iNDF | 1 | 141.830 | . | 141.830 | 141.830 |
| nhNDF | 1 | 4.708 | . | 4.708 | 4.708 |
| Stä | 1 | 17.000 | . | 17.000 | 17.000 |
| TAF | 1 | 64.000 | . | 64.000 | 64.000 |
| Mjölksyra | 1 | 40.000 | . | 40.000 | 40.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ättiksyra | 1 | 24.000 | . | 24.000 | 24.000 |
| Socker | 1 | 149.000 | . | 149.000 | 149.000 |
| AATp20 | 1 | 73.008 | . | 73.008 | 73.008 |
| PBVp20 | 1 | -37.271 | . | -37.271 | -37.271 |
| NELp20 | 1 | 5.925 | . | 5.925 | 5.925 |
| Cl | 1 | 3.900 | . | 3.900 | 3.900 |

**Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 879.000 | . | 879.000 | 879.000 |
| Aska | 1 | 54.000 | . | 54.000 | 54.000 |
| OS smbh | 1 | 64.100 | . | 64.100 | 64.100 |
| Råprot | 1 | 113.000 | . | 113.000 | 113.000 |
| NDF | 1 | 591.000 | . | 591.000 | 591.000 |
| iNDF | 1 | 234.271 | . | 234.271 | 234.271 |
| nhNDF | 1 | 3.298 | . | 3.298 | 3.298 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 1 | 104.000 | . | 104.000 | 104.000 |
| AATp20 | 1 | 85.187 | . | 85.187 | 85.187 |
| PBVp20 | 1 | -16.082 | . | -16.082 | -16.082 |
| NELp20 | 1 | 5.071 | . | 5.071 | 5.071 |
| OE* | 1 | 9.300 | . | 9.300 | 9.300 |
| AAT* | 1 | 67.000 | . | 67.000 | 67.000 |
| PBV* | 1 | -2.000 | . | -2.000 | -2.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ca | 1 | 4.700 | . | 4.700 | 4.700 |
| P | 1 | 2.400 | . | 2.400 | 2.400 |
| Mg | 1 | 1.700 | . | 1.700 | 1.700 |
| K | 1 | 8.300 | . | 8.300 | 8.300 |
| Na | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| S | 1 | 1.900 | . | 1.900 | 1.900 |
| CAB | 1 | 39.638 | . | 39.638 | 39.638 |
| Fe | 1 | 63.000 | . | 63.000 | 63.000 |
| Mn | 1 | 62.000 | . | 62.000 | 62.000 |
| Zn | 1 | 23.000 | . | 23.000 | 23.000 |
| Cu | 1 | 5.900 | . | 5.900 | 5.900 |

**Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 7 | 802.571 | 47.356 | 747.000 | 873.000 |
| Aska | 7 | 55.571 | 6.949 | 50.000 | 69.000 |
| OS smbh | 7 | 65.857 | 1.927 | 62.400 | 67.600 |
| Råprot | 7 | 89.714 | 23.726 | 53.000 | 123.000 |
| sRåprot | 1 | 414.000 | . | 414.000 | 414.000 |
| NDF | 7 | 582.143 | 24.909 | 535.000 | 618.000 |
| iNDF | 7 | 222.345 | 17.642 | 199.424 | 256.224 |
| nhNDF | 7 | 3.556 | 0.334 | 2.934 | 3.927 |
| TAF | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 7 | 107.000 | 19.925 | 74.000 | 133.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AATp20 | 7 | 85.567 | 3.739 | 79.417 | 90.007 |
| PBVp20 | 7 | -38.654 | 17.020 | -62.871 | -13.536 |
| NELp20 | 7 | 5.137 | 0.166 | 4.887 | 5.322 |
| OE* | 7 | 9.576 | 0.265 | 9.100 | 9.800 |
| AAT* | 6 | 68.333 | 1.506 | 66.000 | 70.000 |
| PBV* | 6 | -28.333 | 25.618 | -60.000 | 10.000 |
| Ca | 5 | 3.820 | 1.849 | 2.100 | 6.100 |
| P | 5 | 1.780 | 0.526 | 1.200 | 2.600 |
| Mg | 5 | 1.560 | 0.594 | 1.000 | 2.200 |
| K | 5 | 13.980 | 3.370 | 9.600 | 18.700 |
| Na | 5 | 0.600 | 0.316 | 0.100 | 0.900 |
| Cl | 1 | 5.900 | . | 5.900 | 5.900 |
| S | 5 | 1.560 | 0.783 | 1.000 | 2.900 |
| CAB | 5 | 141.906 | 111.474 | -37.685 | 265.053 |
| Fe | 4 | 139.250 | 104.203 | 52.000 | 290.000 |
| Mn | 4 | 119.750 | 60.096 | 75.000 | 208.000 |
| Zn | 4 | 26.250 | 10.996 | 17.000 | 42.000 |
| Cu | 4 | 6.025 | 2.473 | 3.900 | 9.600 |
| Se | 1 | 0.025 | . | 0.025 | 0.025 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 2 | 431.000 | 161.220 | 317.000 | 545.000 |
| Aska | 2 | 90.000 | 4.243 | 87.000 | 93.000 |
| OS smbh | 2 | 72.700 | 5.940 | 68.500 | 76.900 |
| Råprot | 2 | 181.000 | 98.995 | 111.000 | 251.000 |
| sRåprot | 1 | 506.000 | . | 506.000 | 506.000 |
| NDF | 2 | 387.500 | 19.092 | 374.000 | 401.000 |
| iNDF | 2 | 349.625 | 101.293 | 278.000 | 421.249 |
| nhNDF | 2 | 6.852 | 2.189 | 5.304 | 8.400 |
| TAF | 2 | 70.000 | 0.000 | 70.000 | 70.000 |
| Socker | 2 | 90.000 | 45.255 | 58.000 | 122.000 |
| AATp20 | 2 | 80.394 | 11.127 | 72.526 | 88.263 |
| PBVp20 | 2 | 59.629 | 77.261 | 4.997 | 114.261 |
| NELp20 | 2 | 5.936 | 0.905 | 5.297 | 6.576 |
| OE* | 2 | 10.345 | 0.912 | 9.700 | 10.990 |
| AAT* | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |
| PBV* | 1 | -8.000 | . | -8.000 | -8.000 |
| Ca | 2 | 11.300 | 1.131 | 10.500 | 12.100 |
| P | 2 | 3.100 | 1.556 | 2.000 | 4.200 |
| Mg | 2 | 3.900 | 1.838 | 2.600 | 5.200 |
| K | 2 | 22.300 | 8.061 | 16.600 | 28.000 |
| Na | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| Cl | 1 | 8.800 | . | 8.800 | 8.800 |
| S | 2 | 2.250 | 1.202 | 1.400 | 3.100 |
| CAB | 2 | 279.493 | 17.499 | 267.120 | 291.867 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe | 1 | 66.000 | . | 66.000 | 66.000 |
| Mn | 1 | 96.000 | . | 96.000 | 96.000 |
| Zn | 1 | 32.000 | . | 32.000 | 32.000 |
| Cu | 1 | 8.700 | . | 8.700 | 8.700 |

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 247.000 | . | 247.000 | 247.000 |
| Aska | 1 | 79.000 | . | 79.000 | 79.000 |
| OS smbh | 1 | 72.400 | . | 72.400 | 72.400 |
| Råprot | 1 | 143.000 | . | 143.000 | 143.000 |
| sRåprot | 1 | 639.000 | . | 639.000 | 639.000 |
| NH3-N | 1 | 90.000 | . | 90.000 | 90.000 |
| NDF | 1 | 474.000 | . | 474.000 | 474.000 |
| iNDF | 1 | 208.000 | . | 208.000 | 208.000 |
| nhNDF | 1 | 4.373 | . | 4.373 | 4.373 |
| TAF | 1 | 120.000 | . | 120.000 | 120.000 |
| Mjölksyra | 1 | 93.000 | . | 93.000 | 93.000 |
| Ättiksyra | 1 | 26.000 | . | 26.000 | 26.000 |
| Socker | 1 | 12.000 | . | 12.000 | 12.000 |
| PRF | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| BUF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 1 | 72.922 | . | 72.922 | 72.922 |
| PBVp20 | 1 | 34.803 | . | 34.803 | 34.803 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| NELp20 | 1 | 6.184 | . | 6.184 | 6.184 |
| OE* | 1 | 10.420 | . | 10.420 | 10.420 |
| Ca | 1 | 9.500 | . | 9.500 | 9.500 |
| P | 1 | 3.000 | . | 3.000 | 3.000 |
| Mg | 1 | 2.100 | . | 2.100 | 2.100 |
| K | 1 | 27.400 | . | 27.400 | 27.400 |
| Na | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| Cl | 1 | 3.700 | . | 3.700 | 3.700 |
| S | 1 | 1.900 | . | 1.900 | 1.900 |
| CAB | 1 | 521.270 | . | 521.270 | 521.270 |

**Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 6 | 439.500 | 54.379 | 380.000 | 512.000 |
| Aska | 6 | 60.833 | 3.764 | 55.000 | 65.000 |
| OS smbh | 6 | 74.500 | 3.556 | 68.800 | 78.200 |
| Råprot | 6 | 150.333 | 6.802 | 143.000 | 161.000 |
| sRåprot | 6 | 492.333 | 36.724 | 445.000 | 542.000 |
| NH3-N | 6 | 49.000 | 13.491 | 27.000 | 65.000 |
| NDF | 6 | 341.000 | 53.077 | 289.000 | 416.000 |
| iNDF | 6 | 230.833 | 58.677 | 174.000 | 333.000 |
| nhNDF | 6 | 2.870 | 0.401 | 2.370 | 3.305 |
| Stä | 6 | 198.000 | 20.813 | 173.000 | 225.000 |
| TAF | 6 | 44.667 | 22.554 | 24.000 | 78.000 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölksyra | 6 | 31.000 | 15.033 | 17.000 | 50.000 |
| Ättiksyra | 6 | 10.000 | 8.099 | 2.000 | 23.000 |
| Socker | 6 | 40.333 | 22.932 | 18.000 | 80.000 |
| PRF | 6 | 3.667 | 2.338 | 1.000 | 6.000 |
| BUF | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 6 | 88.365 | 2.402 | 84.910 | 90.709 |
| PBVp20 | 6 | 17.652 | 5.739 | 9.184 | 23.879 |
| NELp20 | 6 | 6.373 | 0.367 | 5.775 | 6.825 |
| OE* | 6 | 10.978 | 0.596 | 10.010 | 11.560 |
| Ca | 6 | 6.183 | 1.623 | 5.000 | 9.200 |
| P | 6 | 3.867 | 0.532 | 3.400 | 4.900 |
| Mg | 6 | 2.850 | 0.841 | 2.000 | 4.300 |
| K | 6 | 16.083 | 2.304 | 12.800 | 19.000 |
| Na | 6 | 2.783 | 1.225 | 2.000 | 5.200 |
| Cl | 6 | 11.050 | 8.981 | 4.400 | 26.000 |
| S | 6 | 2.250 | 0.176 | 2.000 | 2.400 |
| CAB | 6 | 80.460 | 242.034 | -259.888 | 274.402 |
| Fe | 2 | 251.000 | 15.556 | 240.000 | 262.000 |
| Mn | 2 | 65.000 | 14.142 | 55.000 | 75.000 |
| Zn | 2 | 31.500 | 2.121 | 30.000 | 33.000 |
| Cu | 2 | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 12.000 |
| Se | 2 | 0.110 | 0.000 | 0.110 | 0.110 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1 | 435.000 | . | 435.000 | 435.000 |
| Aska | 1 | 79.000 | . | 79.000 | 79.000 |
| OS smbh | 1 | 68.000 | . | 68.000 | 68.000 |
| Råprot | 1 | 128.000 | . | 128.000 | 128.000 |
| sRåprot | 1 | 477.000 | . | 477.000 | 477.000 |
| NH3-N | 1 | 72.000 | . | 72.000 | 72.000 |
| NDF | 1 | 458.000 | . | 458.000 | 458.000 |
| iNDF | 1 | 245.937 | . | 245.937 | 245.937 |
| nhNDF | 1 | 2.958 | . | 2.958 | 2.958 |
| Stä | 1 | 74.000 | . | 74.000 | 74.000 |
| Socker | 1 | 34.000 | . | 34.000 | 34.000 |
| NELp20 | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Ca | 1 | 5.500 | . | 5.500 | 5.500 |
| P | 1 | 3.000 | . | 3.000 | 3.000 |
| Mg | 1 | 4.300 | . | 4.300 | 4.300 |
| K | 1 | 16.100 | . | 16.100 | 16.100 |
| Na | 1 | 2.100 | . | 2.100 | 2.100 |
| Cl | 1 | 5.300 | . | 5.300 | 5.300 |
| S | 1 | 2.600 | . | 2.600 | 2.600 |
| CAB | 1 | 191.273 | . | 191.273 | 191.273 |
| Fe | 1 | 463.000 | . | 463.000 | 463.000 |
| Mn | 1 | 199.000 | . | 199.000 | 199.000 |
| Zn | 1 | 137.000 | . | 137.000 | 137.000 |
| Cu | 1 | 25.600 | . | 25.600 | 25.600 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

**Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1**

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 2 | 852.000 | 4.2426 | 849.000 | 855.000 |
| Aska | 2 | 21.000 | 2.8284 | 19.000 | 23.000 |
| OS smbh | 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Råprot | 2 | 122.000 | 12.7279 | 113.000 | 131.000 |
| NH3-N | 2 | 6.000 | 0.0000 | 6.000 | 6.000 |
| NDF | 1 | 151.000 | . | 151.000 | 151.000 |
| Stä | 2 | 580.500 | 47.3762 | 547.000 | 614.000 |
| TAF | 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| NELp20 | 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Ca | 2 | 0.500 | 0.0000 | 0.500 | 0.500 |
| P | 2 | 3.350 | 0.2121 | 3.200 | 3.500 |
| Mg | 2 | 1.250 | 0.0707 | 1.200 | 1.300 |
| K | 2 | 5.550 | 0.2121 | 5.400 | 5.700 |
| Na | 2 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 2 | 1.450 | 0.2121 | 1.300 | 1.600 |
| Fe | 2 | 58.000 | 0.0000 | 58.000 | 58.000 |
| Mn | 2 | 35.500 | 6.3640 | 31.000 | 40.000 |
| Zn | 2 | 31.500 | 6.3640 | 27.000 | 36.000 |
| Cu | 2 | 4.800 | 0.1414 | 4.700 | 4.900 |
| Se | 1 | 0.005 | . | 0.005 | 0.005 |

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**