

Smittsamma/hygienrelaterade klövskador

1. Ta upp kon i verkstol

2. Gör rent klöv och klövspalt med vatten

3. Verka rent sulorna med något av följande:
- Vinkelslip med raspkiva
- Klövkniv
- Klubba och klinga

4. Åtgärder

Lindrigt eksem



Klövröta



Åtgärd:

- Om man har flertal kor med lindrigt eksem och/eller klövröta: bör man se över hygien i stallet samt eventuellt börja med fotbad
- Endast lindrig klövröta och/eller lindrigt eksem brukar inte ge upphov till hälta

Digital dermatit




Klövspaltsinflammation




Åtgärd:

- Lägg klövbandage med 2-3 msk salicylsyra och låt det sitta i 3-5 dagar
- Vid behov kan behandlingen upprepas
- Isolera kor med klövspaltsinflammation under behandlingen
- Vid klövspaltsinflammation bör veterinär kontaktas om inte hälta och feber blir påtagligt bättre det närmaste dygnet
- Klövbadd fungerar förebyggande

Limax



Vårtor



Åtgärd:

- Lägg bandage med rikligt med salicylsyra runt limax eller vårta
- Ta av bandaget efter 7-10 dagar och försök att peta bort limax eller vårta
- Om den inte lossnar lägger man ett nytt bandage med salicylsyra i ytterligare 7-10 dagar
- Dessa skador kan sägas vara kroniska förändringar pga allvarliga eksem (DD) och dålig miljö