

### Besättningskort och Behandlingsbevis

- Ringormsvaccination
- Avhorning

Djurägare

Namn.....Adress.....

Telefon..... SEnummer.....

Ansvarig veterinär.....

Kalv		Vaccination 1		Vaccination 2		Avhorning Se text nedan		
Öron nr	Föd dat	Datum	Signatur /tjm nr	Datum	Signatur/ tjm nr	Datum	Smärtlindring mängd	Utförare

**Ringormsvaccin** (Trichoben vet/Bovilis ringvac. – ange vilket som används i listan ovan: T för Trichoben och B för Bovilis ringvac) injiceras i halsmuskulaturen på höger respektive vänster sida (första dosen höger, andra dosen vänster sida. Dosen är 2 ml vid varje tillfälle. Preparatet har ingen karenstid vid slakt.

Ange använda batchnummer och datum här:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Vid **avhorning** injiceras 2-2,5 ml av lokalbedövningsmedel: Pronestestic vet., under crista frontalis (benkammen) mittemellan öga och hornanlag. Karenstid slakt 0 dygn.

För **smärtlindring** vid avhorning injiceras Metacam inj. 20mg/ml subkutant. Dosering: 0,5 ml per 20 kg kroppsvikt. Karenstid slakt 15 dygn.

Observera att för ekologiska besättningar gäller särskilda regler om karens.

Om sidan 2 används på denna blankett måste blanketten vara utskriven dubbelsidigt (sidan 2 får ej användas som lösblad!).

**Original ska lämnas på gården och kopia sparas på driftplatsen i 5 år.**

