

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | TS | Aska | VOS | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF | Mjölksyra | Ättiksyra | Socker |
|---|---------|------|-----|------|-----|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|--------|-----------|-----------|--------|
| Korn, kärna (001) | 1 | 9 | 857 | 25 | | 86.0 | 133 | | 12.5 | 397 | 162 | 3.15 | 554 | 0.000 | | | 35 |
| Vete, kärna (005) | 1 | 7 | 864 | 20 | | 88.0 | 125 | | | 473 | 187 | 3.50 | 673 | 0.000 | | | 35 |
| Rågvete (015) | 1 | 2 | 877 | 20 | | 89.5 | 125 | | 12.0 | | 187 | 3.50 | 642 | 0.000 | | | 40 |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 2 | 857 | 22 | | 87.0 | 125 | | | | 173 | 3.30 | 613 | 0.000 | | | |
| Ärter, kärna (006) | 1 | 1 | 870 | 23 | | 87.7 | 134 | 330 | | 163 | 123 | 7.90 | 594 | 0.000 | | | 35 |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 36 | 379 | 40 | | 76.4 | 83 | 377 | 69.5 | 392 | 182 | 3.78 | 257 | 55.833 | 53.0 | 17.0 | 76 |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) | 0 | 10 | 168 | 106 | | 79.1 | 199 | | | 424 | 109 | 5.35 | | 0.000 | | | 108 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 0 | 7 | 416 | 86 | | 72.7 | 177 | 471 | | 492 | 174 | 4.24 | | 61.000 | | | 76 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 2 | 1 | 447 | 111 | | 65.5 | 113 | | | 534 | 228 | 3.49 | | 61.000 | | | 69 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 3 | 1 | 266 | 87 | | 82.2 | 209 | | | 396 | 80 | 6.01 | | 61.000 | | | 136 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 0 | 7 | 393 | 73 | | 68.9 | 131 | 553 | 85.0 | 484 | 224 | 3.39 | | 53.943 | 40.6 | 9.3 | 67 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 3 | 430 | 87 | | 75.9 | 128 | 736 | 96.0 | 440 | 156 | 4.36 | | 42.800 | 34.7 | 5.3 | 106 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 3 | 1 | 314 | 95 | | 71.0 | 188 | 576 | 108 | 356 | 262 | 2.51 | | 67.500 | 53.0 | 12.0 | 23 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 56 | 466 | 84 | | 74.6 | 166 | 386 | | 473 | 158 | 4.65 | | 84.000 | | | 105 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 39 | 444 | 78 | | 75.3 | 157 | | | 506 | 140 | 5.08 | | 84.000 | | | 100 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 5 | 604 | 76 | | 71.4 | 152 | | | 466 | 201 | 3.70 | | 84.000 | | | 100 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 9 | 402 | 89 | | 74.1 | 178 | | | 435 | 175 | 4.15 | | 84.000 | | | 86 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 5 | 289 | 99 | | 74.8 | 172 | | | 445 | 160 | 4.37 | | 84.000 | | | 54 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 5 | 1 | 196 | 140 | | 70.9 | 174 | | | 469 | 185 | 4.07 | | 84.000 | | | 60 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 164 | 417 | 79 | | 74.1 | 155 | 625 | 86.4 | 469 | 167 | 4.34 | | 68.398 | 51.2 | 13.1 | 55 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 233 | 399 | 70 | | 74.1 | 145 | 651 | 87.7 | 496 | 160 | 4.56 | | 72.908 | 56.9 | 13.3 | 52 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 37 | 435 | 70 | | 73.4 | 139 | 607 | 83.6 | 456 | 184 | 3.94 | | 57.208 | 42.7 | 11.9 | 79 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 65 | 365 | 88 | | 73.0 | 173 | 590 | 93.5 | 413 | 201 | 3.54 | | 77.271 | 58.1 | 17.0 | 41 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 10 | 301 | 97 | | 74.3 | 166 | 593 | 105 | 425 | 174 | 4.05 | | 82.990 | 60.4 | 19.4 | 28 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | * | 1 | 385 | 68 | | 75.9 | 157 | 713 | 95.0 | 509 | 138 | 5.09 | | 60.000 | 47.0 | 10.0 | 97 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | TS | Aska | VOS | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF | Mjölksyra | Ättiksyra | Socker |
|--|---------|------|-----|------|-----|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|---------|-----------|-----------|--------|
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | * | 1 | 388 | 63 | | 73.0 | 131 | 702 | 98.0 | 472 | 185 | 3.95 | | 85.000 | 67.0 | 15.0 | 62 |
| Helsäd & baljv, flera <49% baljv (177) | 1 | 1 | 407 | 67 | | 69.0 | 136 | | | 452 | 241 | 2.99 | 16 | 75.000 | | | 96 |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 29 | 463 | 53 | | 71.7 | 109 | 676 | 87.8 | 422 | 229 | 3.12 | 116 | 40.600 | 31.3 | 6.6 | 107 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 5 | 540 | 73 | | 68.3 | 116 | 533 | 61.0 | 454 | 282 | 3.90 | 44 | 52.700 | 42.6 | 8.2 | 94 |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | 507 | 62 | | 68.1 | 134 | | | 382 | 309 | 2.12 | 181 | 71.900 | | | 24 |
| Raps, hela plantan ensilerad (260) | 1 | 1 | 472 | 62 | | 78.3 | 75 | | | 615 | 94 | 6.93 | 19 | 95.000 | | | 14 |
| Åkerböna, helsädesensilage (288) | 1 | 1 | 260 | 86 | | 70.3 | 168 | | | 358 | 419 | 4.47 | 32 | 121.500 | | | |
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 2 | 347 | 69 | | 67.9 | 127 | 697 | 97.0 | 466 | 247 | 3.00 | 29 | 32.500 | 22.5 | 9.0 | 71 |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (| 1 | 3 | 464 | 71 | | 68.6 | 117 | 481 | 68.0 | 436 | 317 | 3.73 | 119 | 34.613 | 17.0 | 2.3 | 53 |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 16 | 512 | 52 | | 68.2 | 106 | 553 | 75.4 | 445 | 262 | 2.75 | 188 | 29.306 | 22.0 | 5.6 | 63 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1 | 4 | 410 | 76 | | 69.6 | 136 | 628 | 101 | 418 | 251 | 2.87 | 98 | 45.800 | 35.8 | 8.0 | 36 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 153 | 373 | 38 | | 77.5 | 78 | 544 | 78.2 | 368 | 180 | 3.76 | 258 | 62.307 | 51.5 | 13.1 | 31 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 4 | 797 | 47 | | 63.9 | 95 | 437 | | 592 | 235 | 3.26 | | 0.000 | | | 96 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 3 | 851 | 55 | | 68.4 | 125 | | | 578 | 197 | 3.97 | | 0.000 | | | 119 |
| Halm, sträsäd, ej behandlad (385) | 0 | 1 | 885 | 58 | | 47.0 | 70 | | | 720 | 324 | | 16 | | | | 10 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 0 | 5 | 465 | 96 | | 72.7 | 188 | 404 | | 456 | 232 | 4.54 | | 72.000 | | | 80 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 3 | 2 | 495 | 90 | | 73.0 | 228 | | | 405 | 289 | 5.47 | | 72.000 | | | 71 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 1 | 431 | 62 | | 71.4 | 148 | 593 | 67.0 | 403 | 374 | 5.82 | | 64.100 | 35.5 | 26.6 | 102 |
| Övrigt foder ej kompletta data (1E3) | 1 | 1 | 462 | 78 | | 18.9 | 69 | 324 | 55.0 | 587 | 301 | 2.45 | 97 | | 35.0 | 12.0 | 27 |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 5 | 478 | 66 | | 73.3 | 140 | 415 | 43.5 | 367 | 228 | 2.91 | 177 | | 42.0 | 6.0 | 35 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE* | AAT* | PBV* |
|---|---------|------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Korn, kärna (001) | 1 | 9 | | | | 94.3 | -13 | 7.02 | 13.3 | 93.6 | -19 |
| Vete, kärna (005) | 1 | 7 | | | | 113 | -39 | 7.65 | 14.1 | 93.4 | -28 |
| Rågvete (015) | 1 | 2 | | | | 110 | -36 | 7.61 | 13.9 | 94.5 | -30 |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 2 | | | | 106 | -31 | 7.57 | 12.4 | 82.0 | -10 |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) | 1 | 0 | | | | 102 | -27 | 7.15 | | | |
| Ärter, kärna (006) | 1 | 1 | | | | 108 | -18 | 7.19 | 13.9 | 96.0 | -25 |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 36 | | | | 89.3 | -59 | 6.28 | 11.3 | 80.6 | -60 |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) | 0 | 10 | | | | 107 | 29.0 | 6.44 | 11.2 | | |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 0 | 7 | | | | 87.3 | 37.4 | 5.93 | 10.4 | 70.1 | 58.6 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 2 | 1 | | | | 74.2 | -0.8 | 5.09 | 9.0 | 65.0 | 1.0 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 3 | 1 | | | | 97.2 | 49.9 | 6.85 | 11.9 | 80.0 | 71.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 0 | 7 | | 3.90000 | | 76.4 | 12.5 | 5.31 | 9.9 | 68.3 | 17.1 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 3 | | 1.40000 | | 81.7 | 1.0 | 5.92 | 10.9 | 71.7 | 5.7 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 3 | 1 | | 1.50000 | | 73.6 | 70.0 | 5.12 | 10.0 | 69.0 | 69.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 56 | | | | 89.6 | 25.6 | 6.18 | 10.7 | 70.8 | 46.9 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 39 | | | | 87.3 | 21.2 | 6.30 | 10.9 | 75.5 | 27.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 5 | | | | 82.1 | 25.5 | 5.82 | 10.3 | 72.4 | 27.8 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 9 | | | | 84.7 | 45.7 | 6.07 | 10.6 | 73.7 | 51.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 5 | | | | 83.3 | 41.5 | 6.00 | 10.6 | 73.6 | 44.4 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 5 | 1 | | | | 78.6 | 51.0 | 5.68 | 9.5 | 68.0 | 56.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 164 | 1.13333 | 2.94221 | | 81.9 | 28.0 | 5.96 | 10.6 | 70.4 | 41.5 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 233 | | 1.35172 | | 81.6 | 19.4 | 6.02 | 10.8 | 71.0 | 22.9 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 37 | | 1.31905 | | 82.4 | 12.2 | 5.82 | 10.7 | 70.8 | 17.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 65 | | 1.05902 | | 79.0 | 49.9 | 5.71 | 10.4 | 69.6 | 52.3 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 10 | | 2.19000 | | 78.3 | 44.5 | 5.78 | 10.5 | 70.0 | 44.9 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE* | AAT* | PBV* |
|--|---------|------|-----|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | * | 1 | | | | 86.0 | 23.2 | 6.38 | 11.1 | 72.0 | 33.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | * | 1 | | | | 78.3 | 11.5 | 5.89 | 10.7 | 71.0 | 9.0 |
| Helsäd & baljv, flera <49% baljv (177) | 1 | 1 | | | | 73.4 | 15.4 | 5.53 | | | |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 29 | | 0.73333 | | 76.7 | -16 | 5.69 | 10.2 | 62.3 | -13 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 5 | | 1.50000 | | 75.6 | -4.5 | 5.33 | 9.8 | 60.8 | -2.2 |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | | | | 74.0 | 14.6 | 5.49 | 10.2 | 62.3 | 11.3 |
| Raps, hela plantan ensilerad (260) | 1 | 1 | | | | 84.4 | -54 | 6.57 | 10.7 | 81.0 | -62 |
| Åkerböna, helsädesensilage (288) | 1 | 1 | | | | 67.7 | 62.7 | 5.25 | 9.5 | 56.0 | 54.0 |
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 2 | | 2.00000 | | 74.3 | 5.5 | 5.25 | 9.7 | 58.5 | 11.5 |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (| 1 | 3 | | | | 73.9 | -0.6 | 5.28 | 10.3 | 64.3 | -6.0 |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 16 | | 0.86250 | | 77.2 | -21 | 5.53 | 10.3 | 64.5 | -15 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1 | 4 | | 4.10000 | | 73.2 | 17.8 | 5.36 | 10.3 | 60.5 | 20.3 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 153 | | 2.14318 | | 83.0 | -53 | 6.26 | 11.3 | 80.0 | -61 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 4 | | | | 85.9 | -34 | 4.98 | 9.3 | 66.8 | -18 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 3 | | | | 92.9 | -18 | 5.53 | 10.0 | 71.0 | 3.0 |
| Halm, sträsäd, ej behandlad (385) | 0 | 1 | | | | | | 0.00 | 6.6 | 60.0 | -34 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 0 | 5 | | | | 84.1 | 60.4 | 6.04 | 10.3 | 72.6 | 62.4 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 3 | 2 | | | | 85.1 | 96.9 | 6.07 | 10.4 | 72.0 | 101 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 1 | | | | 79.5 | 30.0 | 5.75 | 10.4 | 70.0 | 30.0 |
| Övrigt foder ej kompletta data (1E3) | 1 | 1 | | 1.50000 | | | | 0.00 | | | |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 5 | | 1.75000 | | | | 0.00 | | | |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. Ca | Ca | P | Mg | K | Na | Cl | S | CAB | Ant. Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|---|---------|---------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|---------|-------|-------|------|-----|-----|
| Korn, kärna (001) | 1 | 2 | 0.6 | 3.5 | 1.3 | 5.9 | 0.2 | | 1.4 | 36 | 2 | 52.0 | 15.0 | 41.5 | 4.1 | |
| Vete, kärna (005) | 1 | 1 | 0.5 | 2.9 | 1.0 | 4.8 | 0.1 | | 1.5 | 8 | 1 | 31.0 | 28.0 | 25.0 | 3.7 | |
| Rågvete (015) | 1 | 2 | 0.5 | 3.4 | 1.2 | 5.8 | 0.1 | | 1.5 | 41 | 2 | 109.5 | 25.5 | 35.0 | 3.4 | 0.0 |
| Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) | 1 | 2 | 0.6 | 3.7 | 1.2 | 5.7 | 0.1 | | 1.6 | 25 | 2 | 47.5 | 19.5 | 33.5 | 3.6 | |
| Ärter, kärna (006) | 1 | 1 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 6.6 | 0.1 | | 1.6 | 17 | 1 | 87.0 | 11.0 | 32.0 | 5.0 | |
| Majs hela plantan, grönmassa (030) | 1 | 21 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 10.8 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 156 | 22 | 161.8 | 26.2 | 31.0 | 4.2 | 0.0 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 0 | 6 | 7.2 | 2.9 | 2.5 | 24.0 | 1.6 | 5.3 | 2.1 | 417 | 6 | 287.2 | 83.0 | 32.7 | 9.0 | 0.0 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 2 | 1 | 13.9 | 4.1 | 2.6 | 15.4 | 2.3 | | 2.1 | 222 | 1 | 488.0 | 57.0 | 23.0 | 5.2 | |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) | 3 | 1 | 7.1 | 2.8 | 1.9 | 30.1 | 5.9 | | 2.9 | 704 | 1 | 213.0 | 20.0 | 27.0 | 7.4 | |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 0 | 5 | 5.4 | 2.2 | 1.9 | 18.5 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 272 | 5 | 187.2 | 56.0 | 30.8 | 4.8 | |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162) | 1 | 3 | 6.7 | 2.7 | 1.6 | 22.5 | 1.1 | 6.4 | 2.3 | 297 | 3 | 132.3 | 21.3 | 24.0 | 4.0 | |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0 | 41 | 8.0 | 2.7 | 2.2 | 23.6 | 1.4 | 8.2 | 2.4 | 311 | 41 | 172.4 | 47.0 | 30.0 | 6.1 | 0.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1 | 33 | 6.5 | 3.1 | 1.8 | 25.8 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 449 | 33 | 109.9 | 44.7 | 31.5 | 5.6 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2 | 5 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 19.1 | 1.4 | | 2.3 | 271 | 5 | 106.6 | 69.4 | 28.8 | 6.1 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3 | 8 | 8.9 | 2.8 | 2.5 | 23.9 | 2.7 | | 3.0 | 409 | 8 | 177.1 | 67.4 | 31.8 | 7.4 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 4 | 5 | 7.5 | 3.4 | 2.5 | 29.0 | 1.3 | | 3.1 | 471 | 5 | 165.2 | 78.2 | 34.0 | 7.4 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 5 | 1 | 6.3 | 3.8 | 2.9 | 22.3 | 2.4 | | 4.5 | 261 | 1 | 659.0 | 163.0 | 30.0 | 6.6 | |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 0 | 144 | 7.3 | 2.8 | 1.9 | 24.4 | 1.5 | 5.9 | 2.4 | 370 | 145 | 204.1 | 45.9 | 31.1 | 6.2 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 1 | 221 | 6.3 | 2.7 | 1.7 | 23.1 | 1.4 | 4.4 | 2.2 | 391 | 221 | 157.8 | 44.9 | 31.3 | 6.0 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 2 | 30 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 17.7 | 2.1 | 7.6 | 2.5 | 167 | 30 | 149.1 | 52.2 | 30.4 | 6.1 | 0.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 3 | 56 | 10.3 | 2.7 | 2.5 | 21.5 | 2.4 | 7.0 | 2.8 | 283 | 56 | 227.0 | 58.5 | 32.5 | 7.8 | 0.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | 4 | 9 | 7.2 | 3.1 | 2.5 | 27.6 | 2.8 | 11.6 | 2.7 | 320 | 9 | 237.4 | 74.7 | 48.4 | 8.2 | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | * | 1 | 4.5 | 3.1 | 1.9 | 21.5 | 3.6 | 8.6 | 2.4 | 314 | 1 | 109.0 | 50.0 | 34.0 | 6.0 | |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) | * | 1 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 20.0 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 238 | 1 | 113.0 | 40.0 | 27.0 | 6.6 | |
| Korn, helsädesensilage (250) | 1 | 21 | 4.4 | 2.3 | 1.3 | 13.8 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 181 | 21 | 157.7 | 33.1 | 35.4 | 4.4 | 0.0 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel | Sk. nr. | Ant. Ca | Ca | P | Mg | K | Na | Cl | S | CAB | Ant. Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|--|---------|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|------|-------|------|-----|
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) | 1 | 4 | 7.9 | 2.6 | 2.0 | 24.0 | 1.0 | 3.6 | 2.0 | 386 | 4 | 151.5 | 58.0 | 39.0 | 6.1 | 0.0 |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) | 1 | 3 | 7.6 | 2.2 | 2.1 | 14.6 | 1.2 | | 1.6 | 278 | 3 | 118.0 | 39.7 | 53.0 | 6.9 | 0.0 |
| Raps, hela plantan ensilerad (260) | 1 | 1 | 13.0 | 1.2 | 1.9 | 12.0 | 0.3 | | 3.6 | | 1 | 42.0 | 18.0 | 16.0 | 2.2 | |
| Havre helsädesensilage degmognad (296) | 1 | 2 | 5.9 | 2.2 | 1.9 | 22.8 | 1.1 | 5.0 | 2.1 | 318 | 2 | 177.0 | 95.0 | 57.0 | 7.2 | |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (| 1 | 3 | 8.0 | 2.7 | 2.0 | 19.3 | 0.5 | 4.9 | 2.0 | 261 | 3 | 125.7 | 64.0 | 44.7 | 5.9 | 0.0 |
| Vete, helsäd ensilage (299) | 1 | 10 | 5.7 | 2.4 | 1.4 | 15.9 | 0.5 | 3.6 | 2.3 | 162 | 10 | 138.6 | 32.1 | 32.5 | 4.7 | 0.0 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1 | 4 | 8.2 | 2.8 | 2.0 | 22.0 | 1.3 | 5.1 | 2.6 | 338 | 4 | 114.3 | 31.3 | 46.3 | 5.4 | 0.0 |
| Majs, helsädesensilage (305) | 1 | 127 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 10.7 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 180 | 127 | 110.8 | 27.8 | 32.1 | 4.1 | 0.0 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 0 | 2 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 15.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 191 | 2 | 68.0 | 35.0 | 19.0 | 4.6 | 0.0 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) | 1 | 2 | 4.6 | 2.7 | 1.5 | 23.0 | 0.2 | | 1.7 | 350 | 2 | 70.0 | 65.5 | 23.0 | 4.3 | |
| Halm, sträsäd, ej behandlad (385) | 0 | 1 | 15.0 | 0.5 | 1.0 | 9.0 | 0.5 | | 1.6 | | 1 | 66.0 | 13.0 | 13.0 | 1.0 | |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 0 | 4 | 7.9 | 3.3 | 1.9 | 31.3 | 1.0 | 4.1 | 2.3 | 560 | 4 | 87.5 | 31.8 | 26.0 | 6.6 | 0.0 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 3 | 2 | 14.3 | 3.8 | 2.5 | 25.7 | 0.9 | 0.8 | 3.0 | 431 | 2 | 97.0 | 44.0 | 32.0 | 12.9 | |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1 | 1 | 13.0 | 2.2 | 1.8 | 19.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 394 | 1 | 66.0 | 35.0 | 24.0 | 3.5 | |
| Övrigt foder ej kompletta data (1E3) | 1 | 1 | 11.7 | 1.4 | 1.4 | 12.0 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 149 | 1 | 572.0 | 34.0 | 20.0 | 3.7 | |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) | 1 | 5 | 6.9 | 3.4 | 3.1 | 14.3 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 188 | 5 | 321.4 | 92.0 | 103.4 | 17.2 | 0.6 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 9 | 857.333 | 12.550 | 834.000 | 876.000 |
| Aska | 9 | 25.222 | 3.548 | 20.000 | 30.400 |
| OS smbh | 13 | 86.000 | 0.000 | 86.000 | 86.000 |
| Råprot | 9 | 133.189 | 15.457 | 114.000 | 161.500 |
| NH3-N | 2 | 12.500 | 0.707 | 12.000 | 13.000 |
| NDF | 2 | 397.000 | 214.960 | 245.000 | 549.000 |
| iNDF | 13 | 162.000 | 0.000 | 162.000 | 162.000 |
| nhNDF | 13 | 3.150 | 0.000 | 3.150 | 3.150 |
| Stä | 9 | 554.278 | 36.673 | 479.000 | 590.700 |
| TAF | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 2 | 34.500 | 12.021 | 26.000 | 43.000 |
| AATp20 | 13 | 94.328 | 5.366 | 91.998 | 97.061 |
| PBVp20 | 13 | -13.262 | 21.513 | -27.420 | 6.959 |
| NELp20 | 13 | 7.020 | 0.445 | 6.911 | 7.235 |
| OE* | 9 | 13.289 | 0.033 | 13.200 | 13.300 |
| AAT* | 9 | 93.556 | 1.014 | 92.000 | 95.000 |
| PBV* | 9 | -19.111 | 14.970 | -38.000 | 8.000 |
| Ca | 2 | 0.550 | 0.212 | 0.400 | 0.700 |
| P | 2 | 3.500 | 0.283 | 3.300 | 3.700 |
| Mg | 2 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | 1.300 |
| K | 2 | 5.900 | 0.141 | 5.800 | 6.000 |
| Na | 2 | 0.150 | 0.071 | 0.100 | 0.200 |
| S | 2 | 1.400 | 0.141 | 1.300 | 1.500 |
| CAB | 2 | 36.114 | 2.148 | 34.596 | 37.633 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe | 2 | 52.000 | 4.243 | 49.000 | 55.000 |
| Mn | 2 | 15.000 | 1.414 | 14.000 | 16.000 |
| Zn | 2 | 41.500 | 4.950 | 38.000 | 45.000 |
| Cu | 2 | 4.100 | 0.141 | 4.000 | 4.200 |

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 7 | 864.000 | 13.5892 | 841.000 | 881.000 |
| Aska | 7 | 19.743 | 2.3035 | 16.000 | 23.300 |
| OS smbh | 8 | 88.000 | 0.0000 | 88.000 | 88.000 |
| Råprot | 7 | 125.386 | 7.6860 | 113.200 | 134.500 |
| NDF | 1 | 473.000 | . | 473.000 | 473.000 |
| iNDF | 8 | 187.000 | 0.0000 | 187.000 | 187.000 |
| nhNDF | 8 | 3.500 | 0.0000 | 3.500 | 3.500 |
| Stä | 7 | 672.800 | 32.0012 | 606.000 | 704.800 |
| TAF | 8 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 1 | 35.000 | . | 35.000 | 35.000 |
| AATp20 | 8 | 112.631 | 7.0116 | 95.324 | 115.942 |
| PBVp20 | 8 | -39.351 | 8.5539 | -46.818 | -22.153 |
| NELp20 | 8 | 7.653 | 0.5743 | 6.236 | 7.907 |
| OE* | 7 | 14.086 | 0.0378 | 14.000 | 14.100 |
| AAT* | 7 | 93.429 | 0.5345 | 93.000 | 94.000 |
| PBV* | 7 | -28.286 | 7.8042 | -40.000 | -19.000 |
| Ca | 1 | 0.500 | . | 0.500 | 0.500 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| P | 1 | 2.900 | . | 2.900 | 2.900 |
| Mg | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| K | 1 | 4.800 | . | 4.800 | 4.800 |
| Na | 1 | 0.100 | . | 0.100 | 0.100 |
| S | 1 | 1.500 | . | 1.500 | 1.500 |
| CAB | 1 | 8.008 | . | 8.008 | 8.008 |
| Fe | 1 | 31.000 | . | 31.000 | 31.000 |
| Mn | 1 | 28.000 | . | 28.000 | 28.000 |
| Zn | 1 | 25.000 | . | 25.000 | 25.000 |
| Cu | 1 | 3.700 | . | 3.700 | 3.700 |

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 876.500 | 10.6066 | 869.000 | 884.000 |
| Aska | 2 | 19.700 | 0.9899 | 19.000 | 20.400 |
| OS smbh | 2 | 89.479 | 0.0000 | 89.479 | 89.479 |
| Råprot | 2 | 125.400 | 9.3338 | 118.800 | 132.000 |
| NH3-N | 1 | 12.000 | . | 12.000 | 12.000 |
| iNDF | 2 | 187.000 | 0.0000 | 187.000 | 187.000 |
| nhNDF | 2 | 3.500 | 0.0000 | 3.500 | 3.500 |
| Stä | 2 | 642.100 | 69.4379 | 593.000 | 691.200 |
| TAF | 2 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 1 | 40.000 | . | 40.000 | 40.000 |
| AATp20 | 2 | 110.120 | 1.3511 | 109.165 | 111.076 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20 | 2 | -35.857 | 7.2829 | -41.007 | -30.707 |
| NELp20 | 2 | 7.605 | 0.0508 | 7.569 | 7.641 |
| OE* | 2 | 13.900 | 0.0000 | 13.900 | 13.900 |
| AAT* | 2 | 94.500 | 0.7071 | 94.000 | 95.000 |
| PBV* | 2 | -30.000 | 8.4853 | -36.000 | -24.000 |
| Ca | 2 | 0.450 | 0.0707 | 0.400 | 0.500 |
| P | 2 | 3.350 | 0.2121 | 3.200 | 3.500 |
| Mg | 2 | 1.200 | 0.1414 | 1.100 | 1.300 |
| K | 2 | 5.750 | 0.0707 | 5.700 | 5.800 |
| Na | 2 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 2 | 1.450 | 0.0707 | 1.400 | 1.500 |
| CAB | 2 | 41.063 | 6.2279 | 36.660 | 45.467 |
| Fe | 2 | 109.500 | 99.7021 | 39.000 | 180.000 |
| Mn | 2 | 25.500 | 12.0208 | 17.000 | 34.000 |
| Zn | 2 | 35.000 | 1.4142 | 34.000 | 36.000 |
| Cu | 2 | 3.350 | 1.4849 | 2.300 | 4.400 |
| Se | 1 | 0.011 | . | 0.011 | 0.011 |

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 857.000 | 2.8284 | 855.000 | 859.000 |
| Aska | 2 | 22.200 | 1.5556 | 21.100 | 23.300 |
| OS smbh | 2 | 87.000 | 0.0000 | 87.000 | 87.000 |
| Råprot | 2 | 124.850 | 0.3536 | 124.600 | 125.100 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Statistik för område B

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF | 2 | 173.000 | 0.0000 | 173.000 | 173.000 |
| nhNDF | 2 | 3.300 | 0.0000 | 3.300 | 3.300 |
| Stä | 2 | 613.200 | 9.4752 | 606.500 | 619.900 |
| TAF | 2 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 2 | 105.777 | 0.0132 | 105.767 | 105.786 |
| PBVp20 | 2 | -31.472 | 0.3574 | -31.724 | -31.219 |
| NELp20 | 2 | 7.573 | 0.0399 | 7.545 | 7.602 |
| OE* | 2 | 12.350 | 0.0707 | 12.300 | 12.400 |
| AAT* | 2 | 82.000 | 0.0000 | 82.000 | 82.000 |
| PBV* | 2 | -10.000 | 0.0000 | -10.000 | -10.000 |
| Ca | 2 | 0.550 | 0.0707 | 0.500 | 0.600 |
| P | 2 | 3.650 | 0.2121 | 3.500 | 3.800 |
| Mg | 2 | 1.200 | 0.0000 | 1.200 | 1.200 |
| K | 2 | 5.700 | 0.4243 | 5.400 | 6.000 |
| Na | 2 | 0.100 | 0.0000 | 0.100 | 0.100 |
| S | 2 | 1.550 | 0.0707 | 1.500 | 1.600 |
| CAB | 2 | 25.084 | 6.4313 | 20.536 | 29.631 |
| Fe | 2 | 47.500 | 12.0208 | 39.000 | 56.000 |
| Mn | 2 | 19.500 | 2.1213 | 18.000 | 21.000 |
| Zn | 2 | 33.500 | 2.1213 | 32.000 | 35.000 |
| Cu | 2 | 3.550 | 0.4950 | 3.200 | 3.900 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OS smbh | 1 | 81.600 | . | 81.600 | 81.600 |
| iNDF | 1 | 324.000 | . | 324.000 | 324.000 |
| nhNDF | 1 | 2.500 | . | 2.500 | 2.500 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| AATp20 | 1 | 101.774 | . | 101.774 | 101.774 |
| PBVp20 | 1 | -26.864 | . | -26.864 | -26.864 |
| NELp20 | 1 | 7.151 | . | 7.151 | 7.151 |

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 870.000 | . | 870.000 | 870.000 |
| Aska | 1 | 23.000 | . | 23.000 | 23.000 |
| OS smbh | 1 | 87.700 | . | 87.700 | 87.700 |
| Råprot | 1 | 134.000 | . | 134.000 | 134.000 |
| sRåprot | 1 | 330.000 | . | 330.000 | 330.000 |
| NDF | 1 | 163.000 | . | 163.000 | 163.000 |
| iNDF | 1 | 123.000 | . | 123.000 | 123.000 |
| nhNDF | 1 | 7.900 | . | 7.900 | 7.900 |
| Stä | 1 | 594.000 | . | 594.000 | 594.000 |
| TAF | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 1 | 35.000 | . | 35.000 | 35.000 |
| AATp20 | 1 | 107.849 | . | 107.849 | 107.849 |
| PBVp20 | 1 | -18.258 | . | -18.258 | -18.258 |
| NELp20 | 1 | 7.186 | . | 7.186 | 7.186 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE* | 1 | 13.900 | . | 13.900 | 13.900 |
| AAT* | 1 | 96.000 | . | 96.000 | 96.000 |
| PBV* | 1 | -25.000 | . | -25.000 | -25.000 |
| Ca | 1 | 0.600 | . | 0.600 | 0.600 |
| P | 1 | 3.200 | . | 3.200 | 3.200 |
| Mg | 1 | 1.200 | . | 1.200 | 1.200 |
| K | 1 | 6.600 | . | 6.600 | 6.600 |
| Na | 1 | 0.100 | . | 0.100 | 0.100 |
| S | 1 | 1.600 | . | 1.600 | 1.600 |
| CAB | 1 | 16.808 | . | 16.808 | 16.808 |
| Fe | 1 | 87.000 | . | 87.000 | 87.000 |
| Mn | 1 | 11.000 | . | 11.000 | 11.000 |
| Zn | 1 | 32.000 | . | 32.000 | 32.000 |
| Cu | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 36 | 379.111 | 76.278 | 287.000 | 492.000 |
| Aska | 36 | 39.917 | 10.877 | 29.000 | 52.000 |
| OS smbh | 36 | 76.407 | 3.054 | 72.000 | 79.900 |
| Råprot | 36 | 83.022 | 11.807 | 71.000 | 98.000 |
| sRåprot | 33 | 377.333 | 73.089 | 280.000 | 439.000 |
| NH3-N | 2 | 69.500 | 0.707 | 69.000 | 70.000 |
| NDF | 36 | 392.389 | 52.693 | 326.000 | 456.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF | 36 | 181.901 | 25.533 | 146.670 | 216.631 |
| nhNDF | 36 | 3.781 | 0.484 | 3.222 | 4.478 |
| Stä | 36 | 257.250 | 88.683 | 165.000 | 380.000 |
| TAF | 36 | 55.833 | 3.485 | 55.000 | 55.000 |
| Mjölksyra | 2 | 53.000 | 0.000 | 53.000 | 53.000 |
| Ättiksyra | 2 | 17.000 | 0.000 | 17.000 | 17.000 |
| Socker | 35 | 76.171 | 50.465 | 12.000 | 143.000 |
| AATp20 | 36 | 89.312 | 3.744 | 83.935 | 94.025 |
| PBVp20 | 36 | -58.960 | 11.863 | -73.673 | -45.031 |
| NELp20 | 36 | 6.284 | 0.345 | 5.769 | 6.676 |
| OE* | 36 | 11.250 | 0.295 | 10.800 | 11.600 |
| AAT* | 36 | 80.583 | 1.826 | 78.000 | 83.000 |
| PBV* | 36 | -59.889 | 11.132 | -73.000 | -44.000 |
| Ca | 21 | 3.152 | 1.038 | 2.000 | 4.900 |
| P | 21 | 2.090 | 0.362 | 1.700 | 2.600 |
| Mg | 21 | 1.533 | 0.315 | 1.200 | 1.800 |
| K | 21 | 10.819 | 2.321 | 8.400 | 13.000 |
| Na | 21 | 0.238 | 0.208 | 0.050 | 0.500 |
| Cl | 33 | 2.385 | 1.761 | 0.900 | 3.500 |
| S | 21 | 1.133 | 0.174 | 1.000 | 1.400 |
| CAB | 21 | 155.858 | 64.297 | 74.529 | 259.401 |
| Fe | 22 | 161.818 | 274.776 | 62.000 | 300.000 |
| Mn | 22 | 26.227 | 10.221 | 14.000 | 34.000 |
| Zn | 22 | 31.000 | 8.378 | 23.000 | 38.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Cu | 22 | 4.241 | 0.878 | 2.900 | 5.200 |
| Se | 6 | 0.023 | 0.013 | 0.012 | 0.040 |

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 10 | 167.600 | 23.0516 | 135.000 | 195.000 |
| Aska | 10 | 106.300 | 6.9849 | 95.250 | 112.750 |
| OS smbh | 10 | 79.084 | 1.1530 | 77.751 | 80.628 |
| Råprot | 10 | 199.050 | 21.3716 | 174.250 | 232.500 |
| NDF | 10 | 423.850 | 31.9844 | 385.000 | 474.500 |
| iNDF | 10 | 109.333 | 17.1007 | 85.040 | 132.858 |
| nhNDF | 10 | 5.353 | 0.5137 | 4.769 | 6.168 |
| TAF | 10 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 10 | 107.950 | 21.7031 | 83.750 | 139.000 |
| AATp20 | 10 | 106.665 | 2.7807 | 103.404 | 110.842 |
| PBVp20 | 10 | 28.996 | 16.1607 | 9.753 | 53.647 |
| NELp20 | 10 | 6.438 | 0.1422 | 6.241 | 6.636 |
| OE* | 10 | 11.160 | 0.1506 | 10.950 | 11.350 |
| CI | 10 | 0.610 | 0.1912 | 0.350 | 0.850 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 7 | 415.857 | 116.905 | 295.000 | 633.000 |
| Aska | 7 | 85.857 | 12.158 | 70.000 | 102.000 |
| OS smbh | 7 | 72.655 | 3.242 | 68.200 | 76.500 |
| Råprot | 7 | 177.429 | 46.224 | 126.000 | 239.000 |
| sRåprot | 5 | 471.000 | 74.310 | 398.000 | 580.000 |
| NDF | 7 | 492.286 | 79.494 | 388.000 | 587.000 |
| iNDF | 7 | 173.510 | 29.085 | 153.000 | 236.778 |
| nhNDF | 7 | 4.244 | 0.559 | 3.113 | 4.700 |
| TAF | 7 | 61.000 | 0.000 | 61.000 | 61.000 |
| Socket | 7 | 76.000 | 31.958 | 41.000 | 135.000 |
| AATp20 | 7 | 87.313 | 5.650 | 78.259 | 94.717 |
| PBVp20 | 7 | 37.372 | 36.034 | -3.556 | 87.041 |
| NELp20 | 7 | 5.930 | 0.325 | 5.312 | 6.236 |
| OE* | 7 | 10.371 | 0.427 | 9.800 | 10.800 |
| AAT* | 7 | 70.143 | 0.690 | 69.000 | 71.000 |
| PBV* | 7 | 58.571 | 49.335 | 6.000 | 125.000 |
| Ca | 6 | 7.200 | 3.125 | 3.500 | 11.500 |
| P | 6 | 2.933 | 0.234 | 2.600 | 3.200 |
| Mg | 6 | 2.500 | 1.079 | 1.500 | 4.100 |
| K | 6 | 23.950 | 4.440 | 20.200 | 30.200 |
| Na | 6 | 1.627 | 1.340 | 0.360 | 3.500 |
| Cl | 6 | 5.317 | 2.827 | 0.500 | 8.400 |
| S | 6 | 2.117 | 0.271 | 1.800 | 2.500 |
| CAB | 6 | 417.162 | 126.403 | 269.769 | 630.756 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe | 6 | 287.167 | 248.040 | 74.000 | 670.000 |
| Mn | 6 | 83.000 | 67.302 | 26.000 | 169.000 |
| Zn | 6 | 32.667 | 8.847 | 22.000 | 44.000 |
| Cu | 6 | 8.967 | 4.128 | 4.900 | 15.000 |
| Se | 1 | 0.030 | . | 0.030 | 0.030 |

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 447.000 | . | 447.000 | 447.000 |
| Aska | 1 | 111.000 | . | 111.000 | 111.000 |
| OS smbh | 1 | 65.500 | . | 65.500 | 65.500 |
| Råprot | 1 | 113.000 | . | 113.000 | 113.000 |
| NDF | 1 | 534.000 | . | 534.000 | 534.000 |
| iNDF | 1 | 227.624 | . | 227.624 | 227.624 |
| nhNDF | 1 | 3.489 | . | 3.489 | 3.489 |
| TAF | 1 | 61.000 | . | 61.000 | 61.000 |
| Socket | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |
| AATp20 | 1 | 74.246 | . | 74.246 | 74.246 |
| PBVp20 | 1 | -0.803 | . | -0.803 | -0.803 |
| NELp20 | 1 | 5.091 | . | 5.091 | 5.091 |
| OE* | 1 | 9.000 | . | 9.000 | 9.000 |
| AAT* | 1 | 65.000 | . | 65.000 | 65.000 |
| PBV* | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |
| Ca | 1 | 13.900 | . | 13.900 | 13.900 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| P | 1 | 4.100 | . | 4.100 | 4.100 |
| Mg | 1 | 2.600 | . | 2.600 | 2.600 |
| K | 1 | 15.400 | . | 15.400 | 15.400 |
| Na | 1 | 2.300 | . | 2.300 | 2.300 |
| S | 1 | 2.100 | . | 2.100 | 2.100 |
| CAB | 1 | 221.767 | . | 221.767 | 221.767 |
| Fe | 1 | 488.000 | . | 488.000 | 488.000 |
| Mn | 1 | 57.000 | . | 57.000 | 57.000 |
| Zn | 1 | 23.000 | . | 23.000 | 23.000 |
| Cu | 1 | 5.200 | . | 5.200 | 5.200 |

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 266.000 | . | 266.000 | 266.000 |
| Aska | 1 | 87.000 | . | 87.000 | 87.000 |
| OS smbh | 1 | 82.200 | . | 82.200 | 82.200 |
| Råprot | 1 | 209.000 | . | 209.000 | 209.000 |
| NDF | 1 | 396.000 | . | 396.000 | 396.000 |
| iNDF | 1 | 80.422 | . | 80.422 | 80.422 |
| nhNDF | 1 | 6.009 | . | 6.009 | 6.009 |
| TAF | 1 | 61.000 | . | 61.000 | 61.000 |
| Socket | 1 | 136.000 | . | 136.000 | 136.000 |
| AATp20 | 1 | 97.179 | . | 97.179 | 97.179 |
| PBVp20 | 1 | 49.911 | . | 49.911 | 49.911 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20 | 1 | 6.845 | . | 6.845 | 6.845 |
| OE* | 1 | 11.900 | . | 11.900 | 11.900 |
| AAT* | 1 | 80.000 | . | 80.000 | 80.000 |
| PBV* | 1 | 71.000 | . | 71.000 | 71.000 |
| Ca | 1 | 7.100 | . | 7.100 | 7.100 |
| P | 1 | 2.800 | . | 2.800 | 2.800 |
| Mg | 1 | 1.900 | . | 1.900 | 1.900 |
| K | 1 | 30.100 | . | 30.100 | 30.100 |
| Na | 1 | 5.900 | . | 5.900 | 5.900 |
| S | 1 | 2.900 | . | 2.900 | 2.900 |
| CAB | 1 | 704.248 | . | 704.248 | 704.248 |
| Fe | 1 | 213.000 | . | 213.000 | 213.000 |
| Mn | 1 | 20.000 | . | 20.000 | 20.000 |
| Zn | 1 | 27.000 | . | 27.000 | 27.000 |
| Cu | 1 | 7.400 | . | 7.400 | 7.400 |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 7 | 392.714 | 197.515 | 151.000 | 725.000 |
| Aska | 7 | 73.429 | 26.031 | 42.000 | 105.000 |
| OS smbh | 7 | 68.886 | 5.905 | 59.600 | 75.200 |
| Råprot | 7 | 130.714 | 60.698 | 57.000 | 235.000 |
| sRåprot | 7 | 552.571 | 175.210 | 353.000 | 707.000 |
| NH3-N | 7 | 85.000 | 45.144 | 21.000 | 129.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 7 | 484.286 | 81.269 | 375.000 | 605.000 |
| iNDF | 7 | 224.327 | 67.944 | 157.000 | 350.224 |
| nhNDF | 7 | 3.395 | 1.014 | 1.614 | 4.462 |
| TAF | 7 | 53.943 | 41.715 | 6.000 | 103.200 |
| Mjölksyra | 7 | 40.571 | 35.944 | 2.000 | 84.000 |
| Ättiksyra | 7 | 9.286 | 7.653 | 1.000 | 20.000 |
| Socker | 7 | 67.000 | 57.669 | 11.000 | 157.000 |
| BUF | 4 | 3.900 | 1.349 | 3.000 | 5.900 |
| AATp20 | 7 | 76.359 | 3.803 | 72.104 | 83.493 |
| PBVp20 | 7 | 12.538 | 60.036 | -60.565 | 115.675 |
| NELp20 | 7 | 5.307 | 0.545 | 4.553 | 5.845 |
| OE* | 7 | 9.871 | 0.727 | 8.700 | 10.800 |
| AAT* | 7 | 68.286 | 2.430 | 64.000 | 71.000 |
| PBV* | 7 | 17.143 | 58.894 | -52.000 | 115.000 |
| Ca | 5 | 5.400 | 2.936 | 2.300 | 9.300 |
| P | 5 | 2.220 | 0.893 | 1.300 | 3.400 |
| Mg | 5 | 1.860 | 1.021 | 1.100 | 3.600 |
| K | 5 | 18.480 | 9.816 | 6.500 | 30.900 |
| Na | 5 | 0.680 | 0.614 | 0.200 | 1.400 |
| Cl | 7 | 5.529 | 3.983 | 0.800 | 10.600 |
| S | 5 | 1.840 | 0.577 | 1.200 | 2.400 |
| CAB | 5 | 271.707 | 347.278 | -269.308 | 618.255 |
| Fe | 5 | 187.200 | 196.222 | 62.000 | 536.000 |
| Mn | 5 | 56.000 | 20.905 | 33.000 | 81.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 5 | 30.800 | 10.710 | 15.000 | 44.000 |
| Cu | 5 | 4.840 | 1.674 | 2.800 | 7.200 |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 3 | 430.333 | 29.704 | 397.000 | 454.000 |
| Aska | 3 | 87.000 | 16.093 | 70.000 | 102.000 |
| OS smbh | 3 | 75.933 | 2.658 | 73.400 | 78.700 |
| Råprot | 3 | 128.333 | 31.182 | 93.000 | 152.000 |
| sRåprot | 3 | 735.667 | 17.954 | 722.000 | 756.000 |
| NH3-N | 3 | 96.000 | 19.157 | 83.000 | 118.000 |
| NDF | 3 | 440.000 | 143.983 | 274.000 | 531.000 |
| iNDF | 3 | 156.277 | 23.619 | 131.901 | 179.058 |
| nhNDF | 3 | 4.361 | 1.091 | 3.147 | 5.258 |
| TAF | 3 | 42.800 | 4.660 | 39.000 | 48.000 |
| Mjölksyra | 3 | 34.667 | 6.658 | 27.000 | 39.000 |
| Ättiksyra | 3 | 5.333 | 4.041 | 1.000 | 9.000 |
| Socket | 3 | 106.000 | 90.421 | 46.000 | 210.000 |
| BUF | 1 | 1.400 | . | 1.400 | 1.400 |
| AATp20 | 3 | 81.749 | 1.240 | 80.419 | 82.872 |
| PBVp20 | 3 | 0.964 | 27.102 | -29.796 | 21.329 |
| NELp20 | 3 | 5.923 | 0.159 | 5.740 | 6.022 |
| OE* | 3 | 10.900 | 0.265 | 10.700 | 11.200 |
| AAT* | 3 | 71.667 | 1.155 | 71.000 | 73.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBV* | 3 | 5.667 | 32.316 | -31.000 | 30.000 |
| Ca | 3 | 6.733 | 0.611 | 6.200 | 7.400 |
| P | 3 | 2.667 | 0.321 | 2.300 | 2.900 |
| Mg | 3 | 1.633 | 0.306 | 1.300 | 1.900 |
| K | 3 | 22.500 | 7.990 | 13.300 | 27.700 |
| Na | 3 | 1.100 | 0.755 | 0.300 | 1.800 |
| Cl | 3 | 6.400 | 1.732 | 4.400 | 7.400 |
| S | 3 | 2.333 | 0.808 | 1.400 | 2.800 |
| CAB | 3 | 297.159 | 241.347 | 34.964 | 510.040 |
| Fe | 3 | 132.333 | 68.719 | 84.000 | 211.000 |
| Mn | 3 | 21.333 | 2.082 | 19.000 | 23.000 |
| Zn | 3 | 24.000 | 4.583 | 19.000 | 28.000 |
| Cu | 3 | 3.967 | 0.208 | 3.800 | 4.200 |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 314.000 | . | 314.000 | 314.000 |
| Aska | 1 | 95.000 | . | 95.000 | 95.000 |
| OS smbh | 1 | 71.000 | . | 71.000 | 71.000 |
| Råprot | 1 | 188.000 | . | 188.000 | 188.000 |
| sRåprot | 1 | 576.000 | . | 576.000 | 576.000 |
| NH3-N | 1 | 108.000 | . | 108.000 | 108.000 |
| NDF | 1 | 356.000 | . | 356.000 | 356.000 |
| iNDF | 1 | 262.065 | . | 262.065 | 262.065 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| nhNDF | 1 | 2.513 | . | 2.513 | 2.513 |
| TAF | 1 | 67.500 | . | 67.500 | 67.500 |
| Mjölksyra | 1 | 53.000 | . | 53.000 | 53.000 |
| Ättiksyra | 1 | 12.000 | . | 12.000 | 12.000 |
| Socket | 1 | 23.000 | . | 23.000 | 23.000 |
| BUF | 1 | 1.500 | . | 1.500 | 1.500 |
| AATp20 | 1 | 73.603 | . | 73.603 | 73.603 |
| PBVp20 | 1 | 69.989 | . | 69.989 | 69.989 |
| NELp20 | 1 | 5.123 | . | 5.123 | 5.123 |
| OE* | 1 | 10.000 | . | 10.000 | 10.000 |
| AAT* | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |
| PBV* | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |
| CI | 1 | 4.000 | . | 4.000 | 4.000 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 56 | 466.036 | 152.691 | 277.000 | 650.000 |
| Aska | 56 | 84.143 | 13.615 | 67.000 | 101.000 |
| OS smbh | 56 | 74.635 | 4.935 | 68.400 | 79.800 |
| Råprot | 56 | 165.893 | 27.608 | 132.000 | 202.000 |
| sRåprot | 52 | 385.731 | 78.453 | 269.000 | 488.000 |
| NDF | 56 | 472.839 | 41.985 | 420.000 | 522.000 |
| iNDF | 56 | 158.188 | 56.569 | 96.000 | 217.000 |
| nhNDF | 56 | 4.649 | 1.109 | 3.297 | 6.088 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TAF | 56 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socket | 56 | 104.518 | 35.932 | 57.000 | 145.000 |
| AATp20 | 56 | 89.624 | 6.857 | 80.242 | 98.748 |
| PBVp20 | 56 | 25.627 | 24.231 | -6.915 | 61.851 |
| NELp20 | 56 | 6.179 | 0.508 | 5.637 | 6.737 |
| OE* | 56 | 10.700 | 0.846 | 9.800 | 11.500 |
| AAT* | 56 | 70.786 | 2.432 | 68.000 | 73.000 |
| PBV* | 56 | 46.893 | 27.920 | 13.000 | 84.000 |
| Ca | 41 | 7.990 | 2.902 | 4.900 | 11.300 |
| P | 41 | 2.749 | 0.563 | 2.200 | 3.400 |
| Mg | 41 | 2.205 | 0.630 | 1.500 | 3.100 |
| K | 41 | 23.641 | 5.340 | 16.800 | 29.200 |
| Na | 41 | 1.363 | 1.113 | 0.300 | 2.300 |
| Cl | 53 | 8.202 | 3.642 | 4.200 | 12.600 |
| S | 41 | 2.446 | 0.439 | 1.900 | 3.000 |
| CAB | 41 | 310.611 | 147.848 | 129.610 | 463.155 |
| Fe | 41 | 172.390 | 221.142 | 69.000 | 284.000 |
| Mn | 41 | 47.024 | 36.721 | 15.000 | 101.000 |
| Zn | 41 | 29.951 | 6.289 | 24.000 | 39.000 |
| Cu | 41 | 6.129 | 1.502 | 4.400 | 8.400 |
| Se | 14 | 0.087 | 0.190 | 0.010 | 0.140 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 39 | 444.385 | 131.384 | 264.000 | 629.000 |
| Aska | 39 | 78.462 | 11.002 | 63.000 | 91.000 |
| OS smbh | 39 | 75.329 | 3.793 | 68.900 | 79.100 |
| Råprot | 39 | 157.179 | 25.614 | 124.000 | 191.000 |
| NDF | 39 | 506.231 | 35.709 | 452.000 | 547.000 |
| iNDF | 39 | 140.279 | 35.466 | 99.949 | 207.913 |
| nhNDF | 39 | 5.081 | 0.780 | 3.777 | 6.045 |
| TAF | 39 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socket | 39 | 100.410 | 30.859 | 55.000 | 140.000 |
| AATp20 | 39 | 87.318 | 4.574 | 79.849 | 93.134 |
| PBVp20 | 39 | 21.186 | 20.121 | -6.615 | 46.519 |
| NELp20 | 39 | 6.298 | 0.377 | 5.639 | 6.766 |
| OE* | 39 | 10.913 | 0.625 | 9.800 | 11.600 |
| AAT* | 39 | 75.462 | 3.219 | 70.000 | 79.000 |
| PBV* | 39 | 27.051 | 23.845 | -5.000 | 58.000 |
| Ca | 33 | 6.530 | 2.192 | 3.800 | 9.500 |
| P | 33 | 3.058 | 0.587 | 2.500 | 3.800 |
| Mg | 33 | 1.830 | 0.320 | 1.500 | 2.400 |
| K | 33 | 25.815 | 5.223 | 20.700 | 31.700 |
| Na | 33 | 1.383 | 0.931 | 0.300 | 2.800 |
| Cl | 1 | 0.300 | . | 0.300 | 0.300 |
| S | 33 | 2.276 | 0.395 | 1.800 | 2.800 |
| CAB | 33 | 449.479 | 128.247 | 310.333 | 613.673 |
| Fe | 33 | 109.879 | 36.608 | 66.000 | 163.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn | 33 | 44.697 | 20.363 | 21.000 | 71.000 |
| Zn | 33 | 31.545 | 7.471 | 23.000 | 40.000 |
| Cu | 33 | 5.633 | 1.126 | 4.400 | 7.300 |
| Se | 6 | 0.042 | 0.024 | 0.013 | 0.083 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 5 | 604.000 | 172.065 | 391.000 | 806.000 |
| Aska | 5 | 76.200 | 10.354 | 67.000 | 93.000 |
| OS smbh | 5 | 71.400 | 4.334 | 65.300 | 75.600 |
| Råprot | 5 | 152.400 | 24.926 | 130.000 | 195.000 |
| NDF | 5 | 465.800 | 40.990 | 413.000 | 518.000 |
| iNDF | 5 | 200.823 | 44.925 | 148.800 | 250.322 |
| nhNDF | 5 | 3.703 | 0.746 | 2.924 | 4.623 |
| TAF | 5 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socket | 5 | 99.600 | 36.074 | 66.000 | 155.000 |
| AATp20 | 5 | 82.125 | 4.715 | 76.357 | 88.332 |
| PBVp20 | 5 | 25.501 | 19.578 | 0.541 | 55.111 |
| NELp20 | 5 | 5.821 | 0.391 | 5.337 | 6.316 |
| OE* | 5 | 10.300 | 0.636 | 9.400 | 10.900 |
| AAT* | 5 | 72.400 | 3.362 | 68.000 | 76.000 |
| PBV* | 5 | 27.800 | 23.910 | 0.000 | 66.000 |
| Ca | 5 | 10.400 | 5.345 | 6.300 | 19.200 |
| P | 5 | 2.320 | 0.432 | 1.800 | 2.900 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mg | 5 | 2.500 | 0.474 | 2.100 | 3.300 |
| K | 5 | 19.060 | 5.975 | 13.600 | 28.300 |
| Na | 5 | 1.380 | 0.540 | 0.800 | 2.200 |
| S | 5 | 2.300 | 0.430 | 1.600 | 2.700 |
| CAB | 5 | 271.324 | 119.591 | 167.334 | 463.673 |
| Fe | 5 | 106.600 | 28.130 | 57.000 | 127.000 |
| Mn | 5 | 69.400 | 33.103 | 48.000 | 126.000 |
| Zn | 5 | 28.800 | 4.604 | 21.000 | 33.000 |
| Cu | 5 | 6.100 | 0.485 | 5.300 | 6.600 |
| Se | 1 | 0.020 | . | 0.020 | 0.020 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 9 | 401.556 | 92.419 | 278.000 | 596.000 |
| Aska | 9 | 88.556 | 7.828 | 78.000 | 106.000 |
| OS smbh | 9 | 74.089 | 5.364 | 66.700 | 81.800 |
| Råprot | 9 | 178.444 | 18.132 | 160.000 | 213.000 |
| NDF | 9 | 434.667 | 32.109 | 384.000 | 491.000 |
| iNDF | 9 | 174.964 | 60.265 | 92.495 | 266.435 |
| nhNDF | 9 | 4.148 | 1.004 | 2.629 | 5.624 |
| TAF | 9 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socket | 9 | 86.444 | 43.391 | 17.000 | 162.000 |
| AATp20 | 9 | 84.680 | 6.977 | 74.518 | 94.033 |
| PBVp20 | 9 | 45.676 | 12.554 | 29.638 | 70.628 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20 | 9 | 6.069 | 0.587 | 5.252 | 6.834 |
| OE* | 9 | 10.600 | 0.923 | 9.200 | 12.000 |
| AAT* | 9 | 73.667 | 4.500 | 67.000 | 81.000 |
| PBV* | 9 | 51.111 | 14.970 | 33.000 | 82.000 |
| Ca | 8 | 8.925 | 4.400 | 3.700 | 17.500 |
| P | 8 | 2.763 | 0.496 | 2.000 | 3.500 |
| Mg | 8 | 2.450 | 0.521 | 1.900 | 3.400 |
| K | 8 | 23.875 | 3.669 | 16.900 | 28.400 |
| Na | 8 | 2.650 | 2.144 | 0.700 | 7.100 |
| S | 8 | 2.950 | 0.466 | 2.300 | 3.600 |
| CAB | 8 | 409.062 | 110.288 | 190.863 | 564.537 |
| Fe | 8 | 177.125 | 94.360 | 95.000 | 373.000 |
| Mn | 8 | 67.375 | 39.544 | 15.000 | 112.000 |
| Zn | 8 | 31.750 | 5.471 | 26.000 | 42.000 |
| Cu | 8 | 7.438 | 1.495 | 5.500 | 10.100 |
| Se | 1 | 0.029 | . | 0.029 | 0.029 |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 5 | 288.800 | 105.833 | 144.000 | 423.000 |
| Aska | 5 | 98.600 | 14.741 | 82.000 | 116.000 |
| OS smbh | 5 | 74.760 | 3.071 | 70.900 | 77.600 |
| Råprot | 5 | 171.800 | 14.805 | 156.000 | 190.000 |
| NDF | 5 | 445.000 | 34.438 | 407.000 | 485.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF | 5 | 160.490 | 36.345 | 130.808 | 200.867 |
| nhNDF | 5 | 4.373 | 0.678 | 3.598 | 5.166 |
| TAF | 5 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 |
| Socket | 5 | 53.800 | 27.797 | 11.000 | 88.000 |
| AATp20 | 5 | 83.311 | 4.768 | 76.696 | 88.313 |
| PBVp20 | 5 | 41.545 | 11.075 | 25.912 | 53.227 |
| NELp20 | 5 | 6.004 | 0.380 | 5.492 | 6.401 |
| OE* | 5 | 10.600 | 0.436 | 10.100 | 11.100 |
| AAT* | 5 | 73.600 | 2.074 | 71.000 | 76.000 |
| PBV* | 5 | 44.400 | 13.278 | 32.000 | 60.000 |
| Ca | 5 | 7.540 | 2.475 | 5.400 | 11.600 |
| P | 5 | 3.400 | 0.587 | 2.400 | 3.900 |
| Mg | 5 | 2.480 | 0.415 | 2.200 | 3.200 |
| K | 5 | 29.040 | 2.476 | 26.700 | 31.700 |
| Na | 5 | 1.260 | 0.838 | 0.500 | 2.500 |
| S | 5 | 3.100 | 0.663 | 2.500 | 3.900 |
| CAB | 5 | 471.349 | 44.230 | 420.307 | 518.836 |
| Fe | 5 | 165.200 | 80.388 | 83.000 | 267.000 |
| Mn | 5 | 78.200 | 27.770 | 37.000 | 105.000 |
| Zn | 5 | 34.000 | 6.042 | 26.000 | 42.000 |
| Cu | 5 | 7.420 | 1.224 | 5.400 | 8.500 |
| Se | 3 | 0.045 | 0.020 | 0.033 | 0.068 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 196.000 | . | 196.000 | 196.000 |
| Aska | 1 | 140.000 | . | 140.000 | 140.000 |
| OS smbh | 1 | 70.900 | . | 70.900 | 70.900 |
| Råprot | 1 | 174.000 | . | 174.000 | 174.000 |
| NDF | 1 | 469.000 | . | 469.000 | 469.000 |
| iNDF | 1 | 184.861 | . | 184.861 | 184.861 |
| nhNDF | 1 | 4.073 | . | 4.073 | 4.073 |
| TAF | 1 | 84.000 | . | 84.000 | 84.000 |
| Socket | 1 | 60.000 | . | 60.000 | 60.000 |
| AATp20 | 1 | 78.603 | . | 78.603 | 78.603 |
| PBVp20 | 1 | 50.989 | . | 50.989 | 50.989 |
| NELp20 | 1 | 5.682 | . | 5.682 | 5.682 |
| OE* | 1 | 9.500 | . | 9.500 | 9.500 |
| AAT* | 1 | 68.000 | . | 68.000 | 68.000 |
| PBV* | 1 | 56.000 | . | 56.000 | 56.000 |
| Ca | 1 | 6.300 | . | 6.300 | 6.300 |
| P | 1 | 3.800 | . | 3.800 | 3.800 |
| Mg | 1 | 2.900 | . | 2.900 | 2.900 |
| K | 1 | 22.300 | . | 22.300 | 22.300 |
| Na | 1 | 2.400 | . | 2.400 | 2.400 |
| S | 1 | 4.500 | . | 4.500 | 4.500 |
| CAB | 1 | 261.036 | . | 261.036 | 261.036 |
| Fe | 1 | 659.000 | . | 659.000 | 659.000 |
| Mn | 1 | 163.000 | . | 163.000 | 163.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 1 | 30.000 | . | 30.000 | 30.000 |
| Cu | 1 | 6.600 | . | 6.600 | 6.600 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 164 | 417.457 | 130.377 | 278.000 | 619.000 |
| Aska | 162 | 79.299 | 24.462 | 59.000 | 99.000 |
| OS smbh | 165 | 74.087 | 3.331 | 69.500 | 78.100 |
| Råprot | 162 | 155.057 | 25.449 | 125.500 | 188.000 |
| sRåprot | 162 | 624.691 | 99.556 | 512.000 | 725.000 |
| NH3-N | 162 | 86.377 | 32.755 | 51.000 | 118.000 |
| NDF | 162 | 468.857 | 54.748 | 391.000 | 532.000 |
| iNDF | 165 | 167.085 | 34.286 | 124.000 | 214.000 |
| nhNDF | 165 | 4.336 | 0.674 | 3.453 | 5.222 |
| TAF | 165 | 68.398 | 31.107 | 27.000 | 105.300 |
| Mjölksyra | 162 | 51.179 | 26.407 | 17.000 | 82.000 |
| Ättiksyra | 162 | 13.122 | 6.911 | 5.000 | 21.000 |
| Socker | 162 | 54.930 | 36.781 | 12.000 | 110.000 |
| PRF | 6 | 1.133 | 0.557 | 0.200 | 1.900 |
| BUF | 154 | 2.942 | 2.591 | 0.500 | 4.700 |
| AATp20 | 165 | 81.949 | 5.976 | 75.406 | 89.511 |
| PBVp20 | 165 | 28.041 | 25.281 | -0.188 | 61.513 |
| NELp20 | 165 | 5.957 | 0.388 | 5.403 | 6.439 |
| OE* | 162 | 10.647 | 0.626 | 9.800 | 11.300 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT* | 162 | 70.389 | 1.770 | 68.000 | 72.000 |
| PBV* | 162 | 41.506 | 27.765 | 9.000 | 77.000 |
| Ca | 144 | 7.329 | 2.814 | 4.600 | 10.800 |
| P | 144 | 2.783 | 0.501 | 2.200 | 3.500 |
| Mg | 144 | 1.943 | 0.463 | 1.500 | 2.500 |
| K | 144 | 24.389 | 4.991 | 18.200 | 31.000 |
| Na | 144 | 1.465 | 1.179 | 0.400 | 2.800 |
| Cl | 162 | 5.950 | 3.445 | 2.100 | 10.800 |
| S | 144 | 2.383 | 0.546 | 1.800 | 3.100 |
| CAB | 144 | 370.061 | 143.981 | 203.158 | 529.443 |
| Fe | 145 | 204.083 | 258.837 | 79.000 | 343.000 |
| Mn | 145 | 45.924 | 24.985 | 22.000 | 74.000 |
| Zn | 145 | 31.076 | 13.657 | 23.000 | 41.000 |
| Cu | 145 | 6.168 | 1.442 | 4.500 | 7.900 |
| Se | 8 | 0.034 | 0.028 | 0.010 | 0.080 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 233 | 399.034 | 117.299 | 289.000 | 581.000 |
| Aska | 233 | 70.142 | 12.815 | 58.000 | 81.000 |
| OS smbh | 233 | 74.109 | 3.423 | 70.000 | 77.600 |
| Råprot | 233 | 145.155 | 22.786 | 118.000 | 171.000 |
| sRåprot | 233 | 650.906 | 63.748 | 576.000 | 717.000 |
| NH3-N | 233 | 87.700 | 25.595 | 58.000 | 114.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 233 | 495.506 | 39.487 | 452.000 | 543.000 |
| iNDF | 233 | 159.842 | 31.941 | 127.629 | 196.357 |
| nhNDF | 233 | 4.563 | 0.607 | 3.851 | 5.185 |
| TAF | 233 | 72.908 | 31.577 | 21.700 | 112.000 |
| Mjölksyra | 233 | 56.880 | 27.238 | 17.000 | 91.000 |
| Ättiksyra | 233 | 13.270 | 6.465 | 6.000 | 22.000 |
| Socker | 233 | 51.777 | 33.353 | 14.000 | 101.000 |
| BUF | 87 | 1.352 | 2.406 | 0.100 | 2.700 |
| AATp20 | 233 | 81.630 | 4.335 | 76.500 | 86.902 |
| PBVp20 | 233 | 19.360 | 20.466 | -7.088 | 42.771 |
| NELp20 | 233 | 6.022 | 0.367 | 5.581 | 6.442 |
| OE* | 233 | 10.803 | 0.523 | 10.200 | 11.300 |
| AAT* | 233 | 70.991 | 1.531 | 69.000 | 72.000 |
| PBV* | 233 | 22.901 | 21.212 | -3.000 | 48.000 |
| Ca | 221 | 6.253 | 1.529 | 4.600 | 8.000 |
| P | 221 | 2.729 | 0.414 | 2.200 | 3.200 |
| Mg | 221 | 1.718 | 0.243 | 1.500 | 2.000 |
| K | 221 | 23.064 | 4.469 | 17.600 | 28.200 |
| Na | 221 | 1.447 | 0.747 | 0.600 | 2.500 |
| Cl | 233 | 4.393 | 2.102 | 1.900 | 6.900 |
| S | 221 | 2.200 | 0.381 | 1.700 | 2.700 |
| CAB | 221 | 390.656 | 119.902 | 247.508 | 541.117 |
| Fe | 221 | 157.810 | 205.079 | 79.000 | 217.000 |
| Mn | 221 | 44.869 | 20.541 | 24.000 | 74.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 221 | 31.271 | 6.088 | 25.000 | 38.000 |
| Cu | 221 | 5.993 | 1.161 | 4.700 | 7.400 |
| Se | 28 | 0.027 | 0.014 | 0.012 | 0.055 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 37 | 435.378 | 125.150 | 311.000 | 596.000 |
| Aska | 37 | 70.027 | 9.567 | 59.000 | 81.000 |
| OS smbh | 37 | 73.386 | 2.275 | 69.700 | 76.000 |
| Råprot | 37 | 138.703 | 24.969 | 113.000 | 162.000 |
| sRåprot | 37 | 607.027 | 108.054 | 439.000 | 710.000 |
| NH3-N | 37 | 83.649 | 35.682 | 47.000 | 123.000 |
| NDF | 37 | 456.189 | 34.126 | 420.000 | 494.000 |
| iNDF | 37 | 184.014 | 25.931 | 153.974 | 220.437 |
| nhNDF | 37 | 3.944 | 0.457 | 3.320 | 4.462 |
| TAF | 37 | 57.208 | 25.929 | 23.000 | 88.000 |
| Mjölksyra | 37 | 42.730 | 22.026 | 11.000 | 71.000 |
| Ättiksyra | 37 | 11.865 | 4.808 | 5.000 | 19.000 |
| Socker | 37 | 78.892 | 38.879 | 30.000 | 132.000 |
| BUF | 21 | 1.319 | 0.928 | 0.500 | 1.900 |
| AATp20 | 37 | 82.375 | 4.242 | 78.416 | 87.209 |
| PBVp20 | 37 | 12.241 | 24.252 | -13.381 | 40.183 |
| NELp20 | 37 | 5.822 | 0.245 | 5.549 | 6.190 |
| OE* | 37 | 10.695 | 0.384 | 10.200 | 11.200 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT* | 37 | 70.784 | 1.205 | 69.000 | 72.000 |
| PBV* | 37 | 17.000 | 24.758 | -7.000 | 39.000 |
| Ca | 30 | 7.780 | 1.810 | 5.900 | 10.100 |
| P | 30 | 2.253 | 0.364 | 1.800 | 2.800 |
| Mg | 30 | 2.260 | 0.529 | 1.600 | 2.950 |
| K | 30 | 17.693 | 2.739 | 13.550 | 20.850 |
| Na | 30 | 2.087 | 0.979 | 0.900 | 3.150 |
| Cl | 37 | 7.573 | 2.777 | 4.200 | 11.900 |
| S | 30 | 2.497 | 0.485 | 1.800 | 3.100 |
| CAB | 30 | 166.541 | 95.346 | 23.180 | 286.732 |
| Fe | 30 | 149.100 | 81.723 | 81.500 | 254.000 |
| Mn | 30 | 52.167 | 29.258 | 23.000 | 100.000 |
| Zn | 30 | 30.400 | 6.971 | 24.000 | 37.500 |
| Cu | 30 | 6.133 | 0.830 | 4.950 | 7.350 |
| Se | 2 | 0.050 | 0.031 | 0.028 | 0.072 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 65 | 364.600 | 87.346 | 279.000 | 482.000 |
| Aska | 65 | 88.337 | 12.706 | 77.000 | 100.000 |
| OS smbh | 65 | 72.981 | 3.175 | 69.200 | 77.300 |
| Råprot | 65 | 172.882 | 21.803 | 146.000 | 199.000 |
| sRåprot | 64 | 590.328 | 56.259 | 517.000 | 661.000 |
| NH3-N | 64 | 93.531 | 20.903 | 67.000 | 118.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 65 | 412.694 | 37.088 | 369.000 | 455.000 |
| iNDF | 65 | 201.152 | 37.366 | 158.090 | 249.297 |
| nhNDF | 65 | 3.537 | 0.554 | 2.846 | 4.177 |
| TAF | 65 | 77.271 | 21.387 | 45.100 | 102.100 |
| Mjölksyra | 64 | 58.116 | 19.512 | 30.000 | 81.000 |
| Ättiksyra | 64 | 17.025 | 5.861 | 10.000 | 23.000 |
| Socker | 65 | 40.983 | 24.105 | 15.000 | 75.000 |
| BUF | 61 | 1.059 | 1.157 | 0.100 | 1.900 |
| AATp20 | 65 | 78.953 | 4.134 | 74.489 | 84.181 |
| PBVp20 | 65 | 49.894 | 20.106 | 26.582 | 76.914 |
| NELp20 | 65 | 5.711 | 0.362 | 5.319 | 6.195 |
| OE* | 65 | 10.406 | 0.522 | 9.700 | 11.100 |
| AAT* | 65 | 69.646 | 1.504 | 68.000 | 71.000 |
| PBV* | 65 | 52.277 | 20.929 | 28.000 | 77.000 |
| Ca | 56 | 10.313 | 2.982 | 6.800 | 14.700 |
| P | 56 | 2.666 | 0.351 | 2.300 | 3.300 |
| Mg | 56 | 2.539 | 0.411 | 2.100 | 3.000 |
| K | 56 | 21.530 | 4.233 | 16.900 | 27.400 |
| Na | 56 | 2.364 | 1.485 | 0.800 | 4.700 |
| Cl | 65 | 6.980 | 3.494 | 2.200 | 11.800 |
| S | 56 | 2.813 | 0.432 | 2.200 | 3.300 |
| CAB | 56 | 283.346 | 128.934 | 125.155 | 431.856 |
| Fe | 56 | 226.982 | 198.343 | 101.000 | 413.000 |
| Mn | 56 | 58.482 | 35.241 | 27.000 | 120.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 56 | 32.464 | 15.648 | 25.000 | 37.000 |
| Cu | 56 | 7.791 | 1.208 | 6.200 | 9.200 |
| Se | 2 | 0.054 | 0.009 | 0.047 | 0.060 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 10 | 300.600 | 75.478 | 219.500 | 413.500 |
| Aska | 10 | 96.500 | 12.030 | 80.000 | 111.000 |
| OS smbh | 10 | 74.330 | 4.247 | 67.350 | 78.100 |
| Råprot | 10 | 166.200 | 18.671 | 136.000 | 186.000 |
| sRåprot | 10 | 593.000 | 77.507 | 478.000 | 681.500 |
| NH3-N | 10 | 104.700 | 25.193 | 80.000 | 142.000 |
| NDF | 10 | 424.800 | 49.593 | 380.500 | 506.000 |
| iNDF | 10 | 173.618 | 47.445 | 135.811 | 241.851 |
| nhNDF | 10 | 4.051 | 0.650 | 3.093 | 4.566 |
| TAF | 10 | 82.990 | 17.308 | 55.200 | 98.600 |
| Mjölksyra | 10 | 60.400 | 14.721 | 40.500 | 79.500 |
| Ättiksyra | 10 | 19.400 | 10.405 | 10.000 | 34.500 |
| Socker | 10 | 28.100 | 23.130 | 9.000 | 68.000 |
| BUF | 10 | 2.190 | 2.738 | 0.100 | 6.350 |
| AATp20 | 10 | 78.269 | 4.715 | 71.411 | 83.366 |
| PBVp20 | 10 | 44.527 | 18.889 | 13.453 | 64.283 |
| NELp20 | 10 | 5.777 | 0.367 | 5.235 | 6.130 |
| OE* | 10 | 10.540 | 0.692 | 9.500 | 11.150 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT* | 10 | 70.000 | 1.944 | 67.000 | 71.500 |
| PBV* | 10 | 44.900 | 17.130 | 16.500 | 63.000 |
| Ca | 9 | 7.178 | 1.296 | 5.700 | 9.200 |
| P | 9 | 3.078 | 0.412 | 2.200 | 3.500 |
| Mg | 9 | 2.511 | 0.523 | 1.500 | 3.500 |
| K | 9 | 27.589 | 3.410 | 22.100 | 31.600 |
| Na | 9 | 2.822 | 1.642 | 1.400 | 6.300 |
| Cl | 10 | 11.610 | 5.700 | 6.650 | 21.450 |
| S | 9 | 2.656 | 0.529 | 1.900 | 3.600 |
| CAB | 9 | 320.234 | 137.596 | 93.004 | 493.589 |
| Fe | 9 | 237.444 | 166.588 | 98.000 | 641.000 |
| Mn | 9 | 74.667 | 28.439 | 48.000 | 125.000 |
| Zn | 9 | 48.444 | 35.203 | 26.000 | 122.000 |
| Cu | 9 | 8.222 | 1.496 | 5.600 | 11.100 |
| Se | 3 | 0.046 | 0.013 | 0.032 | 0.058 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=180523

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 385.000 | . | 385.000 | 385.000 |
| Aska | 1 | 68.000 | . | 68.000 | 68.000 |
| OS smbh | 1 | 75.900 | . | 75.900 | 75.900 |
| Råprot | 1 | 157.000 | . | 157.000 | 157.000 |
| sRåprot | 1 | 713.000 | . | 713.000 | 713.000 |
| NH3-N | 1 | 95.000 | . | 95.000 | 95.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=180523

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 1 | 509.000 | . | 509.000 | 509.000 |
| iNDF | 1 | 137.815 | . | 137.815 | 137.815 |
| nhNDF | 1 | 5.093 | . | 5.093 | 5.093 |
| TAF | 1 | 60.000 | . | 60.000 | 60.000 |
| Mjölksyra | 1 | 47.000 | . | 47.000 | 47.000 |
| Ättiksyra | 1 | 10.000 | . | 10.000 | 10.000 |
| Socket | 1 | 97.000 | . | 97.000 | 97.000 |
| AATp20 | 1 | 86.036 | . | 86.036 | 86.036 |
| PBVp20 | 1 | 23.241 | . | 23.241 | 23.241 |
| NELp20 | 1 | 6.380 | . | 6.380 | 6.380 |
| OE* | 1 | 11.100 | . | 11.100 | 11.100 |
| AAT* | 1 | 72.000 | . | 72.000 | 72.000 |
| PBV* | 1 | 33.000 | . | 33.000 | 33.000 |
| Ca | 1 | 4.500 | . | 4.500 | 4.500 |
| P | 1 | 3.100 | . | 3.100 | 3.100 |
| Mg | 1 | 1.900 | . | 1.900 | 1.900 |
| K | 1 | 21.500 | . | 21.500 | 21.500 |
| Na | 1 | 3.600 | . | 3.600 | 3.600 |
| Cl | 1 | 8.600 | . | 8.600 | 8.600 |
| S | 1 | 2.400 | . | 2.400 | 2.400 |
| CAB | 1 | 314.140 | . | 314.140 | 314.140 |
| Fe | 1 | 109.000 | . | 109.000 | 109.000 |
| Mn | 1 | 50.000 | . | 50.000 | 50.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=180523

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn | 1 | 34.000 | . | 34.000 | 34.000 |
| Cu | 1 | 6.000 | . | 6.000 | 6.000 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=180813

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 388.000 | . | 388.000 | 388.000 |
| Aska | 1 | 63.000 | . | 63.000 | 63.000 |
| OS smbh | 1 | 73.000 | . | 73.000 | 73.000 |
| Råprot | 1 | 131.000 | . | 131.000 | 131.000 |
| sRåprot | 1 | 702.000 | . | 702.000 | 702.000 |
| NH3-N | 1 | 98.000 | . | 98.000 | 98.000 |
| NDF | 1 | 472.000 | . | 472.000 | 472.000 |
| iNDF | 1 | 184.710 | . | 184.710 | 184.710 |
| nhNDF | 1 | 3.949 | . | 3.949 | 3.949 |
| TAF | 1 | 85.000 | . | 85.000 | 85.000 |
| Mjölksyra | 1 | 67.000 | . | 67.000 | 67.000 |
| Ättiksyra | 1 | 15.000 | . | 15.000 | 15.000 |
| Socket | 1 | 62.000 | . | 62.000 | 62.000 |
| AATp20 | 1 | 78.309 | . | 78.309 | 78.309 |
| PBVp20 | 1 | 11.504 | . | 11.504 | 11.504 |
| NELp20 | 1 | 5.889 | . | 5.889 | 5.889 |
| OE* | 1 | 10.700 | . | 10.700 | 10.700 |
| AAT* | 1 | 71.000 | . | 71.000 | 71.000 |
| PBV* | 1 | 9.000 | . | 9.000 | 9.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=180813

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ca | 1 | 6.000 | . | 6.000 | 6.000 |
| P | 1 | 2.100 | . | 2.100 | 2.100 |
| Mg | 1 | 2.100 | . | 2.100 | 2.100 |
| K | 1 | 20.000 | . | 20.000 | 20.000 |
| Na | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| Cl | 1 | 7.700 | . | 7.700 | 7.700 |
| S | 1 | 2.300 | . | 2.300 | 2.300 |
| CAB | 1 | 237.814 | . | 237.814 | 237.814 |
| Fe | 1 | 113.000 | . | 113.000 | 113.000 |
| Mn | 1 | 40.000 | . | 40.000 | 40.000 |
| Zn | 1 | 27.000 | . | 27.000 | 27.000 |
| Cu | 1 | 6.600 | . | 6.600 | 6.600 |

Fodermedel=Helsäd & baljv, flera <49% baljv (177) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 407.000 | . | 407.000 | 407.000 |
| Aska | 1 | 67.000 | . | 67.000 | 67.000 |
| OS smbh | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |
| Råprot | 1 | 136.000 | . | 136.000 | 136.000 |
| NDF | 1 | 452.000 | . | 452.000 | 452.000 |
| iNDF | 1 | 241.033 | . | 241.033 | 241.033 |
| nhNDF | 1 | 2.987 | . | 2.987 | 2.987 |
| Stä | 1 | 16.000 | . | 16.000 | 16.000 |
| TAF | 1 | 75.000 | . | 75.000 | 75.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Helsäd & baljv, flera <49% baljv (177) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socket | 1 | 96.000 | . | 96.000 | 96.000 |
| AATp20 | 1 | 73.404 | . | 73.404 | 73.404 |
| PBVp20 | 1 | 15.374 | . | 15.374 | 15.374 |
| NELp20 | 1 | 5.528 | . | 5.528 | 5.528 |

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 29 | 462.793 | 92.014 | 387.000 | 640.000 |
| Aska | 29 | 52.934 | 14.691 | 36.000 | 79.000 |
| OS smbh | 29 | 71.739 | 2.856 | 68.500 | 76.400 |
| Råprot | 29 | 109.324 | 26.437 | 79.000 | 138.000 |
| sRåprot | 29 | 676.483 | 120.600 | 478.000 | 814.000 |
| NH3-N | 28 | 87.821 | 29.394 | 41.000 | 126.000 |
| NDF | 29 | 421.759 | 49.692 | 371.000 | 498.000 |
| iNDF | 29 | 229.097 | 40.956 | 164.428 | 275.555 |
| nhNDF | 29 | 3.124 | 0.672 | 2.329 | 4.146 |
| Stä | 29 | 116.348 | 75.769 | 19.000 | 228.000 |
| TAF | 29 | 40.600 | 21.424 | 13.700 | 71.700 |
| Mjölksyra | 28 | 31.321 | 18.459 | 6.000 | 61.000 |
| Ättiksyra | 28 | 6.571 | 4.811 | 1.000 | 15.000 |
| Socket | 29 | 107.028 | 49.923 | 53.000 | 178.000 |
| BUF | 3 | 0.733 | 0.321 | 0.500 | 1.100 |
| AATp20 | 29 | 76.731 | 4.579 | 71.097 | 84.663 |
| PBVp20 | 29 | -15.704 | 22.294 | -41.761 | 15.455 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20 | 29 | 5.689 | 0.294 | 5.340 | 6.165 |
| OE* | 29 | 10.176 | 0.228 | 9.800 | 10.500 |
| AAT* | 29 | 62.310 | 2.422 | 60.000 | 65.000 |
| PBV* | 29 | -12.586 | 25.676 | -39.000 | 14.000 |
| Ca | 21 | 4.410 | 2.014 | 2.700 | 6.100 |
| P | 21 | 2.338 | 0.418 | 2.000 | 3.000 |
| Mg | 21 | 1.286 | 0.276 | 0.900 | 1.600 |
| K | 21 | 13.848 | 3.382 | 11.000 | 17.700 |
| Na | 21 | 0.767 | 0.411 | 0.300 | 1.300 |
| Cl | 3 | 2.000 | 0.755 | 1.200 | 2.700 |
| S | 21 | 1.676 | 0.416 | 1.200 | 2.200 |
| CAB | 21 | 181.477 | 83.125 | 102.453 | 276.621 |
| Fe | 21 | 157.714 | 116.783 | 63.000 | 393.000 |
| Mn | 21 | 33.095 | 23.788 | 14.000 | 63.000 |
| Zn | 21 | 35.381 | 22.180 | 20.000 | 42.000 |
| Cu | 21 | 4.443 | 1.350 | 3.000 | 6.000 |
| Se | 3 | 0.020 | 0.013 | 0.010 | 0.035 |

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 5 | 539.600 | 153.752 | 377.000 | 723.000 |
| Aska | 5 | 73.000 | 12.349 | 53.000 | 84.000 |
| OS smbh | 5 | 68.320 | 3.261 | 64.300 | 72.900 |
| Råprot | 5 | 115.600 | 20.864 | 94.000 | 148.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärt (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot | 5 | 532.600 | 245.974 | 231.000 | 799.000 |
| NH3-N | 5 | 61.000 | 24.269 | 36.000 | 86.000 |
| NDF | 5 | 453.800 | 22.197 | 425.000 | 481.000 |
| iNDF | 5 | 282.287 | 101.349 | 187.106 | 454.000 |
| nhNDF | 5 | 3.904 | 1.936 | 2.606 | 7.257 |
| Stä | 5 | 43.600 | 40.722 | 18.000 | 115.000 |
| TAF | 5 | 52.700 | 47.843 | 9.000 | 123.500 |
| Mjölksyra | 5 | 42.600 | 41.831 | 6.000 | 104.000 |
| Ättiksyra | 5 | 8.200 | 6.380 | 1.000 | 18.000 |
| Socker | 5 | 94.400 | 64.190 | 30.000 | 177.000 |
| BUF | 1 | 1.500 | . | 1.500 | 1.500 |
| AATp20 | 5 | 75.641 | 11.081 | 61.332 | 89.028 |
| PBVp20 | 5 | -4.510 | 13.237 | -24.357 | 10.123 |
| NELp20 | 5 | 5.328 | 0.376 | 4.905 | 5.931 |
| OE* | 5 | 9.780 | 0.476 | 9.200 | 10.500 |
| AAT* | 5 | 60.800 | 3.701 | 58.000 | 67.000 |
| PBV* | 5 | -2.200 | 19.791 | -22.000 | 27.000 |
| Ca | 4 | 7.875 | 1.427 | 6.400 | 9.500 |
| P | 4 | 2.550 | 0.370 | 2.100 | 2.900 |
| Mg | 4 | 2.000 | 0.663 | 1.300 | 2.900 |
| K | 4 | 24.025 | 4.878 | 16.800 | 27.500 |
| Na | 4 | 1.000 | 0.392 | 0.600 | 1.500 |
| Cl | 1 | 3.600 | . | 3.600 | 3.600 |
| S | 4 | 1.950 | 0.387 | 1.500 | 2.400 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB | 4 | 386.053 | 85.657 | 260.596 | 452.345 |
| Fe | 4 | 151.500 | 52.080 | 118.000 | 229.000 |
| Mn | 4 | 58.000 | 26.820 | 35.000 | 95.000 |
| Zn | 4 | 39.000 | 11.804 | 29.000 | 56.000 |
| Cu | 4 | 6.050 | 1.136 | 4.900 | 7.300 |
| Se | 1 | 0.023 | . | 0.023 | 0.023 |

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 3 | 507.000 | 62.217 | 462.000 | 578.000 |
| Aska | 2 | 62.000 | 32.527 | 39.000 | 85.000 |
| OS smbh | 3 | 68.100 | 5.027 | 62.800 | 72.800 |
| Råprot | 3 | 133.933 | 33.317 | 98.000 | 163.800 |
| NDF | 3 | 382.333 | 101.791 | 297.000 | 495.000 |
| iNDF | 3 | 309.453 | 87.538 | 221.562 | 396.634 |
| nhNDF | 3 | 2.117 | 1.137 | 1.191 | 3.385 |
| Stä | 3 | 180.670 | 69.614 | 123.000 | 258.000 |
| TAF | 3 | 71.900 | 0.000 | 71.900 | 71.900 |
| Socket | 1 | 23.800 | . | 23.800 | 23.800 |
| AATp20 | 3 | 73.967 | 5.503 | 67.613 | 77.222 |
| PBVp20 | 3 | 14.624 | 37.035 | -22.299 | 51.770 |
| NELp20 | 3 | 5.488 | 0.504 | 4.909 | 5.831 |
| OE* | 3 | 10.167 | 0.751 | 9.300 | 10.600 |
| AAT* | 3 | 62.333 | 5.508 | 56.000 | 66.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBV* | 3 | 11.333 | 37.501 | -26.000 | 49.000 |
| Ca | 3 | 7.633 | 4.669 | 4.500 | 13.000 |
| P | 3 | 2.167 | 0.379 | 1.900 | 2.600 |
| Mg | 3 | 2.100 | 0.985 | 1.300 | 3.200 |
| K | 3 | 14.633 | 4.167 | 10.700 | 19.000 |
| Na | 3 | 1.233 | 1.007 | 0.300 | 2.300 |
| S | 3 | 1.633 | 0.379 | 1.200 | 1.900 |
| CAB | 3 | 277.907 | 127.977 | 198.596 | 425.546 |
| Fe | 3 | 118.000 | 51.029 | 68.000 | 170.000 |
| Mn | 3 | 39.667 | 25.325 | 17.000 | 67.000 |
| Zn | 3 | 53.000 | 26.287 | 34.000 | 83.000 |
| Cu | 3 | 6.867 | 2.301 | 4.600 | 9.200 |
| Se | 2 | 0.033 | 0.017 | 0.021 | 0.045 |

Fodermedel=Raps, hela plantan ensilerad (260) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 472.000 | . | 472.000 | 472.000 |
| Aska | 1 | 62.000 | . | 62.000 | 62.000 |
| OS smbh | 1 | 78.280 | . | 78.280 | 78.280 |
| Råprot | 1 | 75.100 | . | 75.100 | 75.100 |
| NDF | 1 | 615.000 | . | 615.000 | 615.000 |
| iNDF | 1 | 93.941 | . | 93.941 | 93.941 |
| nhNDF | 1 | 6.928 | . | 6.928 | 6.928 |
| Stä | 1 | 18.980 | . | 18.980 | 18.980 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Raps, hela plantan ensilerad (260) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TAF | 1 | 95.000 | . | 95.000 | 95.000 |
| Socket | 1 | 13.800 | . | 13.800 | 13.800 |
| AATp20 | 1 | 84.356 | . | 84.356 | 84.356 |
| PBVp20 | 1 | -53.561 | . | -53.561 | -53.561 |
| NELp20 | 1 | 6.572 | . | 6.572 | 6.572 |
| OE* | 1 | 10.700 | . | 10.700 | 10.700 |
| AAT* | 1 | 81.000 | . | 81.000 | 81.000 |
| PBV* | 1 | -62.000 | . | -62.000 | -62.000 |
| Ca | 1 | 13.000 | . | 13.000 | 13.000 |
| P | 1 | 1.200 | . | 1.200 | 1.200 |
| Mg | 1 | 1.900 | . | 1.900 | 1.900 |
| K | 1 | 12.000 | . | 12.000 | 12.000 |
| Na | 1 | 0.310 | . | 0.310 | 0.310 |
| S | 1 | 3.600 | . | 3.600 | 3.600 |
| Fe | 1 | 42.000 | . | 42.000 | 42.000 |
| Mn | 1 | 18.000 | . | 18.000 | 18.000 |
| Zn | 1 | 16.000 | . | 16.000 | 16.000 |
| Cu | 1 | 2.200 | . | 2.200 | 2.200 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna, helsädesensilage (288) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 260.000 | . | 260.000 | 260.000 |
| Aska | 1 | 86.000 | . | 86.000 | 86.000 |
| OS smbh | 1 | 70.300 | . | 70.300 | 70.300 |
| Råprot | 1 | 168.000 | . | 168.000 | 168.000 |
| NDF | 1 | 358.000 | . | 358.000 | 358.000 |
| iNDF | 1 | 419.000 | . | 419.000 | 419.000 |
| nhNDF | 1 | 4.471 | . | 4.471 | 4.471 |
| Stä | 1 | 32.000 | . | 32.000 | 32.000 |
| TAF | 1 | 121.500 | . | 121.500 | 121.500 |
| AATp20 | 1 | 67.690 | . | 67.690 | 67.690 |
| PBVp20 | 1 | 62.687 | . | 62.687 | 62.687 |
| NELp20 | 1 | 5.249 | . | 5.249 | 5.249 |
| OE* | 1 | 9.500 | . | 9.500 | 9.500 |
| AAT* | 1 | 56.000 | . | 56.000 | 56.000 |
| PBV* | 1 | 54.000 | . | 54.000 | 54.000 |

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 347.000 | 118.794 | 263.000 | 431.000 |
| Aska | 2 | 69.000 | 11.314 | 61.000 | 77.000 |
| OS smbh | 2 | 67.900 | 4.950 | 64.400 | 71.400 |
| Råprot | 2 | 126.500 | 19.092 | 113.000 | 140.000 |
| sRåprot | 2 | 696.500 | 37.477 | 670.000 | 723.000 |
| NH3-N | 2 | 97.000 | 50.912 | 61.000 | 133.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 2 | 466.000 | 2.828 | 464.000 | 468.000 |
| iNDF | 2 | 246.839 | 65.282 | 200.677 | 293.000 |
| nhNDF | 2 | 3.002 | 0.944 | 2.335 | 3.669 |
| Stä | 2 | 29.000 | 15.556 | 18.000 | 40.000 |
| TAF | 2 | 32.500 | 21.920 | 17.000 | 48.000 |
| Mjölksyra | 2 | 22.500 | 21.920 | 7.000 | 38.000 |
| Ättiksyra | 2 | 9.000 | 1.414 | 8.000 | 10.000 |
| Socker | 2 | 71.000 | 14.142 | 61.000 | 81.000 |
| BUF | 1 | 2.000 | . | 2.000 | 2.000 |
| AATp20 | 2 | 74.338 | 2.949 | 72.252 | 76.424 |
| PBVp20 | 2 | 5.510 | 11.389 | -2.543 | 13.563 |
| NELp20 | 2 | 5.247 | 0.546 | 4.861 | 5.633 |
| OE* | 2 | 9.700 | 0.283 | 9.500 | 9.900 |
| AAT* | 2 | 58.500 | 0.707 | 58.000 | 59.000 |
| PBV* | 2 | 11.500 | 9.192 | 5.000 | 18.000 |
| Ca | 2 | 5.850 | 1.485 | 4.800 | 6.900 |
| P | 2 | 2.150 | 0.354 | 1.900 | 2.400 |
| Mg | 2 | 1.850 | 0.354 | 1.600 | 2.100 |
| K | 2 | 22.750 | 8.415 | 16.800 | 28.700 |
| Na | 2 | 1.100 | 0.424 | 0.800 | 1.400 |
| Cl | 1 | 5.000 | . | 5.000 | 5.000 |
| S | 2 | 2.100 | 0.566 | 1.700 | 2.500 |
| CAB | 2 | 317.713 | 141.928 | 217.355 | 418.072 |
| Fe | 2 | 177.000 | 8.485 | 171.000 | 183.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn | 2 | 95.000 | 106.066 | 20.000 | 170.000 |
| Zn | 2 | 57.000 | 19.799 | 43.000 | 71.000 |
| Cu | 2 | 7.150 | 1.626 | 6.000 | 8.300 |

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 3 | 463.667 | 216.634 | 286.000 | 705.000 |
| Aska | 3 | 71.000 | 21.794 | 56.000 | 96.000 |
| OS smbh | 4 | 68.609 | 2.974 | 64.300 | 71.134 |
| Råprot | 3 | 117.000 | 34.395 | 79.000 | 146.000 |
| sRåprot | 3 | 480.667 | 197.247 | 313.000 | 698.000 |
| NH3-N | 3 | 68.000 | 33.645 | 30.000 | 94.000 |
| NDF | 3 | 435.667 | 44.004 | 392.000 | 480.000 |
| iNDF | 4 | 316.604 | 137.925 | 224.783 | 522.000 |
| nhNDF | 4 | 3.734 | 1.850 | 2.541 | 6.467 |
| Stä | 3 | 119.000 | 51.468 | 72.000 | 174.000 |
| TAF | 4 | 34.613 | 34.516 | 7.000 | 80.450 |
| Mjölksyra | 3 | 17.000 | 19.053 | 6.000 | 39.000 |
| Ättiksyra | 3 | 2.333 | 1.155 | 1.000 | 3.000 |
| Socker | 3 | 53.333 | 16.503 | 35.000 | 67.000 |
| AATp20 | 4 | 73.945 | 7.268 | 66.916 | 82.909 |
| PBVp20 | 4 | -0.582 | 18.580 | -22.122 | 19.264 |
| NELp20 | 4 | 5.281 | 0.348 | 4.855 | 5.604 |
| OE* | 3 | 10.300 | 0.265 | 10.100 | 10.600 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT* | 3 | 64.333 | 4.933 | 61.000 | 70.000 |
| PBV* | 3 | -6.000 | 33.422 | -43.000 | 22.000 |
| Ca | 3 | 8.033 | 5.550 | 2.500 | 13.600 |
| P | 3 | 2.667 | 0.208 | 2.500 | 2.900 |
| Mg | 3 | 1.967 | 0.252 | 1.700 | 2.200 |
| K | 3 | 19.333 | 3.134 | 16.500 | 22.700 |
| Na | 3 | 0.500 | 0.346 | 0.100 | 0.700 |
| Cl | 1 | 4.900 | . | 4.900 | 4.900 |
| S | 3 | 2.000 | 0.557 | 1.400 | 2.500 |
| CAB | 3 | 260.681 | 82.721 | 168.332 | 327.987 |
| Fe | 3 | 125.667 | 18.230 | 106.000 | 142.000 |
| Mn | 3 | 64.000 | 67.104 | 18.000 | 141.000 |
| Zn | 3 | 44.667 | 9.292 | 37.000 | 55.000 |
| Cu | 3 | 5.900 | 1.375 | 4.400 | 7.100 |
| Se | 1 | 0.017 | . | 0.017 | 0.017 |

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 16 | 512.438 | 102.770 | 375.000 | 696.000 |
| Aska | 16 | 52.188 | 17.413 | 30.000 | 86.000 |
| OS smbh | 16 | 68.231 | 4.766 | 62.800 | 75.000 |
| Råprot | 16 | 105.750 | 28.630 | 81.000 | 151.000 |
| sRåprot | 16 | 552.625 | 170.735 | 291.000 | 756.000 |
| NH3-N | 16 | 75.438 | 38.866 | 32.000 | 123.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF | 16 | 445.063 | 65.258 | 374.000 | 527.000 |
| iNDF | 16 | 261.516 | 55.578 | 166.143 | 332.000 |
| nhNDF | 16 | 2.746 | 0.836 | 1.744 | 4.337 |
| Stä | 14 | 188.214 | 87.685 | 50.000 | 298.000 |
| TAF | 16 | 29.306 | 21.557 | 7.600 | 59.500 |
| Mjölksyra | 16 | 22.000 | 18.283 | 6.000 | 48.000 |
| Ättiksyra | 16 | 5.625 | 4.829 | 1.000 | 11.000 |
| Socker | 16 | 62.563 | 34.898 | 26.000 | 111.000 |
| BUF | 8 | 0.863 | 0.370 | 0.100 | 1.200 |
| AATp20 | 16 | 77.163 | 5.578 | 68.459 | 82.054 |
| PBVp20 | 16 | -20.803 | 23.270 | -44.725 | 19.701 |
| NELp20 | 16 | 5.527 | 0.521 | 4.960 | 6.380 |
| OE* | 16 | 10.294 | 0.387 | 9.800 | 11.000 |
| AAT* | 16 | 64.500 | 4.147 | 59.000 | 72.000 |
| PBV* | 16 | -15.375 | 28.610 | -46.000 | 28.000 |
| Ca | 10 | 5.710 | 4.480 | 2.250 | 12.700 |
| P | 10 | 2.410 | 0.511 | 1.850 | 3.200 |
| Mg | 10 | 1.370 | 0.320 | 0.950 | 1.850 |
| K | 10 | 15.910 | 6.449 | 9.800 | 25.850 |
| Na | 10 | 0.490 | 0.393 | 0.150 | 1.100 |
| Cl | 10 | 3.600 | 1.971 | 1.050 | 6.700 |
| S | 10 | 2.290 | 0.902 | 1.250 | 3.600 |
| CAB | 10 | 162.380 | 146.294 | 63.515 | 435.577 |
| Fe | 10 | 138.600 | 108.724 | 56.500 | 321.500 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn | 10 | 32.100 | 32.416 | 12.500 | 80.500 |
| Zn | 10 | 32.500 | 6.884 | 23.000 | 40.000 |
| Cu | 10 | 4.670 | 0.936 | 3.650 | 6.200 |
| Se | 2 | 0.038 | 0.026 | 0.019 | 0.056 |

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 4 | 409.500 | 119.090 | 241.000 | 521.000 |
| Aska | 4 | 76.250 | 17.115 | 59.000 | 97.000 |
| OS smbh | 4 | 69.625 | 3.668 | 66.300 | 73.800 |
| Råprot | 4 | 136.250 | 30.071 | 106.000 | 169.000 |
| sRåprot | 4 | 627.750 | 89.794 | 556.000 | 758.000 |
| NH3-N | 4 | 101.250 | 42.960 | 65.000 | 157.000 |
| NDF | 4 | 417.500 | 31.417 | 391.000 | 463.000 |
| iNDF | 4 | 251.397 | 66.250 | 190.000 | 317.714 |
| nhNDF | 4 | 2.866 | 0.949 | 1.936 | 3.713 |
| Stä | 4 | 98.250 | 96.407 | 17.000 | 209.000 |
| TAF | 4 | 45.800 | 27.074 | 18.000 | 74.500 |
| Mjölksyra | 4 | 35.750 | 17.347 | 17.000 | 55.000 |
| Ättiksyra | 4 | 8.000 | 7.616 | 1.000 | 16.000 |
| Socker | 4 | 36.250 | 13.401 | 24.000 | 53.000 |
| BUF | 2 | 4.100 | 3.394 | 1.700 | 6.500 |
| AATp20 | 4 | 73.221 | 3.321 | 68.818 | 76.440 |
| PBVp20 | 4 | 17.810 | 29.071 | -7.740 | 54.600 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20 | 4 | 5.362 | 0.343 | 4.965 | 5.728 |
| OE* | 4 | 10.250 | 0.733 | 9.300 | 11.000 |
| AAT* | 4 | 60.500 | 1.291 | 59.000 | 62.000 |
| PBV* | 4 | 20.250 | 32.170 | -7.000 | 58.000 |
| Ca | 4 | 8.175 | 1.312 | 6.600 | 9.400 |
| P | 4 | 2.775 | 0.759 | 2.000 | 3.800 |
| Mg | 4 | 1.975 | 0.585 | 1.300 | 2.600 |
| K | 4 | 22.025 | 6.614 | 16.600 | 30.200 |
| Na | 4 | 1.275 | 0.263 | 0.900 | 1.500 |
| Cl | 2 | 5.050 | 2.192 | 3.500 | 6.600 |
| S | 4 | 2.550 | 1.103 | 1.400 | 4.000 |
| CAB | 4 | 337.951 | 90.424 | 253.609 | 462.917 |
| Fe | 4 | 114.250 | 42.138 | 75.000 | 173.000 |
| Mn | 4 | 31.250 | 14.175 | 19.000 | 48.000 |
| Zn | 4 | 46.250 | 44.169 | 20.000 | 112.000 |
| Cu | 4 | 5.400 | 1.013 | 4.500 | 6.700 |
| Se | 1 | 0.030 | . | 0.030 | 0.030 |

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 153 | 372.627 | 53.900 | 307.000 | 443.000 |
| Aska | 153 | 38.125 | 8.794 | 29.000 | 53.000 |
| OS smbh | 154 | 77.486 | 2.521 | 74.400 | 80.100 |
| Råprot | 153 | 78.345 | 8.862 | 69.000 | 89.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot | 153 | 543.556 | 75.020 | 442.000 | 636.000 |
| NH3-N | 51 | 78.157 | 23.086 | 51.000 | 107.000 |
| NDF | 153 | 368.014 | 45.260 | 303.000 | 424.000 |
| iNDF | 154 | 179.672 | 29.557 | 150.722 | 210.275 |
| nhNDF | 154 | 3.759 | 0.562 | 3.140 | 4.450 |
| Stä | 153 | 257.813 | 79.738 | 148.000 | 356.000 |
| TAF | 154 | 62.307 | 10.566 | 58.600 | 76.300 |
| Mjölksyra | 51 | 51.510 | 15.371 | 33.000 | 70.000 |
| Ättiksyra | 51 | 13.059 | 4.549 | 8.000 | 19.000 |
| Socker | 152 | 31.237 | 23.150 | 12.000 | 64.000 |
| BUF | 44 | 2.143 | 0.922 | 1.000 | 3.400 |
| AATp20 | 154 | 83.008 | 3.774 | 78.582 | 87.250 |
| PBVp20 | 154 | -52.591 | 10.635 | -64.034 | -38.549 |
| NELp20 | 154 | 6.263 | 0.291 | 5.904 | 6.592 |
| OE* | 153 | 11.325 | 0.228 | 11.000 | 11.600 |
| AAT* | 153 | 80.033 | 1.471 | 79.000 | 82.000 |
| PBV* | 153 | -61.242 | 17.339 | -72.000 | -53.000 |
| Ca | 127 | 2.809 | 0.955 | 1.800 | 4.100 |
| P | 127 | 1.978 | 0.347 | 1.600 | 2.300 |
| Mg | 127 | 1.384 | 0.260 | 1.100 | 1.700 |
| K | 127 | 10.714 | 2.626 | 7.600 | 14.300 |
| Na | 127 | 0.975 | 7.404 | 0.100 | 0.600 |
| Cl | 153 | 2.334 | 2.930 | 1.200 | 3.000 |
| S | 127 | 1.096 | 0.149 | 0.900 | 1.300 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB | 127 | 179.788 | 241.143 | 93.477 | 238.739 |
| Fe | 127 | 110.756 | 82.724 | 67.000 | 160.000 |
| Mn | 127 | 27.756 | 14.467 | 14.000 | 47.000 |
| Zn | 127 | 32.063 | 12.604 | 21.000 | 42.000 |
| Cu | 127 | 4.107 | 0.864 | 3.100 | 5.100 |
| Se | 8 | 0.019 | 0.011 | 0.007 | 0.037 |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 4 | 796.500 | 175.215 | 535.000 | 902.000 |
| Aska | 4 | 46.500 | 9.678 | 38.000 | 58.000 |
| OS smbh | 4 | 63.857 | 6.184 | 56.900 | 71.700 |
| Råprot | 4 | 94.750 | 39.744 | 47.000 | 144.000 |
| sRåprot | 1 | 437.000 | . | 437.000 | 437.000 |
| NDF | 4 | 591.750 | 78.228 | 511.000 | 694.000 |
| iNDF | 4 | 235.386 | 32.852 | 188.000 | 261.265 |
| nhNDF | 4 | 3.260 | 0.473 | 2.930 | 3.951 |
| TAF | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Socker | 4 | 95.750 | 25.065 | 66.000 | 126.000 |
| AATp20 | 4 | 85.910 | 8.483 | 75.276 | 95.547 |
| PBVp20 | 4 | -34.367 | 29.833 | -61.325 | 7.655 |
| NELp20 | 4 | 4.977 | 0.499 | 4.374 | 5.594 |
| OE* | 4 | 9.325 | 0.991 | 8.200 | 10.600 |
| AAT* | 4 | 66.750 | 5.737 | 60.000 | 74.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBV* | 4 | -18.000 | 34.995 | -54.000 | 30.000 |
| Ca | 2 | 4.500 | 1.273 | 3.600 | 5.400 |
| P | 2 | 1.950 | 0.212 | 1.800 | 2.100 |
| Mg | 2 | 1.200 | 0.283 | 1.000 | 1.400 |
| K | 2 | 15.500 | 2.121 | 14.000 | 17.000 |
| Na | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
| Cl | 3 | 1.600 | 1.819 | 0.500 | 3.700 |
| S | 2 | 1.400 | 0.283 | 1.200 | 1.600 |
| CAB | 2 | 190.732 | 62.470 | 146.559 | 234.905 |
| Fe | 2 | 68.000 | 8.485 | 62.000 | 74.000 |
| Mn | 2 | 35.000 | 24.042 | 18.000 | 52.000 |
| Zn | 2 | 19.000 | 2.828 | 17.000 | 21.000 |
| Cu | 2 | 4.600 | 3.111 | 2.400 | 6.800 |
| Se | 1 | 0.030 | . | 0.030 | 0.030 |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 3 | 851.000 | 74.1013 | 766.000 | 902.000 |
| Aska | 3 | 55.000 | 13.1149 | 41.000 | 67.000 |
| OS smbh | 3 | 68.367 | 4.6004 | 63.100 | 71.600 |
| Råprot | 3 | 124.667 | 14.8436 | 112.000 | 141.000 |
| NDF | 3 | 578.000 | 43.5546 | 531.000 | 617.000 |
| iNDF | 3 | 197.099 | 38.0125 | 161.070 | 236.825 |
| nhNDF | 3 | 3.973 | 0.7501 | 3.250 | 4.748 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TAF | 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Socket | 3 | 119.000 | 32.1870 | 89.000 | 153.000 |
| AATp20 | 3 | 92.898 | 4.8048 | 87.621 | 97.020 |
| PBVp20 | 3 | -18.169 | 7.2600 | -23.621 | -9.928 |
| NELp20 | 3 | 5.533 | 0.3929 | 5.096 | 5.855 |
| OE* | 3 | 10.000 | 0.6083 | 9.300 | 10.400 |
| AAT* | 3 | 71.000 | 3.4641 | 67.000 | 73.000 |
| PBV* | 3 | 3.000 | 10.3923 | -3.000 | 15.000 |
| Ca | 2 | 4.550 | 1.3435 | 3.600 | 5.500 |
| P | 2 | 2.650 | 0.3536 | 2.400 | 2.900 |
| Mg | 2 | 1.500 | 0.1414 | 1.400 | 1.600 |
| K | 2 | 22.950 | 1.4849 | 21.900 | 24.000 |
| Na | 2 | 0.150 | 0.0707 | 0.100 | 0.200 |
| S | 2 | 1.650 | 0.4950 | 1.300 | 2.000 |
| CAB | 2 | 349.508 | 65.8391 | 302.953 | 396.063 |
| Fe | 2 | 70.000 | 42.4264 | 40.000 | 100.000 |
| Mn | 2 | 65.500 | 36.0624 | 40.000 | 91.000 |
| Zn | 2 | 23.000 | 9.8995 | 16.000 | 30.000 |
| Cu | 2 | 4.300 | 0.0000 | 4.300 | 4.300 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Halm, sträsäd, ej behandlad (385) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 885.000 | . | 885.000 | 885.000 |
| Aska | 1 | 58.000 | . | 58.000 | 58.000 |
| OS smbh | 1 | 47.000 | . | 47.000 | 47.000 |
| Råprot | 1 | 70.000 | . | 70.000 | 70.000 |
| NDF | 1 | 720.000 | . | 720.000 | 720.000 |
| iNDF | 1 | 324.414 | . | 324.414 | 324.414 |
| Stä | 1 | 16.000 | . | 16.000 | 16.000 |
| Socket | 1 | 10.000 | . | 10.000 | 10.000 |
| NELp20 | 1 | 0.000 | . | 0.000 | 0.000 |
| OE* | 1 | 6.600 | . | 6.600 | 6.600 |
| AAT* | 1 | 60.000 | . | 60.000 | 60.000 |
| PBV* | 1 | -34.000 | . | -34.000 | -34.000 |
| Ca | 1 | 15.000 | . | 15.000 | 15.000 |
| P | 1 | 0.540 | . | 0.540 | 0.540 |
| Mg | 1 | 0.980 | . | 0.980 | 0.980 |
| K | 1 | 9.000 | . | 9.000 | 9.000 |
| Na | 1 | 0.460 | . | 0.460 | 0.460 |
| S | 1 | 1.600 | . | 1.600 | 1.600 |
| Fe | 1 | 66.000 | . | 66.000 | 66.000 |
| Mn | 1 | 13.000 | . | 13.000 | 13.000 |
| Zn | 1 | 13.000 | . | 13.000 | 13.000 |
| Cu | 1 | 1.000 | . | 1.000 | 1.000 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 5 | 464.800 | 174.717 | 293.000 | 727.000 |
| Aska | 5 | 96.400 | 19.008 | 72.000 | 125.000 |
| OS smbh | 5 | 72.721 | 3.359 | 68.928 | 76.800 |
| Råprot | 5 | 188.200 | 51.066 | 131.000 | 250.000 |
| sRåprot | 3 | 403.667 | 49.541 | 353.000 | 452.000 |
| NDF | 5 | 455.600 | 115.372 | 261.000 | 543.000 |
| iNDF | 5 | 231.757 | 107.015 | 130.000 | 366.542 |
| nhNDF | 5 | 4.537 | 1.097 | 2.811 | 5.598 |
| TAF | 5 | 72.000 | 0.000 | 72.000 | 72.000 |
| Socket | 5 | 80.400 | 42.630 | 29.000 | 130.000 |
| AATp20 | 5 | 84.061 | 4.753 | 79.961 | 91.611 |
| PBVp20 | 5 | 60.372 | 51.022 | 5.225 | 119.096 |
| NELp20 | 5 | 6.036 | 0.336 | 5.710 | 6.571 |
| OE* | 5 | 10.340 | 0.723 | 9.400 | 11.300 |
| AAT* | 5 | 72.600 | 3.362 | 68.000 | 77.000 |
| PBV* | 5 | 62.400 | 52.529 | 4.000 | 122.000 |
| Ca | 4 | 7.925 | 2.797 | 4.300 | 11.000 |
| P | 4 | 3.250 | 0.624 | 2.400 | 3.900 |
| Mg | 4 | 1.850 | 0.208 | 1.600 | 2.100 |
| K | 4 | 31.325 | 6.488 | 24.800 | 40.000 |
| Na | 4 | 0.950 | 0.574 | 0.500 | 1.700 |
| Cl | 5 | 4.060 | 3.660 | 0.800 | 10.000 |
| S | 4 | 2.325 | 0.532 | 1.900 | 3.100 |
| CAB | 4 | 559.819 | 230.514 | 288.994 | 837.657 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe | 4 | 87.500 | 9.037 | 76.000 | 98.000 |
| Mn | 4 | 31.750 | 8.382 | 24.000 | 43.000 |
| Zn | 4 | 26.000 | 2.000 | 25.000 | 29.000 |
| Cu | 4 | 6.600 | 1.299 | 5.600 | 8.500 |
| Se | 2 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.030 |

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 2 | 494.500 | 12.021 | 486.000 | 503.000 |
| Aska | 2 | 90.000 | 36.770 | 64.000 | 116.000 |
| OS smbh | 2 | 73.004 | 5.086 | 69.408 | 76.600 |
| Råprot | 2 | 227.500 | 37.477 | 201.000 | 254.000 |
| NDF | 2 | 404.500 | 34.648 | 380.000 | 429.000 |
| iNDF | 2 | 289.083 | 155.503 | 179.126 | 399.040 |
| nhNDF | 2 | 5.468 | 1.153 | 4.653 | 6.283 |
| TAF | 2 | 72.000 | 0.000 | 72.000 | 72.000 |
| Socker | 2 | 71.000 | 63.640 | 26.000 | 116.000 |
| AATp20 | 2 | 85.075 | 2.114 | 83.580 | 86.570 |
| PBVp20 | 2 | 96.909 | 32.270 | 74.091 | 119.727 |
| NELp20 | 2 | 6.075 | 0.285 | 5.873 | 6.276 |
| OE* | 2 | 10.400 | 0.424 | 10.100 | 10.700 |
| AAT* | 2 | 72.000 | 1.414 | 71.000 | 73.000 |
| PBV* | 2 | 101.000 | 33.941 | 77.000 | 125.000 |
| Ca | 2 | 14.250 | 0.354 | 14.000 | 14.500 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| P | 2 | 3.750 | 1.626 | 2.600 | 4.900 |
| Mg | 2 | 2.450 | 0.495 | 2.100 | 2.800 |
| K | 2 | 25.700 | 20.789 | 11.000 | 40.400 |
| Na | 2 | 0.850 | 1.061 | 0.100 | 1.600 |
| Cl | 1 | 0.800 | . | 0.800 | 0.800 |
| S | 2 | 3.000 | 0.141 | 2.900 | 3.100 |
| CAB | 2 | 430.689 | 401.042 | 147.110 | 714.268 |
| Fe | 2 | 97.000 | 26.870 | 78.000 | 116.000 |
| Mn | 2 | 44.000 | 1.414 | 43.000 | 45.000 |
| Zn | 2 | 32.000 | 9.899 | 25.000 | 39.000 |
| Cu | 2 | 12.850 | 8.415 | 6.900 | 18.800 |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 431.000 | . | 431.000 | 431.000 |
| Aska | 1 | 62.200 | . | 62.200 | 62.200 |
| OS smbh | 1 | 71.422 | . | 71.422 | 71.422 |
| Råprot | 1 | 148.400 | . | 148.400 | 148.400 |
| sRåprot | 1 | 593.000 | . | 593.000 | 593.000 |
| NH3-N | 1 | 67.000 | . | 67.000 | 67.000 |
| NDF | 1 | 402.600 | . | 402.600 | 402.600 |
| iNDF | 1 | 374.495 | . | 374.495 | 374.495 |
| nhNDF | 1 | 5.818 | . | 5.818 | 5.818 |
| TAF | 1 | 64.100 | . | 64.100 | 64.100 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mjölksyra | 1 | 35.500 | . | 35.500 | 35.500 |
| Ättiksyra | 1 | 26.600 | . | 26.600 | 26.600 |
| Socket | 1 | 101.600 | . | 101.600 | 101.600 |
| AATp20 | 1 | 79.478 | . | 79.478 | 79.478 |
| PBVp20 | 1 | 29.951 | . | 29.951 | 29.951 |
| NELp20 | 1 | 5.746 | . | 5.746 | 5.746 |
| OE* | 1 | 10.400 | . | 10.400 | 10.400 |
| AAT* | 1 | 70.000 | . | 70.000 | 70.000 |
| PBV* | 1 | 30.000 | . | 30.000 | 30.000 |
| Ca | 1 | 13.000 | . | 13.000 | 13.000 |
| P | 1 | 2.200 | . | 2.200 | 2.200 |
| Mg | 1 | 1.800 | . | 1.800 | 1.800 |
| K | 1 | 19.000 | . | 19.000 | 19.000 |
| Na | 1 | 0.730 | . | 0.730 | 0.730 |
| Cl | 1 | 0.400 | . | 0.400 | 0.400 |
| S | 1 | 1.800 | . | 1.800 | 1.800 |
| CAB | 1 | 393.905 | . | 393.905 | 393.905 |
| Fe | 1 | 66.000 | . | 66.000 | 66.000 |
| Mn | 1 | 35.000 | . | 35.000 | 35.000 |
| Zn | 1 | 24.000 | . | 24.000 | 24.000 |
| Cu | 1 | 3.500 | . | 3.500 | 3.500 |

* = Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Övrigt foder ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 1 | 462.000 | . | 462.000 | 462.000 |
| Aska | 1 | 78.000 | . | 78.000 | 78.000 |
| OS smbh | 3 | 18.867 | 32.6780 | 0.000 | 56.600 |
| Råprot | 1 | 69.000 | . | 69.000 | 69.000 |
| sRåprot | 1 | 324.000 | . | 324.000 | 324.000 |
| NH3-N | 1 | 55.000 | . | 55.000 | 55.000 |
| NDF | 1 | 587.000 | . | 587.000 | 587.000 |
| iNDF | 1 | 301.000 | . | 301.000 | 301.000 |
| nhNDF | 1 | 2.445 | . | 2.445 | 2.445 |
| Stä | 1 | 97.000 | . | 97.000 | 97.000 |
| Mjölksyra | 1 | 35.000 | . | 35.000 | 35.000 |
| Ättiksyra | 1 | 12.000 | . | 12.000 | 12.000 |
| Socker | 1 | 27.000 | . | 27.000 | 27.000 |
| BUF | 1 | 1.500 | . | 1.500 | 1.500 |
| NELp20 | 3 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Ca | 1 | 11.700 | . | 11.700 | 11.700 |
| P | 1 | 1.400 | . | 1.400 | 1.400 |
| Mg | 1 | 1.400 | . | 1.400 | 1.400 |
| K | 1 | 12.000 | . | 12.000 | 12.000 |
| Na | 1 | 0.200 | . | 0.200 | 0.200 |
| Cl | 1 | 2.600 | . | 2.600 | 2.600 |
| S | 1 | 1.500 | . | 1.500 | 1.500 |
| CAB | 1 | 148.612 | . | 148.612 | 148.612 |
| Fe | 1 | 572.000 | . | 572.000 | 572.000 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Övrigt foder ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn | 1 | 34.000 | . | 34.000 | 34.000 |
| Zn | 1 | 20.000 | . | 20.000 | 20.000 |
| Cu | 1 | 3.700 | . | 3.700 | 3.700 |

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS | 5 | 477.800 | 65.450 | 422.000 | 589.000 |
| Aska | 5 | 66.400 | 2.793 | 63.000 | 69.000 |
| OS smbh | 5 | 73.280 | 4.650 | 68.000 | 78.300 |
| Råprot | 5 | 140.000 | 22.561 | 115.000 | 175.000 |
| sRåprot | 2 | 415.000 | 8.485 | 409.000 | 421.000 |
| NH3-N | 2 | 43.500 | 14.849 | 33.000 | 54.000 |
| NDF | 5 | 366.800 | 72.892 | 280.000 | 462.000 |
| iNDF | 5 | 227.917 | 27.720 | 201.459 | 263.157 |
| nhNDF | 5 | 2.908 | 0.193 | 2.608 | 3.136 |
| Stä | 5 | 177.400 | 43.535 | 111.000 | 226.000 |
| Mjölksyra | 2 | 42.000 | 2.828 | 40.000 | 44.000 |
| Ättiksyra | 2 | 6.000 | 1.414 | 5.000 | 7.000 |
| Socker | 2 | 35.000 | 5.657 | 31.000 | 39.000 |
| BUF | 2 | 1.750 | 0.071 | 1.700 | 1.800 |
| NELp20 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ca | 5 | 6.860 | 1.374 | 4.500 | 8.000 |
| P | 5 | 3.380 | 0.602 | 2.900 | 4.400 |
| Mg | 5 | 3.060 | 0.899 | 2.200 | 4.400 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K | 5 | 14.280 | 0.983 | 13.000 | 15.500 |
| Na | 5 | 3.780 | 1.780 | 2.300 | 6.100 |
| Cl | 2 | 3.150 | 0.212 | 3.000 | 3.300 |
| S | 5 | 2.620 | 0.691 | 1.900 | 3.500 |
| CAB | 2 | 187.778 | 61.107 | 144.569 | 230.987 |
| Fe | 5 | 321.400 | 167.092 | 231.000 | 618.000 |
| Mn | 5 | 92.000 | 44.373 | 37.000 | 157.000 |
| Zn | 5 | 103.400 | 33.842 | 68.000 | 159.000 |
| Cu | 5 | 17.200 | 4.064 | 12.000 | 21.700 |
| Se | 5 | 0.592 | 0.292 | 0.264 | 1.020 |

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet